

CTCAE in the pocket

Traduzione italiana del
Common Terminology Criteria for Adverse Events
Versione 4.03

A cura di **Francesco Grossi**

Strumenti per la ricerca e la pratica clinica



Il documento e la traduzione sono approvati
dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica

Con il supporto educativo di Sanofi

Realizzazione a cura
Springer-Verlag Italia Srl
via P.C. Decembrio, 28 - 20137 Milano
Stampa: Geca Spa, Cesano Boscone (MI)

Perché “CTCAE in the pocket”

Registrare correttamente gli eventi avversi insorti durante un trattamento antineoplastico è importante, non solo negli studi clinici con nuove terapie, ma anche nella pratica clinica con trattamenti consolidati.

Lo scopo del CTCAE (Common Terminology Criteria for Adverse Events) è quello di fornire uno standard per la descrizione e lo scambio di informazioni sulla sicurezza dei trattamenti nel campo della ricerca oncologica. Il CTCAE è usato per definire i parametri di un protocollo (come la dose massima tollerata e la tossicità dose-limitante), per fornire la valutazione di eleggibilità e le linee guida per l'aggiustamento posologico. Il CTCAE facilita la valutazione di nuove terapie oncologiche, le modalità di trattamento e il confronto tra i profili di tossicità delle varie terapie.

Il precursore del CTCAE è stato sviluppato nel 1983 dal CTEP (Cancer Therapy Evaluation Program) come CTC (Common Toxicity Criteria) per aiutare nella documentazione e nell'analisi degli effetti tossici della chemioterapia. Il CTEP ha mantenuto e aggiornato il CTC fino alla sua terza versione: il CTCAE v3.0, pubblicato nel 2003. Esso è composto da una lista di eventi avversi comunemente incontrati nelle sperimentazioni cliniche in oncologia, accompagnata da una scala di valutazione della gravità per ogni evento avverso.

L'adozione della terminologia del MedDRA (Medical Dictionary for Regulatory Activities), da parte dell'ICH (International Conference on Harmonization), dell'NCI (National Cancer Institute), dell'industria e degli organismi di regolamentazione ha dato l'impulso all'NCI per intraprendere, nel 2008, una riprogettazione del CTCAE armonizzandolo con il MedDRA. Il CTEP e il CBIIIT (Center for Biomedical Informatics and Information Technology) hanno collaborato per rendere strutturato il CTCAE v4.0 in modo da poter essere inserito nell'architettura del caBIG (cancer Biomedical Informatics Grid). Il 28 Maggio 2009 l'NCI ha pubblicato la versione 4 del CTCAE e il 15 settembre 2009 la versione 4.02 alla quale sono state apportate modifiche minime.

Chi utilizza quotidianamente il CTCAE sia negli studi clinici che nella pratica clinica sa che la sua consultazione non è sempre facile e spesso la lingua inglese può essere una barriera nella corretta comprensione degli eventi avversi. Ho pensato quindi di tradurre quest'opera in italiano sperando così di facilitare l'uso di questo insostituibile strumento in chi già lo utilizza

quotidianamente e contemporaneamente di avvicinare al CTCAE chi invece raramente lo consulta. Nella versione italiana del CTCAE ho cercato di tradurre fedelmente tutti i termini e i gradi che caratterizzano i 790 eventi avversi della versione originale riportando anche per ognuno la definizione e raggruppandoli in 26 SOC (System Organ Class) corrispondenti alle SOC del MedDRA che hanno rimpiazzato le vecchie categorie delle versioni precedenti.

Questo complesso lavoro è stato reso possibile dal supporto di sanofi-aventis e dalla casa editrice Springer-Verlag Italia. Infine, rivolgo un ringraziamento alla dott.ssa Marianna Aita per i preziosi suggerimenti che mi hanno consentito di migliorare il testo.

Spero che il CTCAE in italiano* possa esserti utile per la tua ricerca e la tua pratica clinica.

Prefazione alla seconda edizione

Questa seconda edizione italiana del CTCAE nasce in seguito al buon successo riscosso dalla pubblicazione della prima edizione del 2010, la quale è stata esaurita in breve tempo. Oggi, l'edizione del 2010 è disponibile in consultazione tramite l'AIOM, sul sito www.aiom.it, cui va il mio ringraziamento, affinché gli oncologi italiani possano accedere ad uno strumento che, penso e spero, sia utile non solo per gli studi clinici ma anche per la pratica clinica quotidiana.

Questa nuova pubblicazione italiana (4.03) – traduzione della pubblicazione inglese – è l'aggiornamento della versione 4.02. Rispetto alla precedente, non ci sono stati molti cambiamenti: sono stati modificati alcuni gradi di 15 eventi avversi e sono state modificate 3 definizioni. Da sottolineare come rilevante è la ridefinizione della neutropenia febbrile e alcune modifiche che riguardano l'anemia, l'iper e l'ipo-calcemia e l'ipoacusia.

Infine, devo un particolare ringraziamento a Sanofi per il continuo supporto offerto in questa iniziativa. Mi auguro che la nuova versione del CTCAE possa essere di tuo gradimento.

Francesco Grossi

Responsabile S.S. Tumori Polmonari

Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro – Genova

francesco.grossi@istge.it

*L'autorizzazione alla riproduzione di questa versione del CTCAE v4.03 in lingua italiana deve essere richiesta al dott. Francesco Grossi, esclusivo autore della traduzione

L'impegno di Sanofi per la ricerca e la pratica clinica

Con questa nuova versione del CTCAE tradotto in lingua italiana dal dott. Francesco Grossi, Sanofi ha voluto offrire nuovamente uno strumento che può essere utile all'oncologo medico italiano per valutare al meglio gli eventi avversi e i rispettivi gradi di tossicità che si possono incontrare durante i trattamenti oncologici.

Sanofi continua il suo impegno nella ricerca in campo oncologico, collaborando quotidianamente con ricercatori clinici. Da questa collaborazione si è intuiva la necessità di avere a disposizione strumenti utili e di consultazione per la ricerca, ma anche per la pratica clinica, che possano aiutare il medico impegnato quotidianamente nella lotta contro il cancro. Auspichiamo che questa seconda edizione del CTCAE abbia lo stesso successo che ha avuto la precedente e che Le sia quindi gradita.



Indice

Note introduttive	3
Condizioni sociali	4
Disordini congeniti, famigliari e genetici	4
Disordini vascolari	5
Disturbi cardiaci	7
Disturbi del metabolismo e della nutrizione	11
Disturbi del sistema emolinfopoietico	13
Disturbi del sistema epato-biliare	14
Disturbi del sistema immunitario	16
Disturbi del sistema nervoso	17
Disturbi dell'apparato riproduttivo e della mammella	24
Disturbi dell'apparato urinario	29
Disturbi dell'orecchio e del labirinto	32
Disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo	34
Disturbi endocrini	39
Disturbi gastrointestinali	41
Disturbi muscoloscheletrici e del tessuto connettivo	55
Disturbi oculari	61
Disturbi psichiatrici	64
Disturbi respiratori, toracici e mediastinici	66
Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali	74
Indagini	75
Infezioni e infestazioni	79
Lesioni, avvelenamento e complicanze da procedura	88
Neoplasie benigne, maligne e non specificate (inclusi cisti e polipi)	97
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione	98
Procedure mediche e chirurgiche	101
Definizione dei termini	102

QUICK REFERENCE

Il Common Terminology Criteria dell'NCI rappresenta una terminologia descrittiva che può essere utilizzata per la segnalazione degli eventi avversi (EA). Per ogni termine descrittivo di un AE esiste una scala di severità in gradi.

SOC: COMPONENTI E ORGANIZZAZIONE

Il System Organ Class (SOC), il più alto livello di gerarchia MedDRA, è una classificazione per sistemi ed organi definita su base anatomica o fisiologica, in termini di eziologia, o ancora di obiettivo (per esempio: SOC Indagini per risultati dei test di laboratorio). I termini del CTCAE sono raggruppati in base alle principali SOC MedDRA. All'interno di ogni SOC, gli EA sono elencati in ordine alfabetico insieme ad una descrizione della loro severità (grado).

Termini CTCAE

Per AE si intende un qualunque evento avverso inatteso (ivi compreso un risultato di laboratorio fuori dalla norma), sintomo o processo patologico temporalmente associato ad una terapia medica o procedura e che si può *o meno* ritenere correlato a quel trattamento o a quella procedura. L'EA è un termine utilizzato nella documentazione medica e nelle analisi dei dati scientifici per rappresentare in modo univoco uno specifico evento. Ogni termine CTCAE v4.0 è un termine di basso livello (LLT) del dizionario MedDRA.

Definizioni

Una breve definizione è riportata per chiarire il significato di ogni termine EA.

Gradi

Il grado si riferisce alla severità dell'EA. Il CTCAE è strutturato secondo una scala da 1 a 5, con una descrizione clinica univoca della severità di ogni EA basata sulle seguenti linee guida generali:

Grado 1 Lieve; asintomatico o lievi sintomi; solo osservazione clinica o diagnostica; non è indicato un intervento specifico.

- Grado 2 Moderato; indicato intervento minimo, locale o non invasivo; evento che comporta una limitazione delle ADL strumentali* età-correlate.
- Grado 3 Grave o significativo dal punto di vista clinico, ma non immediatamente pericoloso per la vita; indicata l'ospedalizzazione o il prolungamento del ricovero; invalidante; limitativo delle ADL relative alla cura della persona**.
- Grado 4 Conseguenze potenzialmente letali; indicato intervento urgente.
- Grado 5 Morte correlata all'EA.

Un punto e virgola nella descrizione del grado significa "oppure".

Un singolo trattino (–) indica la mancanza di uno specifico grado.

Non tutti i gradi sono appropriati per tutti gli EA.

Di conseguenza, alcuni eventi avversi sono elencati con meno di cinque opzioni per la definizione del grado.

Grado 5 (Decesso) non è appropriato per alcuni eventi avversi e pertanto non ne rappresenta un'opzione.

Attività della vita quotidiana (ADL)

* Nota 1: Instrumental ADL – attività strumentali della vita quotidiana quali preparare i pasti, fare la spesa o acquistare vestiti, usare il telefono, gestire il denaro, ecc.

** Nota 2: Self-care ADL – attività della vita quotidiana relative alla cura della persona, come: lavarsi, vestirsi e svestirsi, alimentarsi autonomamente, andare alla toilette, prendere i farmaci e non essere costretti a letto.

Acronimi

INR: international normalized ratio, rapporto internazionale normalizzato

LIN: limite inferiore di normalità

LSN: limite superiore di normalità

NPT: nutrizione parenterale totale

prBCs: packed red blood cells, concentrato di eritrociti

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Menopausa	Menopausa che si verifica all'età di 46-53 anni	Menopausa che si verifica all'età di 40-45 anni	Menopausa che si verifica prima dei 40 anni di età	–	–	10027308
Condizioni sociali - Altro, specificare	Asintomatici o sintomi lievi; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicati interventi	Moderati; indicato intervento minimo, locale o non invasivo; con limitazioni in rapporto all'età delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi o significativi dal punto di vista medico ma non immediatamente letali; indicata ospedalizzazione o prolungamento del ricovero in corso; invalidanti; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10041244

Disordini congeniti, famigliari e genetici

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Disordini congeniti, famigliari e genetici - Altro, specificare	Asintomatici o sintomi lievi; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicati interventi	Moderati; indicato intervento minimo, locale o non invasivo; con limitazioni in rapporto all'età delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi o significativi dal punto di vista medico ma non immediatamente letali; indicata ospedalizzazione o prolungamento del ricovero in corso; invalidanti; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10010331

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Arrossamento	Asintomatico; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomi moderati; indicato intervento medico; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Sintomatico, associata ad ipotensione e/o tachicardia; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10016825
Ematoma	Sintomi lievi; intervento non indicato	Indicata evacuazione minimamente invasiva o aspirazione	Indicate trasfusione, procedure di radiologia interventistica o endoscopiche, o intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10019428
Evento tromboembolico	Trombosi venosa (ad es., trombosi superficiale)	Trombosi venosa (ad es., trombosi venosa profonda non complicata), indicato intervento medico	Trombosi (ad es., embolia polmonare [venosa] non complicata, trombi cardiaci murali non-embolici [arteriosi]), indicato intervento medico	Conseguenze potenzialmente letali (ad es., embolia polmonare, accidenti cerebrovascolari, insufficienza arteriosa), instabilità emodinamica o neurologica; indicato intervento urgente	Decesso	10043565
Flebite	–	Presente	–	–	–	10034879
Ipertensione	Pre-ipertensione (PA sistolica 120-139 mmHg o pressione diastolica 80-89 mmHg)	Ipertensione in stadio 1 (PA sistolica 140-159 mmHg o pressione diastolica 90-99 mmHg); indicato intervento medico; ricorrente o persistente (≥24 ore); aumento sintomatico >20 mmHg (diastolica) o >140 / 90 mmHg, se precedentemente entro i limiti della norma; indicata monoterapia. Pediatrica: ricorrente o persistente (≥24 ore) PA >LSN; indicata monoterapia	Ipertensione in stadio 2 (pressione sistolica ≥160 mmHg o diastolica ≥100 mmHg); indicato intervento medico; indicato più di un farmaco o una terapia più intensiva rispetto a quella precedentemente impiegata. Pediatrica: come gli adulti	Conseguenze potenzialmente letali (ad es., ipertensione maligna, deficit neurologici transitori o permanenti, crisi ipertensive); indicato intervento urgente. Pediatrica: come per gli adulti	Decesso	10020772
Ipotensione	Asintomatica, intervento non indicato	Indicato trattamento medico non urgente	Intervento medico o ospedalizzazione indicati	Potenzialmente letale è indicato un intervento urgente	Decesso	10021097
Ischemia delle arterie viscerali	–	Breve (<24 ore) episodio di ischemia trattato con intervento medico e senza deficit permanenti	Prolungato (≥24 ore) o con sintomi ricorrenti e/o indicato intervento invasivo	Conseguenze potenzialmente letali; evidenza di danno d'organo; indicato intervento chirurgico urgente	Decesso	10054692
Ischemia periferica	–	Breve (<24 ore) episodio di ischemia gestito non chirurgicamente e senza deficit permanenti	Ricorrente o prolungata (≥24 ore) e/o indicato intervento invasivo	Conseguenze potenzialmente letali; evidenza di danno d'organo; indicato intervento chirurgico urgente	Decesso	10034578

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Linfedema	Tracce di ispessimento o debole scolorimento	Marcata decolorazione cutanea; cute coriacea; formazione di papille; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10025233
Linfocele	Asintomatico; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatico; indicato intervento medico	Gravi sintomi; indicate radiologia interventistica, endoscopia o chirurgia d'elezione	–	–	10048642
Perdita linfatica	–	Sintomatica; indicato intervento medico	Gravi sintomi; indicate procedure di radiologia interventistica, endoscopia o chirurgia d'elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065773
Sindrome da aumentata permeabilità capillare	–	Sintomatico; indicato intervento medico	Sintomi gravi; indicato intervento	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10007196
Sindrome della vena cava superiore	Asintomatica; reperto casuale di trombosi della vena cava superiore	Sintomatica; indicato intervento medico (per esempio anticoagulanti, radioterapia o chemioterapia)	Gravi sintomi; indicato intervento multimodale (ad es., anticoagulanti, chemioterapia, radiazioni, posizionamento di uno stent)	Conseguenze potenzialmente letali; indicato intervento urgente multimodale (ad es., trombolisi, trombectomia, chirurgia)	Decesso	10042569
Tromboflebite superficiale	–	Presente	–	–	–	10042554
Vampate di calore	Sintomi lievi; intervento non indicato	Sintomi moderati; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10020407
Vasculite	Asintomatica, intervento non indicato	Sintomi moderati, indicato intervento medico	Gravi sintomi, indicato intervento medico (ad es., corticosteroidi)	Potenzialmente letale; evidenza di ischemia periferica o viscerale; indicato intervento urgente	Decesso	10047115
Disordini vascolari - Altro, specificare	Asintomatici o sintomi lievi; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicati interventi	Moderati; indicato intervento minimo, locale o non invasivo; limitazioni in rapporto all'età delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi o significativi dal punto di vista medico ma non immediatamente letali; indicata ospedalizzazione o prolungamento del ricovero in corso; invalidanti; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10047065

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Aritmia ventricolare	Asintomatica, intervento non indicato	Indicato trattamento medico non urgente	Indicato intervento medico	Conseguenze potenzialmente letali; compromissione emodinamica; è indicato un intervento urgente	Decesso	10047281
Arresto cardiaco	–	–	–	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10007515
Asistolia	Periodi di asistolia, indicato trattamento medico non urgente	–	–	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10003586
Blocco atrio-ventricolare completo	–	Indicato intervento non urgente	Sintomatica e non completamente controllata dal trattamento medico o controllata con dispositivo (ad es., pacemaker)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10003673
Blocco atrio-ventricolare di primo grado	Asintomatico, intervento non indicato	Indicato intervento non urgente	–	–	–	10003674
Bradycardia sinusale	Asintomatica, intervento non indicato	Sintomatico, indicato intervento medico	Grave, significativo dal punto di vista medico; indicato intervento medico	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10040741
Cardiomiopatia restrittiva	–	–	Insufficienza cardiaca sintomatica o altri sintomi cardiaci, responsivi ad un intervento	Scompenso cardiaco refrattario o altri sintomi cardiaci scarsamente controllati	Decesso	10038748
Disfunzione del ventricolo destro	Asintomatico con anomalie degli esami di laboratorio (ad es., BNP [Peptide B-Natriuretico]) o anomalie alla diagnostica per immagini cardiaca	Sintomi per attività o sforzo da lieve a moderato	Sintomi gravi, associati a ipossiemia, insufficienza cardiaca destra; indicata l'ossigenoterapia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente (ad es., dispositivo di assistenza ventricolare); indicazione al trapianto di cuore	Decesso	10058597
Disfunzione della valvola mitrale	Ispezzimento valvolare asintomatico con o senza lieve rigurgito valvolare o stenosi evidenziata dalla diagnostica per immagini	Asintomatica; insufficienza moderata o stenosi evidenziata dalla diagnostica per immagini	Sintomatica; grave insufficienza o stenosi evidenziata dalla diagnostica per immagini; sintomi controllati da intervento medico	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente (ad es., sostituzione della valvola, valvuloplastica)	Decesso	10061532

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Disfunzione della valvola polmonare	Ispessimento valvolare asintomatico con o senza lieve insufficienza valvolare o stenosi evidenziata dalla diagnostica per immagini	Asintomatica; insufficienza moderata o stenosi evidenziata dalla diagnostica per immagini	Sintomatica; grave insufficienza o stenosi evidenziata dalla diagnostica per immagini; sintomi controllati da intervento medico	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente (ad es., sostituzione della valvola, valvuloplastica)	Decesso	10061541
Disfunzione della valvola tricuspide	Ispessimento valvolare asintomatico con o senza lieve insufficienza valvolare o stenosi	Asintomatica; insufficienza moderata o stenosi evidenziata dalla diagnostica per immagini	Sintomatica; grave insufficienza o stenosi; sintomi controllati da intervento medico	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente (ad es., sostituzione della valvola, valvuloplastica)	Decesso	10061389
Disfunzione sistolica ventricolare sinistra	–	–	Sintomatico a causa della riduzione della frazione di eiezione, responsivo all'intervento	Scompenso cardiaco refrattario o scarsamente controllato a causa della riduzione della frazione di eiezione; indicati interventi quali dispositivo di assistenza ventricolare, supporto con vasopressori per via ev o trapianto di cuore	Decesso	10069501
Disturbi di conduzione	Sintomi lievi; intervento non indicato	Sintomi moderati	Sintomi gravi; intervento indicato	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10010276
Dolore toracico-cardiaco	Dolore lieve	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore a riposo; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10008481
Fibrillazione atriale	Asintomatica, intervento non indicato	Indicato trattamento medico non urgente	Sintomatica e non completamente controllata dal trattamento medico o controllata con dispositivo (ad es., pacemaker) o con ablazione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10003658
Fibrillazione ventricolare	–	–	–	Conseguenze potenzialmente letali; compromissione emodinamica; è indicato un intervento urgente	Decesso	10047290
Flutter atriale	Asintomatico, intervento non indicato	Indicato trattamento medico non urgente	Sintomatico e non completamente controllato dal trattamento medico o controllato con dispositivo (ad es., pacemaker) o con ablazione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10003662

Infarto del miocardio	–	Asintomatico con enzimi cardiaci lievemente anormali e nessuna evidenza di alterazioni di natura ischemica all'ECG	Sintomi gravi; enzimi cardiaci anormali; emodinamicamente stabile, le alterazioni dell'ECG sono coerenti con un quadro di infarto	Conseguenze potenzialmente letali; emodinamicamente instabile	Decesso	10028596
Malattia del nodo del seno	Asintomatica, intervento non indicato	Indicato intervento non urgente	Grave, significativo dal punto di vista medico; indicato intervento medico	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10040639
Malattia della valvola aortica	Ispessimento valvolare asintomatico, con o senza lieve rigurgito valvolare o stenosi evidenziata dalla diagnostica per immagini	Asintomatica; rigurgito moderato o stenosi evidenziata dalla diagnostica per immagini	Sintomatica; grave rigurgito o stenosi evidenziata dalla diagnostica per immagini; sintomi controllati con intervento medico	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente (ad es., sostituzione della valvola, valvuloplastica)	Decesso	10061589
Miocardite	Asintomatica con anomalie degli esami di laboratorio (ad es., BNP [Peptide B-Natriuretico]) o anomalie alla diagnostica per immagini cardiaca	Sintomi per attività o sforzo da lieve a moderato	Grave, con sintomi a riposo o per attività o sforzo minimi; indicato intervento	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente (ad es., terapia ev continua o supporto emodinamico meccanico)	Decesso	10028606
Mobitz tipo I	Asintomatico, intervento non indicato	Sintomatico; intervento medico indicato	Sintomatico e non completamente controllato da intervento medico o controllato con dispositivo (ad es., pacemaker)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10027787
Mobitz tipo II - blocco atrio-ventricolare	Asintomatico, intervento non indicato	Sintomatico; intervento medico indicato	Sintomatico e non completamente controllato da intervento medico o controllato con dispositivo (ad es., pacemaker)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10027786
Palpitazioni	Sintomi lievi; intervento non indicato	Indicato intervento	–	–	–	10033557
Pericardite	Asintomatica, riscontri elettrocardiografici o obiettivi (ad es., sfregamento) coerenti con pericardite	Pericardite sintomatica (ad es., dolore toracico)	Pericardite con conseguenze fisiologiche (ad es., costrizione pericardica)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10034484
Pericardite costrittiva	–	–	Insufficienza cardiaca sintomatica o altri sintomi cardiaci, responsivi all'intervento	Scempenso cardiaco refrattario o altri sintomi cardiaci scarsamente controllati	Decesso	10010783
Scempenso cardiaco	Asintomatico con anomalie degli esami di laboratorio (ad es., BNP [Peptide B-Natriuretico]) o anomalie alla diagnostica per immagini cardiaca	Sintomi per attività o sforzo da lieve a moderato	Grave, con sintomi a riposo o per attività o sforzo minimi; indicato intervento	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente (ad es., terapia ev continua o supporto emodinamico meccanico)	Decesso	10019279

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Sindrome coronarica acuta	–	Angina sintomatica, progressiva; enzimi cardiaci nella norma; emodinamicamente stabile	Angina instabile sintomatica e/o infarto miocardico acuto, enzimi cardiaci anormali, emodinamicamente stabile	Angina instabile sintomatica e/o infarto miocardico acuto, enzimi cardiaci anormali, emodinamicamente instabile	Decesso	10051592
Sindrome di Wolff-Parkinson-White	Asintomatica, intervento non indicato	Indicato trattamento medico non urgente	Sintomatica e non completamente controllata con intervento medico o controllata con procedure	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10048015
Tachicardia atriale parossistica	Asintomatica, intervento non indicato	Sintomatica; trattamento medico indicato	Indicati farmaci ev	Conseguenze potenzialmente letali; non completamente controllato dal punto di vista medico; indicata la cardioversione	Decesso	10034040
Tachicardia sinusale	Asintomatica, intervento non indicato	Sintomatica; indicato trattamento medico non urgente	Indicato intervento medico urgente	–	–	10040752
Tachicardia sopraventricolare	Asintomatica, intervento non indicato	Indicato trattamento medico non urgente	Indicato intervento medico	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10042604
Tachicardia ventricolare	–	Indicato trattamento medico non urgente	Indicato intervento medico	Conseguenze potenzialmente letali; compromissione emodinamica; è indicato un intervento urgente	Decesso	10047302
Tamponamento pericardico	–	–	–	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10053565
Versamento pericardico	–	Versamento asintomatico, di entità da piccola a moderata	Versamento con conseguenze fisiologiche	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10034474
Disturbi cardiaci - Altro, specificare	Asintomatici o sintomi lievi; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicati interventi	Moderati; indicato intervento minimo, locale o non invasivo; limitazioni in rapporto all'età delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi o significativi dal punto di vista medico ma non immediatamente letali; indicata ospedalizzazione o prolungamento del ricovero in corso; invalidanti; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10007541

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Acidosi	pH <normale, ma $\geq 7,3$	–	pH <7,3	Conseguenze potenzialmente letali	Decesso	1000486
Alcalosi	pH >normale, ma $\leq 7,5$	–	pH >7,5	Conseguenze potenzialmente letali	Decesso	10001680
Anoressia	Perdita di appetito, senza alterazione delle abitudini alimentari	Alterata assunzione per os senza significativa perdita di peso o malnutrizione; indicati supplementi nutrizionali per os	Associata a significativa perdita di peso o malnutrizione (ad es., insufficiente apporto calorico e/o di liquidi per os); indicata nutrizione enterale o NPT	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10002646
Disidratazione	Indicato aumento dell'apporto idrico; membrane mucose secche; diminuito turgore della cute	Indicati liquidi ev per <di 24 ore	Indicati liquidi ev o l'ospedalizzazione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10012174
Intolleranza al glucosio	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; indicate modificazioni della dieta o terapia per os	Gravi sintomi; indicato il ricorso all'insulina	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10052426
Intolleranza all'alcool	–	Presente	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10001598
Ipercalcemia	Calcemia corretta >LSN-11,5 mg/dL; >LSN-2,9 mmol/L; calcio ionizzato >LSN-1,5 mmol/L	Calcemia corretta >11,5-12,5 mg/dL; >2,9-3,1 mmol/L; calcio ionizzato >1,5-1,6 mmol/L; sintomatica	Calcemia corretta >12,5-13,5 mg/dL; >3,1-3,4 mmol/L; calcio ionizzato >1,6-1,8 mmol/L; indicata l'ospedalizzazione	Calcemia corretta >13,5 mg/dL; >3,4 mmol/L; calcio ionizzato >1,8 mmol/L; conseguenze potenzialmente letali	Decesso	10020587
Ipercaliemia	>LSN-5,5 mmol/L	>5,5-6,0 mmol/L	>6,0-7,0 mmol/L; indicata l'ospedalizzazione	>7,0 mmol/L; conseguenze potenzialmente letali	Decesso	10020647
Iperglicemia	Valore della glicemia a digiuno >LSN-160 mg/dL; valore della glicemia a digiuno >LSN-8,9 mmol/L	Valore di glicemia a digiuno >160-250 mg/dL; valore di glicemia a digiuno >8,9-13,9 mmol/L	>250-500 mg/dL; >13,9-27,8 mmol/L; indicata l'ospedalizzazione	>500 mg/dL; >27,8 mmol/L; conseguenze potenzialmente letali	Decesso	10020639
Ipermagnesiemia	>LSN-3,0 mg/dL; >LSN-1,23 mmol/L	–	>3,0-8,0 mg/dL; >1,23-3,30 mmol/L	>8,0 mg/dL; >3,30 mmol/L; conseguenze potenzialmente letali	Decesso	10020670
Ipernatremia	>LSN-150 mmol/L	>150-155 mmol/L	>155-160 mmol/L; indicata l'ospedalizzazione	>160 mmol/L; conseguenze potenzialmente letali	Decesso	10020680
Ipertrigliceridemia	150 mg/dL-300 mg/dL; 1,71 mmol/L-3,42 mmol/L	>300 mg/dL-500 mg/dL; >3,42 mmol/L-5,7 mmol/L	>500 mg/dL-1000 mg/dL; >5,7 mmol/L-11,4 mmol/L	>1000 mg/dL; >11,4 mmol/L; conseguenze potenzialmente letali	Decesso	10020870

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Iperuricemia	>LSN-10 mg/dL; (0,59 mmol/L) senza conseguenze fisiologiche	–	>LSN-10 mg/dL; (0,59 mmol/L) con conseguenze fisiologiche	>10 mg/dL; >0,59 mmol/L; conseguenze potenzialmente letali	Decesso	10020907
Ipoalbuminemia	<LIN-3 g/dL; <LIN-30 g/L	<3-2 g/dL; <30-20 g/L	<2 g/dL; <20 g/L	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10020943
Ipocalcemia	Calcemia corretta <LIN-8,0 mg/dL; <LIN-2,0 mmol/L; calcio ionizzato <LIN-1,0 mmol/L	Calcemia corretta <8,0-7,0 mg/dL; <2,0- 1,75 mmol/L; calcio ionizzato <1,0-0,9 mmol/L; sintomatica	Calcemia corretta <7,0-6,0 mg/dL; <1,75-1,5 mmol/L; calcio ionizzato <0,9-0,8 mmol/L; indicata l'ospedalizzazione	Calcemia corretta <6,0 mg/dL, <1,5 mmol/L; calcio ionizzato <0,8 mmol/L; conseguenze potenzialmente letali	Decesso	10020949
Ipofosfatemia	<LIN-2,5 mg/dL; <LIN-0,8 mmol/L	<2,5-2,0 mg/dL; <0,8 -0,6 mmol/L	<2,0-1,0 mg/dL; <0,6-0,3 mmol/L	<1,0 mg/dL; <0,3 mmol/L; conseguenze potenzialmente letali	Decesso	10021059
Ipoglicemia	<LIN-55 mg/dL; <LIN-3,0 mmol/L	<55-40 mg/dL; <3,0 -2,2 mmol/L	<40-30 mg/dL; <2,2-1,7 mmol/L	<30 mg/dL; <1,7 mmol/L; conseguenze potenzialmente letali; crisi convulsive	Decesso	10021005
Ipomagnesiemia	<LIN-1,2 mg/dL; <LIN-0,5 mmol/L	<1,2-0,9 mg/dL; <0,5 -0,4 mmol/L	<0,9-0,7 mg/dL; <0,4-0,3 mmol/L	<0,7 mg/dL; <0,3 mmol/L; conseguenze potenzialmente letali	Decesso	10021028
Iponatriemia	<LIN-130 mmol/L	–	<130-120 mmol/L	<120 mmol/L; conseguenze potenzialmente letali	Decesso	10021038
Ipotassiemia	<LIN-3,0 mmol/L	<LIN-3,0 mmol/L; sintomatica; indicato intervento	<3,0-2,5 mmol/L; indicata l'ospedalizzazione	<2,5 mmol/L; conseguenze potenzialmente letali	Decesso	10021018
Obesità	–	BMI 25-29,9 kg/m ²	BMI 30-39,9 kg/m ²	BMI ≥40 kg/m ²		10029883
Sindrome da lisi tumorale	–	–	Presente	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10045152
Sovraccarico di ferro	–	Sintomi moderati; intervento non indicato	Sintomi gravi; indicato intervento	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065973
Disturbi del metabolismo e della nutrizione - Altro, specificare	Asintomatici o sintomi lievi; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicati interventi	Moderati; indicato intervento minimo, locale o non invasivo; limitazioni in rapporto all'età delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi ma non immediatamente letali; indicata ospedalizzazione o prolungamento del ricovero in corso; invalidanti; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10027433

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Anemia	Emoglobina (Hb) <LIN-10,0 g/dL; <LIN-6,2 mmol/L; <LIN-100 g/L	Hb <10,0-8,0 g/dL; <6,2-4,9 mmol/L; <100-80 g/L	Hb <8,0 g/dL; <4,9 mmol/L; trasfusione indicata	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10002272
Coagulazione intravascolare disseminata	–	Riscontro laboratoristico senza sanguinamento	Riscontro laboratoristico con sanguinamento	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10013442
Disturbi della milza	Riscontri accidentali (ad es., corpi di Howell-Jolly); lieve trombocitosi e leucocitosi	Indicata profilassi antibiotica	–	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10041633
Dolore linfonodale	Dolore lieve	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–		10025182
Emolisi	Emolisi evidente solo dagli esami di laboratorio (ad es., test all'antiglobulina diretto; DAT; Coombs; schistociti, riduzione dell'aptoglobina)	Evidenza di emolisi e riduzione dell'emoglobina ≥ 2 g	Trasfusione o interventi medici indicati (ad es., corticosteroidi)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10019491
Ipo cellularità del midollo osseo	Lieve ipo cellularità o riduzione $\leq 25\%$ della cellularità normale per l'età	Moderata ipo cellularità o riduzione $>25\%$ - $<50\%$ della cellularità normale per l'età	Grave ipo cellularità o riduzione $>50\%$ - $\leq 75\%$ della cellularità normale per l'età	Aplasia persistente per più di 2 settimane	Decesso	10048580
Leucocitosi	–	–	$>100.000/\text{mm}^3$	Manifestazioni cliniche di leucostasi; indicato intervento urgente	Decesso	10024378
Neutropenia febbrile	–	–	Neutrofili $<1000/\text{mm}^3$ con un singolo episodio di temperatura $>38,3$ °C o con una temperatura costante ≥ 38 °C per più di un'ora	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10016288
Porpora trombocitopenica	Segni di distruzione dei globuli rossi (schistocitosi) senza conseguenze cliniche	–	Evidenza dai test di laboratorio con conseguenze cliniche (ad es., insufficienza renale, petecchie)	Conseguenze potenzialmente letali, (per esempio, emorragie al SNC o tromboembolia o insufficienza renale)	Decesso	10043648
Sindrome emolitico-uremica	Segni di distruzione dei globuli rossi (schistocitosi) senza conseguenze cliniche	–	Evidenza dai test di laboratorio con conseguenze cliniche (ad es., insufficienza renale, petecchie)	Conseguenze potenzialmente letali, (per esempio, emorragie al SNC o tromboembolia o insufficienza renale)	Decesso	10019515
Disturbi del sistema emolinfopoietico - Altro, specificare	Asintomatici o sintomi lievi; osservazioni esclusivamente cliniche o da test diagnostici; non indicati interventi	Moderati; indicato intervento minimo, locale o non invasivo; limitazioni in rapporto all'età delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi ma non immediatamente letali; indicata ospedalizzazione o prolungamento del ricovero in corso; invalidanti; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10005329

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Colecistite	–	Sintomatica; indicato intervento medico	Gravi sintomi; indicate le procedure di radiologia interventistica, endoscopiche, o la chirurgia d'elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10008612
Dolore alla colecisti	Dolore lieve	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10017638
Dolore epatico	Dolore lieve	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10019705
Emorragia epatica	Lieve; intervento non indicato	Sintomatica; indicato intervento medico	Indicata trasfusione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10019678
Fistola biliare	–	Sintomatica, intervento non indicato	Grave alterazione della funzionalità gastrointestinale; indicata l'NPT; indicato l'intervento in endoscopia; indicato intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10004665
Fistola della colecisti	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica, intervento non indicato	Sintomatica o grave alterazione della funzionalità gastrointestinale; indicata l'NPT; indicate le procedure di radiologia interventistica, endoscopiche, o la chirurgia d'elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10017631
Insufficienza epatica	–	–	Asterixis; encefalopatia lieve; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Encefalopatia da moderata a grave; coma; conseguenze potenzialmente letali	Decesso	10019663
Ipertensione portale	–	Riduzione del flusso della vena porta	Flusso della vena porta invertito/retrogrado; associato a varici e/o ascite	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10036200
Necrosi della colecisti	–	–	–	Conseguenze potenzialmente letali; indicata radiologia interventistica o intervento chirurgico	Decesso	10059446

Necrosi epatica	–	–	–	Conseguenze potenzialmente letali; indicazione a procedure di radiologia interventistica o ad intervento chirurgico	Decesso	10019692
Ostruzione della colecisti	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; alterata funzionalità gastrointestinale; indicati liquidi ev per <24 ore	Sintomatica e grave alterazione della funzione gastrointestinale; indicata la nutrizione enterale, l'NPT o l'ospedalizzazione; indicato intervento chirurgico non in emergenza	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10017636
Perforazione del dotto biliare	–	–	Indicare le procedure di radiologia interventistica, endoscopiche, o la chirurgia d'elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10034405
Perforazione della colecisti	–	–	–	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10017639
Stenosi del dotto biliare	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica, alterata funzionalità gastrointestinale; indicati liquidi ev per <24 ore	Grave alterazione della funzionalità gastrointestinale; indicate le procedure di radiologia interventistica, endoscopiche, o la chirurgia d'elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10051341
Trombosi portale	–	Intervento non indicato	Indicato intervento medico	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10036206
Disturbi del sistema epato-biliare - Altro, specificare	Asintomatici o sintomi lievi; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicati interventi	Moderati; indicato intervento minimo, locale o non invasivo; limitazioni in rapporto all'età delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi o significativi dal punto di vista medico ma non immediatamente letali; indicata ospedalizzazione o prolungamento del ricovero in corso; invalidanti; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10019805

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Anafilassi	–	–	Broncospasmo sintomatico, con o senza orticaria; indicato trattamento parenterale; edema/angioedema di natura allergica; ipotensione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10002218
Malattia da siero	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Artralgia moderata, febbre, rash, orticaria, indicati antistaminici	Grave artralgia o artrite; rash esteso; indicati steroidi o liquidi ev	Conseguenze potenzialmente letali; indicato supporto pressorio o ventilatorio	Decesso	10040400
Reazione autoimmune	Asintomatica; sierologia positiva o altra evidenza di reazione autoimmune, con normale funzione d'organo; intervento non indicato	Evidenza di reazione autoimmune che coinvolge un organo o una funzione non essenziali (ad es., ipotiroidismo)	Reazioni autoimmuni che coinvolgono organi maggiori (ad es., colite, anemia, miocardite, nefrite)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10061664
Reazioni allergiche	Transitorie vampate o eruzioni cutanee, febbre da farmaco <38 °C (<100,4 °F); intervento non indicato	Indicato intervento o interruzione dell'infusione; risponde prontamente a trattamento sintomatico (ad es., antistaminici, FANS, sedativi), indicata profilassi farmacologica per ≤24 ore	Prolungata (ad es., non rapidamente responsiva ai farmaci sintomatici e/o alla breve interruzione dell'infusione); ripresa dei sintomi dopo un iniziale miglioramento; indicata ospedalizzazione per le possibili sequele (per es. insufficienza renale, infiltrati polmonari)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10001718
Sindrome da rilascio di citochine	Lieve reazione; interruzione dell'infusione non indicata; intervento non indicato	Indicata interruzione della terapia o dell'infusione ma risponde prontamente a trattamento sintomatico (ad es., antistaminici, FANS, sedativi, liquidi e.v.), indicata profilassi farmacologica per ≤24 ore	Prolungata (ad es., non rapidamente responsiva ai farmaci sintomatici e/o alla breve interruzione dell'infusione); ripresa dei sintomi dopo un iniziale miglioramento; indicata l'ospedalizzazione per le possibili sequele (per es. insufficienza renale, infiltrati polmonari)	Conseguenze potenzialmente letali; indicato supporto pressorio o ventilatorio	Decesso	10052015
Disturbi del sistema immunitario - Altro, specificare	Asintomatici o sintomi lievi; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicati interventi	Moderati; indicato intervento minimo, locale o non invasivo; con limitazioni in rapporto all'età delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi o significativi dal punto di vista medico ma non immediatamente letali; indicata ospedalizzazione o prolungamento del ricovero in corso; invalidanti; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10021428

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Acatisia	Lieve irrequietezza o aumento dell'attività motoria	Moderata irrequietezza o aumentata attività motoria; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Grave irrequietezza o aumentata attività motoria; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10001540
Afonia	–	–	Manca di voce; impossibilità a parlare	–	–	10002953
Amnesia	Lieve; perdita di memoria transitoria	Moderata; perdita della memoria a breve termine; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Grave; perdita della memoria a lungo termine; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10001949
Apoplessia	Crisi breve e parziale, senza perdita di coscienza	Breve crisi generalizzata	Multiple crisi nonostante l'intervento medico	Conseguenze potenzialmente letali; convulsioni prolungate ripetitive	Decesso	10039906
Aracnoidite	Lievi sintomi	Sintomi moderati; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10003074
Atassia	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomi moderati; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); indicata assistenza meccanica	–	–	10003591
Attacchi ischemici transitori (TIA)	Lieve deficit neurologico, confermato o meno dalla diagnostica per immagini	Deficit neurologico moderato con o senza imaging di conferma	–	–	–	10044391
Compromissione della concentrazione	Lieve disattenzione o diminuzione del livello di concentrazione	Moderata disattenzione o diminuzione del livello di concentrazione; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Grave insufficienza dell'attenzione o diminuzione del livello di concentrazione; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10010250
Debolezza dei muscoli facciali	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomi moderati; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10051272

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Depressione del livello di coscienza	Diminuito livello di allerta	Sedazione; lenta risposta agli stimoli; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Difficile da risvegliare	Conseguenze potenzialmente letali	Decesso	10012373
Deterioramento della memoria	Lieve deterioramento della memoria	Moderata compromissione della memoria; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Grave compromissione della memoria; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10027175
Disartria	Lieve farfugliamento	Difficoltà di articolazione della parola o farfugliamento moderati	Compromissione di articolazione della parola o farfugliamento gravi	–	–	10013887
Disestesia	Lieve alterazione sensoriale	Moderate alterazioni sensoriali; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Grave alterazione sensoriale; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10062872
Disfasia	Consapevolezza delle caratteristiche ricettive o espressive; capacità di comunicare conservata	Moderate alterazioni delle caratteristiche ricettive o espressive; compromissione della capacità di comunicare spontaneamente	Gravi alterazioni delle caratteristiche ricettive o espressive; compromissione della capacità di leggere, scrivere o comunicare in modo comprensibile	–	–	10013951
Disgeusia	Alterazioni del gusto, ma nessun cambiamento nella dieta	Alterazioni del gusto con cambiamenti nella dieta (ad es., integratori orali); gusto cattivo o sgradevole; perdita del gusto	–	–	–	10013911
Disturbi cognitivi	Disabilità cognitiva lieve; non interferisce con lavoro/scuola/attività normali; non indicati dispositivi/servizi educazionali specializzati	Deterioramento cognitivo moderato; interferenza con lavoro/scuola/attività della vita ma capace di vita autonoma; indicato il ricorso ad aiuti specializzati per parte del tempo	Gravi disabilità cognitive; significativa compromissione di lavoro/scuola/attività quotidiane	–	–	10009845
Disturbi del nervo trigemino	Asintomatici; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomi moderati; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10060890

Disturbi del nervo vago	Asintomatici; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomi moderati; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10061403
Disturbi extrapiramidali	Lievi movimenti involontari	Moderati movimenti involontari; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi movimenti involontari o torcicollo; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10015832
Disturbo del IV nervo cranico	Asintomatico; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomi moderati; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10065836
Disturbo del nervo abducente	Asintomatico; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomi moderati; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10053662
Disturbo del nervo accessorio	Asintomatico; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomi moderati; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10060929
Disturbo del nervo acustico non specificato	Asintomatico; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomi moderati; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10000521
Disturbo del nervo facciale	Asintomatico; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomi moderati; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10061457
Disturbo del nervo glossofaringeo	Asintomatico; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomi moderati; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10061185
Disturbo del nervo ipoglosso	Asintomatico; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomi moderati; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10061212
Disturbo del nervo oculomotore	Asintomatico; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomi moderati; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10053661

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Disturbo del nervo olfattivo	–	Sintomi moderati; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10056388
Dolore dell'arto fantasma	Dolore lieve	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10056238
Dolore sinusale	Dolore lieve	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10040747
Edema cerebrale	–	–	–	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	–	10014217
Emorragia intracranica	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomi moderati; indicato intervento medico	Indicazione a ventricolostomia, monitoraggio della pressione intracranica, trombolisi intraventricolare o intervento chirurgico	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10022763
Encefalopatia	Lievi sintomi	Sintomi moderati; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10014625
Fuoriuscita del fluido cerebrospinale	Post-craniotomia: asintomatica; dopo puntura lombare: cefalea transitoria; indicato il trattamento posturale	Post-craniotomia: sintomi moderati; indicato intervento medico; dopo puntura lombare: moderati sintomi persistenti; indicato patch ematico	Gravi sintomi; indicato intervento medico	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10008164
Ictus emorragico	Asintomatico o deficit neurologico lieve; solo reperti radiografici	Moderato deficit neurologico	Grave deficit neurologico	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10042244
Iidrocefalia	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomi moderati; intervento non indicato	Sintomi gravi o deficit neurologici; indicato intervento	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10020508
Ipersonnia	Lieve aumento del bisogno di sonno	Moderato aumento del bisogno di sonno	Importante aumento del bisogno di sonno	–	–	10020765

Ischemia cerebrale	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomi moderati	–	–	–	10023030
Letargia	Lievi sintomi; riduzione della vigilanza e del grado di consapevolezza	Sintomi moderati; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	–	–	–	10024264
Leucoencefalopatia	Asintomatica; piccole iperintensità T2/FLAIR focali; coinvolgimento della sostanza bianca periventricolare o di <1/3 delle aree sensibili del cervello +/- lieve aumento dello spazio subaracnoideo (SAS) e/o lieve ventricolomegalia	Sintomi moderati; iperintensità focali T2/FLAIR, coinvolgenti la sostanza bianca periventricolare con estensione al nucleo semiovale o coinvolgenti da 1/3 a 2/3 delle aree sensibili del cervello, associate o meno a moderato aumento del SAS e/o a moderata ventricolomegalia	Gravi sintomi; iperintensità estese T2/FLAIR, coinvolgenti la sostanza bianca periventricolare per due terzi o più delle aree sensibili del cervello; associazione o meno ad aumento del SAS da moderato a grave e/o da moderata a grave ventricolomegalia	Conseguenze potenzialmente letali; estese iperintensità T2/FLAIR, che coinvolgono la sostanza bianca periventricolare e la maggior parte delle aree sensibili del cervello con o senza aumento del SAS da moderato a grave e/o da moderata a grave ventricolomegalia	Decesso	10024382
Mal di testa	Dolore lieve	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10019211
Meningismo	Lievi sintomi	Sintomi moderati; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10027198
Mielite	Asintomatica; lievi segni (ad es., riflesso di Babinski o segno di Lhermitte)	Moderata debolezza o perdita di sensibilità; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Grave debolezza o perdita di sensibilità; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10028524
Movimenti involontari	Lievi sintomi	Sintomi moderati; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10028041
Necrosi del sistema nervoso centrale	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomi moderati; indicati corticosteroidi	Gravi sintomi; indicato intervento medico	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065784
Neuropatia periferica motoria	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomi moderati; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); indicato dispositivo ausiliario	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10034580

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Neuropatia sensoriale periferica	Asintomatica; perdita dei riflessi tendinei profondi o parestesie	Sintomi moderati; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10034620
Neuralgia	Dolore lieve	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10029223
Nistagmo	–	Sintomi moderati; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10029864
Paralisi del nervo laringeo ricorrente	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomi moderati	Gravi sintomi; indicato intervento medico (ad es., tiroplastica, iniezione nelle corde vocali)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10038130
Parestesia	Lievi sintomi	Sintomi moderati; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10033987
Plessopatia brachiale	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomi moderati; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10065417
Presincope	–	Presente (ad es., quasi svenimento)	–	–	–	10036653
Radicolite	Lievi sintomi	Sintomi moderati; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1); indicato intervento medico	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10061928
Reazione vasovagale	–	–	Presente	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10047166
Sincope	–	–	Svenimento; collasso in ortostatismo	–	–	10042772

Sindrome da leucoencefalopatia posteriore reversibile	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomi anomali moderati; studi di imaging anormali; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; severe anomalie agli studi di imaging; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10063761
Sindrome piramidale	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomi moderati; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10063636
Sonnolenza	Lieve, ma presenza di torpore o sonnolenza superiori al normale	Moderata sedazione; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Ottundimento o stupore	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10041349
Spasticità	Lieve o moderato aumento del tono muscolare	Moderato aumento del tono muscolare e aumento della resistenza nel range di movimento	Grave aumento del tono muscolare e aumento della resistenza nel range di movimento	Conseguenze potenzialmente letali; incapace di movimenti attivi o passivi	Decesso	10041416
Tremore	Lievi sintomi	Sintomi moderati; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10044565
Vertigine	Lieve instabilità o sensazione di movimento	Moderata instabilità o sensazione di movimento; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Grave instabilità o sensazione di movimento; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10013573
Disturbi del sistema nervoso - Altro, specificare	Asintomatici o sintomi lievi; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Moderati; indicato intervento minimo, locale o non invasivo; limitazioni in rapporto all'età delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi o significativi dal punto di vista medico ma non immediatamente letali; indicata ospedalizzazione o prolungamento del ricovero in corso; invalidanti; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10029205

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Atrofia mammaria	Minima asimmetria; atrofia minima	Moderata asimmetria; atrofia moderata	Asimmetria > 1/3 del volume del seno; grave atrofia	–	–	10006179
Azoospermia	–	–	Assenza di spermatozoi nel liquido seminale	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10003883
Debolezza muscolare del pavimento pelvico	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica, non interferisce con la funzione vescicale, intestinale o vaginale; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10064026
Deformità dei capezzoli	Asintomatica; asimmetria con retrazione lieve e/o ispessimento del complesso areola-capezzolo	Sintomatica; asimmetria del complesso areola-capezzolo con retrazione moderata e/o ispessimento del complesso areola-capezzolo	–	–	–	10065823
Disfunzione erettile	Riduzione della funzione erettile (frequenza o rigidità delle erezioni), ma nessun intervento è indicato (ad es., farmaci o utilizzo di dispositivi meccanici, pompa peniena)	Diminuzione della funzione erettile (frequenza/rigidità delle erezioni), indicati interventi per favorire l'erezione (ad es., farmaci o dispositivi meccanici quali la pompa peniena)	Riduzione della funzione erettile (frequenza/rigidità delle erezioni), nessuna utilità degli interventi adottati (ad es., farmaci o pompa peniena); indicato il posizionamento di una protesi peniena permanente (prima assente)	–	–	10061461
Dismenorrea	Sintomi lievi; intervento non indicato	Sintomi moderati; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10013934
Dispareunia	Lieve fastidio o dolore associato alla penetrazione vaginale; disagio alleviato dall'utilizzo di lubrificanti vaginali o estrogeni	Moderato fastidio o dolore associato alla penetrazione vaginale; fastidio o dolore parzialmente alleviato con l'uso di lubrificanti vaginali o estrogeni	Grave disagio o dolore associato alla penetrazione vaginale; disagio o dolore non risolto con lubrificanti vaginali o estrogeni	–	–	10013941
Disturbi dell'allattamento	Lievi modifiche nell'allattamento, non incide in modo significativo sulla produzione di latte materno	Cambiamenti nella lattazione, con influenza significativa sulla produzione di latte materno	–	–	–	10061261
Disturbi dell'eiaculazione	Diminuzione dell'eiaculazione	Aneiaculazione o eiaculazione retrograda	–	–	–	10014326

Disturbi testicolari	Asintomatici; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatici, ma non interferiscono con la minzione o le attività sessuali; intervento non indicato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; interferiscono con la minzione o la funzione sessuale; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); indicato intervento	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10043306
Dolore al pene	Dolore lieve	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10034310
Dolore mammario	Dolore lieve	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10006298
Dolore ovulatorio	Dolore lieve	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10033314
Dolore pelvico	Dolore lieve	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10034263
Dolore perineale	Dolore lieve	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10061339
Dolore prostatico	Dolore lieve	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10036968
Dolore scrotale	Dolore lieve	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10039757
Dolore testicolare	Dolore lieve	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10043345
Dolore uterino	Dolore lieve	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10046809

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Dolore vaginale	Dolore lieve	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10046937
Edema genitale	Lieve gonfiore o mascheramento della architettura anatomica a una ispezione accurata	Evidente mascheramento dell'architettura anatomica; obliterazione delle pieghe cutanee; evidente deviazione dal normale profilo anatomico	Linforea; importante cambiamento del normale profilo anatomico; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10018146
Emorragia del cordone spermatico	Minimo sanguinamento individuato durante un esame di diagnostica per immagini; intervento non indicato	Moderato sanguinamento; indicato intervento medico	Grave emorragia; indicata trasfusione; indicate procedure di radiologia interventistica o endoscopiche	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10065762
Emorragia ovarica	Minimo sanguinamento individuato durante un esame radiologico o in laparoscopia; intervento non indicato	Moderato sanguinamento; indicato intervento medico	Grave emorragia; indicata trasfusione; indicate procedure di radiologia interventistica o endoscopiche	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10065763
Emorragia prostatica	Minimo sanguinamento individuato durante un esame di diagnostica per immagini; intervento non indicato	Moderato sanguinamento; indicato intervento medico	Grave emorragia; indicata trasfusione; indicate procedure di radiologia interventistica o endoscopiche	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10055325
Emorragia testicolare	Minimo sanguinamento individuato durante un esame di diagnostica per immagini; intervento non indicato	Moderato sanguinamento; indicato intervento medico	Grave emorragia; indicata trasfusione; indicate procedure di radiologia interventistica o endoscopiche	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10055347
Emorragia uterina	Minimo sanguinamento individuato durante un esame di diagnostica per immagini; intervento non indicato	Moderato sanguinamento; indicato intervento medico	Grave emorragia; indicata trasfusione; indicate procedure di radiologia interventistica o endoscopiche	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10046789
Emorragia vaginale	Minimo sanguinamento individuato all'esame clinico o di diagnostica per immagini; intervento non indicato	Moderato sanguinamento; indicato intervento medico	Grave emorragia; indicata trasfusione; indicate procedure di radiologia interventistica o endoscopiche	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10046912
Ematosalpinge	Minimo sanguinamento individuato durante un esame radiologico o in laparoscopia; intervento non indicato	Moderato sanguinamento; indicato intervento medico	Grave emorragia; indicata trasfusione; indicate procedure di radiologia interventistica o endoscopiche	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10060602
Femminilizzazione acquisita	Sintomi lievi; intervento non indicato	Sintomi moderati; indicato intervento medico	–	–	–	10054382

Fistola dell'apparato genitale femminile	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; intervento non indicato	Sintomatica, intervento non indicato	Gravi sintomi; indicato intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10061149
Fistola uterina	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; intervento non indicato	Sintomatica, intervento non indicato	Gravi sintomi; indicato intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065811
Fistola vaginale	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica, intervento non indicato	Gravi sintomi; indicato intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065813
Ginecomastia	Ingrandimento asintomatico della mammella	Sintomatica (ad es., dolore o impatto psicosociale)	Gravi sintomi; indicato intervento chirurgico in elezione	–	–	10018801
Infiammazione vaginale	Lieve fastidio o dolore, edema o arrossamento	Moderato fastidio o dolore, edema o arrossamento; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Grave disagio o dolore, edema, o arrossamento; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); piccole aree di ulcerazione della mucosa	Diffuse aree di ulcerazione della mucosa; conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10046916
Irregolarità del ciclo mestruale	Mestruazioni irregolari con amenorrea di durata non superiore a 1-3 mesi	Mestruazioni irregolari con amenorrea per più di 4-6 mesi	Amenorrea persistente per più di 6 mesi	–	–	10022992
Menopausa precoce	–	–	Presente	–	–	10036601
Menorragia	Lieve; integratori di ferro indicati	Sintomi moderati; indicato intervento medico (ad es. ormoni)	Grave; indicata trasfusione; indicato intervento chirurgico (ad es. isterectomia)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10027313
Oligospermia	Concentrazione di spermatozoi >48 milioni/mL o con motilità >68%	Conta spermatica 13-48 milioni/mL o motilità 32-68%	Concentrazione di spermatozoi <13 milioni/mL o motilità <32%	–	–	10030300
Ostruzione uterina	Solo osservazione diagnostica, intervento non indicato	Lievi sintomi; indicato intervento in elezione	Gravi sintomi; indicato intervento chirurgico in elezione	–	–	10065928
Ostruzione del cordone spermatico	Solo osservazione diagnostica, intervento non indicato	Lievi sintomi; indicato intervento in elezione	Gravi sintomi; indicato intervento chirurgico in elezione	–	–	10065805
Ostruzione della tuba di Falloppio	Solo osservazioni diagnostiche, non è indicato un intervento	Lievi sintomi; indicato intervento in elezione	Gravi sintomi; indicato intervento chirurgico in elezione	–	–	10065789
Ostruzione prostatica	Solo osservazione diagnostica, intervento non indicato	Lievi sintomi; indicato intervento in elezione	Gravi sintomi; indicato intervento chirurgico in elezione	–	–	10055026

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Ostruzione vaginale	Solo osservazione diagnostica, intervento non indicato	Lievi sintomi; indicato intervento in elezione	Gravi sintomi; indicato intervento chirurgico in elezione	– –	–	10065817
Perdite vaginali	Lievi perdite vaginali (maggiori rispetto alla condizione basale della paziente)	Da moderate a forti perdite vaginali, indicato uso di assorbente o tampone perineale	–	–	–	10046901
Perforazione vaginale	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica, intervento non indicato	Gravi sintomi; indicato intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065818
Rottura ovarica	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; intervento non indicato	Sintomatica, intervento non indicato	Indicate trasfusione, procedure di radiologia interventistica/endoscopiche, o intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10033279
Secchezza vaginale	Lieve secchezza vaginale che non interferisce con la funzione sessuale	Moderata secchezza vaginale che interferisce con la funzione sessuale o causa frequente disagio	Grave secchezza vaginale con conseguente dispareunia o grave disagio	–	–	10046904
Stenosi della tuba di Falloppio	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; intervento non indicato	Sintomatica, intervento non indicato	Gravi sintomi; indicato intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente (ad es., la resezione d'organo)	Decesso	10065791
Stenosi vaginale	Asintomatica; lieve accorciamento o restringimento vaginale	Restringimento vaginale e/o accorciamento che non interferisce con l'esame obiettivo	Restringimento vaginale e/o accorciamento che interferisce con l'uso di tamponi, l'attività sessuale o l'esame fisico	–	Decesso	10053496
Vaginismo	Lieve fastidio o dolore associato a spasmo/contrazione vaginale: nessun impatto sulla funzione sessuale o all'esame obiettivo	Fastidio moderato o dolore associato a spasmo/contrazione vaginale; interruzione della funzione sessuale e dell'esame obiettivo	Grave disagio o dolore associato a spasmo/contrazione vaginale, incapace di tollerare la penetrazione vaginale o l'esame fisico	–	–	10046947
Disturbi dell'apparato riproduttivo e della mammella - Altro, specificare	Asintomatici o sintomi lievi; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicati interventi	Moderati; indicato intervento minimo, locale o non invasivo; con limitazioni, in rapporto all'età, delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi o significativi dal punto di vista medico ma non immediatamente letali; indicata ospedalizzazione o prolungamento del ricovero in corso; invalidanti; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10038604

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Alterazione del colore delle urine	Presente	–	–	–	–	10046628
Calcolosi renale	Asintomatica o sintomi lievi; indicato l'uso occasionale di analgesici da banco	Sintomatici; indicati antiemetici per os; indicati analgesici da banco a orari fissi durante la giornata o qualsiasi analgesico narcotico per os	Indicata l'ospedalizzazione; farmaci ev (ad es., analgesici, antiemetici); indicate procedure endoscopiche o di radiologia interventistica	Conseguenze potenzialmente letali; indicazione urgente a procedure di radiologia interventistica, endoscopiche o a intervento chirurgico	Decesso	10038385
Cistite non infettiva	Ematuria microscopica; minimo aumento della frequenza della minzione, urgenza minzionale, disuria, o nicturia; incontinenza di nuova insorgenza	Moderata ematuria; moderato aumento nella frequenza/urgenza della minzione, disuria, nicturia o incontinenza; posizionamento del catetere urinario o indicazione all'irrigazione vescicale; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Ematuria macroscopica; indicati trasfusione, farmaci ev o l'ospedalizzazione; indicate endoscopia, radiologia interventistica, o chirurgia d'elezione	Conseguenze potenzialmente letali; indicazione urgente a procedure di radiologia interventistica o a intervento chirurgico	Decesso	10063057
Colica renale	Dolore lieve che non interferisce con l'attività; indicato il ricorso a farmaci da banco	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1); indicata prescrizione di farmaci	Indicata l'ospedalizzazione; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10038419
Danno renale acuto	Aumento del livello di creatinina di più di 0,3 mg/dL; creatinina 1,5-2,0 x al di sopra del livello basale	Creatinina 2-3 x al di sopra del valore basale	Creatinina >3 x il basale o >4,0 mg/dL; indicata l'ospedalizzazione	Conseguenze potenzialmente letali; indicata la dialisi	Decesso	10069339
Dolore a livello dell'apparato urinario	Dolore lieve	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10062225
Ematuria	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; indicati il catetere urinario o l'irrigazione della vescica; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Ematuria macroscopica; indicati trasfusione, farmaci ev o l'ospedalizzazione; indicate endoscopia, radiologia interventistica o chirurgia d'elezione; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Conseguenze potenzialmente letali; indicazione urgente a procedure di radiologia interventistica o a intervento chirurgico	Decesso	10019450

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Emoglobinuria	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	–	–	–	–	10019489
Emorragia renale	Sintomi lievi; intervento non indicato	Analgesici e controllo dell'ematocrito indicati	Indicate trasfusione, radiazioni o ospedalizzazione; indicate procedure endoscopiche o di radiologia interventistica o chirurgia d'elezione	Conseguenze potenzialmente letali; indicazione urgente a procedure di radiologia interventistica o a intervento chirurgico	Decesso	10038463
Fistola urinaria	–	Indicato intervento non invasivo; indicato posizionamento di catetere urinario o sovrapubico	Limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); indicate procedure endoscopiche o di radiologia interventistica o chirurgia d'elezione; indicata diversione urinaria permanente	Conseguenze potenzialmente letali; indicazione urgente a procedure di radiologia interventistica o a intervento chirurgico	Decesso	10065368
Incontinenza urinaria	Occasionale (ad es., con tosse, starnuti, ecc), non indicato l'utilizzo di pannoloni	Spontanea; indicati pannoloni; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Indicato intervento (ad es., clampatura, iniezioni di collagene); indicato intervento chirurgico; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10046543
Malattia renale cronica	eGFR (tasso stimato della filtrazione glomerulare) o CrCl (clearance della creatinina) <LIN-60 ml/min/1,73 m ² o presenza di proteinuria 2+; rapporto proteine urinarie/creatinina >0,5	eGFR o CrCl 59-30 ml/min/1,73 m ²	eGFR o CrCl 29-15 ml/min/1,73 m ²	eGFR o CrCl <15 ml/min/1,73 m ² ; indicati la dialisi o il trapianto renale	Decesso	10064848
Minzione frequente	Presente	Limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1); indicata trattamento medico	–	–	–	10046593
Ostruzione a livello dell'apparato urinario	Asintomatica; solo osservazioni cliniche o diagnostiche	Sintomatica ma non idronefrosi, sepsi o disfunzione renale; indicati la dilatazione uretrale, il catetere urinario o sovrapubico	Sintomatica e con funzione d'organo alterata (ad es., idronefrosi o disfunzione renale); indicata radiologia interventistica d'elezione, endoscopia o intervento chirurgico	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10061574

Perforazione della vescica	–	Perforazione extraperitoneale, indicato catetere a permanenza	Perforazione intraperitoneale; indicate radiologia interventistica, endoscopia o chirurgia d'elezione	Conseguenze potenzialmente letali; insufficienza d'organo; indicato l'intervento chirurgico urgente	Decesso	10063575
Pollachiuria	Presente	Limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1); terapia medica indicata	–	–	–	10046539
Proteinuria	Proteinuria 1 + proteinuria <1,0 g/24 ore	Adulti: proteinuria 2 + proteine urinarie 1,0 -3,4 g/24 ore; Pz pediatrici: rapporto urinario P/C (proteina/creatinina) di 0,5-1,9	Adulti: proteinuria ≥3,5 g/24 ore; pazienti pediatrici: rapporto urinario P/C >1,9	–	–	10037032
Ritenzione urinaria	Non indicato il posizionamento di catetere urinario, sovrapubico o intermittente; in grado di mingere con qualche residuo	Indicato posizionamento di un catetere urinario, sovrapubico o intermittente; indicata terapia farmacologica	Indicato intervento chirurgico in elezione o procedura di radiologia interventistica; perdita sostanziale di funzionalità o di massa del rene coinvolto	Conseguenze potenzialmente letali; insufficienza d'organo; indicato intervento chirurgico urgente	Decesso	10046555
Spasmo vescicale	Intervento non indicato	Indicati antispastici	Indicata l'ospedalizzazione	–	–	10048994
Disturbi dell'apparato urinario - Altro, specificare	Asintomatici o sintomi lievi; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicati interventi	Moderati, indicato intervento locale o non invasivo; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi o significativi dal punto di vista medico ma non immediatamente letali; indicata ospedalizzazione o prolungamento del ricovero in corso; invalidanti; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10038359

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Disturbi vestibolari	–	Sintomatico; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10047386
Dolore all'orecchio	Dolore lieve	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10014020
Dolore all'orecchio esterno	Dolore lieve	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10065785
Inflammatione dell'orecchio esterno	Otite esterna con eritema o desquamazione secca	Otite esterna, con desquamazione umida, edema, aumento o fuoriuscita di cerume; perforazione della membrana timpanica; timpanostomia	Otite esterna con mastoidite; stenosi o osteomielite; necrosi del tessuto molle o ossea	Indicato intervento chirurgico urgente	Decesso	10065837
Inflammatione dell'orecchio medio	Otite sierosa	Otite sierosa, indicato intervento medico	Mastoidite; necrosi dei tessuti molli del canale uditivo o del tessuto osseo	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	–	10065838
Ipoacusia	<p>Adulti inseriti in un programma di monitoraggio (con audiogrammi a 1, 2, 3, 4 e 8 kHz): spostamento di soglia di 15-25 dB in media a 2 frequenze contigue del test in almeno un orecchio</p> <p>Adulti non inseriti in un programma di monitoraggio: variazione soggettiva dell'udito in assenza di una ipoacusia documentata</p> <p>Pediatrico (con audiogrammi a 1, 2, 3, 4, 6 e 8 kHz): spostamento della soglia >20 dB a 8 kHz in almeno un orecchio</p>	<p>Adulti inseriti in un programma di monitoraggio (con audiogrammi a 1, 2, 3, 4, 6 e 8 kHz): spostamento di soglia >25 dB in media a 2 frequenze contigue del test in almeno un orecchio</p> <p>Adulti non inseriti in un programma di monitoraggio: ipoacusia, non e indicato l'apparecchio acustico o l'intervento; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)</p> <p>Pediatrico (con audiogrammi a 1, 2, 3, 4, 6 e 8 kHz): spostamento della soglia >20 dB a 4 kHz e superiori in almeno un orecchio</p>	<p>Adulti inseriti in un programma di monitoraggio (con audiogrammi a 1, 2, 3, 4, 6 e 8 kHz): spostamento di soglia >25 dB in media a 3 frequenze contigue del test in almeno un orecchio; indicato intervento terapeutico</p> <p>Adulti non inseriti in un programma di monitoraggio: ipoacusia con indicazione all'apparecchio acustico o all'intervento; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)</p> <p>Pediatrico (con audiogrammi a 1, 2, 3, 4, 6 e 8 kHz): spostamento della soglia >20 dB a 4 kHz e superiori in almeno un orecchio; indicato intervento terapeutico,</p>	<p>Adulti: ipoacusia bilaterale profonda (soglia assoluta >80 dB a 2 kHz e superiori); danni irreparabili all'udito.</p> <p>Pediatrico: indicazione all'impianto cocleare e indicazione a supporti aggiuntivi al linguaggio</p>	–	10019245

			compresi apparecchi acustici; spostamento della soglia >20 dB a 3 kHz e superiori in almeno un orecchio; indicazione a supporti aggiuntivi al linguaggio			
Tinnito	Sintomi lievi; intervento non indicato	Sintomi moderati; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	—	—	10043882
Vertigine	Sintomi lievi	Sintomi moderati; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	—	—	10047340
Disturbi dell'orecchio e del labirinto - Altro, specificare	Asintomatici o sintomi lievi; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicati interventi	Moderati; indicato intervento minimo, locale o non invasivo; limitazioni in rapporto all'età delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi o significativi dal punto di vista medico ma non immediatamente letali; indicata ospedalizzazione o prolungamento del ricovero in corso; invalidanti; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (cura di sé ADL, Nota 2)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10013993

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Alopecia	Perdita dei capelli < 50% del normale per un dato individuo, che non è visibile da lontano, ma solo ad una ispezione ravvicinata; un taglio di capelli diverso può servire a mascherare la perdita di capelli, ma non è necessario il ricorso a parrucca o parrucchino	Perdita dei capelli ≥ 50% del normale per un dato individuo, evidente agli altri; è necessaria una parrucca o un parrucchino se il paziente vuole camuffare completamente la perdita di capelli; si associa ad un impatto psicosociale	–	–	–	10001760
Atrofia adiposa	Ricopre <10% della superficie corporea ed è asintomatica	Ricopre il 10-30% della superficie corporea ed è associato a eritema o dolore; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Ricopre >30% della superficie corporea; associata a eritema o dolore; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10016241
Atrofia della cute	Coinvolge <10% della superficie corporea; associata a teleangectasie o cambiamenti di colore della pelle	Ricopre il 10-30% della superficie corporea; associata a strie o a perdita della struttura annessiale	Ricopre >30% della superficie corporea; associata ad ulcerazione	–	–	10040799
Cattivo odore corporeo	Lieve odore; intervento medico non indicato; interventi per la cura di sé	Pronunciato odore; impatto psicosociale; il paziente chiede l'intervento medico	–	–	–	10005901
Dermatite bollosa	Asintomatica; le vesciche ricoprono <10% della superficie corporea	Le vesciche ricoprono il 10-30% della superficie corporea; vesciche dolorose; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Le vesciche ricoprono >30% della superficie corporea; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Le vesciche ricoprono >30% della superficie corporea; presenza di alterazioni idro-elettrolitiche; indicato trattamento in terapia intensiva o presso un centro per ustionati	Decesso	10006556
Distrofia ungueale	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	–	–	–	–	10062283
Dolore cutaneo	Dolore lieve	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10033474

Dolore del cuoio capelluto	Dolore lieve	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10049120
Edema periorbitale	Soffice o non improntabile	Indurito o improntabile; indicato intervento topico	Edema associato a disturbi visivi; aumento della pressione intraoculare, glaucoma o emorragia retinica; neurite ottica; indicati diuretici; indicato intervento chirurgico	–	–	10054541
Eritema multiforme	Le lesioni a bersaglio ricoprono <10% della superficie corporea e non sono associate a dolore	Le lesioni a bersaglio ricoprono il 10-30% della superficie corporea e sono associate a dolore cutaneo	Le lesioni a bersaglio ricoprono >30% della superficie corporea e sono associate a erosioni orali o genitali	Lesioni a bersaglio che ricoprono >30% della superficie corporea; presenza di alterazioni idro-elettrolitiche; indicato trattamento in terapia intensiva o presso un centro per ustionati	Decesso	10015218
Eritroderma	–	L'eritema ricopre >90% della superficie corporea senza sintomi associati; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Eritema che copre >90% della superficie corporea con sintomi associati (ad es., prurito o dolore); limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Eritema che ricopre >90% della superficie corporea con associate anomalie idro-elettrolitiche; indicato trattamento in terapia intensiva o presso un centro per ustionati	Decesso	10015277
Eritrodisestesìa, sindrome palmo-plantare	Cambiamenti minimi della cute o dermatite (ad es., eritema, edema o ipercheratosi) senza dolore	Cambiamenti cutanei (ad es., estofolazione, bolle, sanguinamento, edema o ipercheratosi) con dolore; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Alterazioni cutanee gravi (ad es., esfoliazione, bolle, sanguinamento, edema o ipercheratosi), con dolore; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10054524
Fotosensibilità	Eritema indolore che ricopre <10% della superficie corporea	Eritema doloroso che ricopre il 10-30% della superficie corporea	Eritema che ricopre >30% della superficie corporea ed eritema con vesciche; fotosensibilità; indicata terapia orale con corticosteroidi; indicato controllo del dolore (ad es., oppiacei o FANS)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10034966
Indurimento della cute	Lieve indurimento, in grado di muovere la cute parallelamente a un piano (scorrimento) e perpendicolarmente alla cute stessa (pizzicamento)	Moderato indurimento; in grado di far scorrere la cute, ma non di pizzicarla; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Grave indurimento, impossibilitato a far scivolare o pizzicare la pelle; limitazione del movimento articolare o degli orifizi (ad es., bocca, ano); limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Generalizzato; associata a segni o sintomi di insufficienza respiratoria o compromissione della nutrizione	Decesso	10051837

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Iperidrosi	Limitato ad un sito (palmi delle mani, piante dei piedi o ascelle), interventi per la cura di sé	Coinvolge >1 sito; il paziente richiede l'intervento medico; è associata ad un impatto psicosociale	Generalizzata, coinvolgente sedi diverse da palmi delle mani, piante dei piedi o ascelle; associata con squilibri elettrolitici/emodinamici	–	–	10020642
Iperpigmentazione della cute	Iperpigmentazione che coinvolge <10% della superficie corporea; nessun impatto psicosociale	Iperpigmentazione che coinvolge >10% della superficie corporea; associata ad un impatto psicosociale	–	–	–	10040865
Ipertricosi	Aumento di lunghezza, spessore o densità dei capelli che il paziente o è in grado di camuffare con la rasatura periodica o la rimozione, o non è così evidente da richiedere una depilazione	Aumento di lunghezza, spessore o densità dei capelli sulle zone solitamente esposte del corpo (faccia (non limitatamente alla zona di barba e baffi) più/meno braccia), che richiede rasature frequenti o il ricorso ad altri tipi di depilazione per camuffare il quadro; è associata ad un impatto psicosociale	–	–	–	10020864
Ipidrosi	–	Sintomatico; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Aumento della temperatura corporea; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Colpo di calore	Decesso	10021013
Ipopigmentazione della cute	Ipopigmentazione o depigmentazione che coinvolge <10% della superficie corporea; nessun impatto psicosociale	Ipopigmentazione o depigmentazione che coinvolge >10% della superficie corporea; associata ad un impatto psicosociale	–	–	–	10040868
Irsutismo	Nelle donne, l'aumento della lunghezza, dello spessore o della densità dei peli con una distribuzione maschile che la paziente è in grado di camuffare con rasatura periodica, decolorazione o depilazione	Nelle donne, aumento di lunghezza, spessore o densità dei peli con distribuzione maschile che richiede una rasatura quotidiana o metodi più spinti di depilazione per mascherare il quadro; è associata a un impatto psicosociale	–	–	–	10020112
Lipoipertrofia	Asintomatica e coinvolgente <10% della superficie corporea	Copertura del 10-30% della superficie corporea con associato dolore; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Copertura >30% della superficie corporea con dolore associato; sono indicati oppiacei o FANS; lipoipertrofia; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10062315

Necrolisi epidermica tossica	–	–	–	Desquamazione della pelle che ricopre $\geq 30\%$ della superficie corporea con sintomi associati (ad es., eritema, porpora o distacco epidermico)	Decesso	10044223
Orticaria	Lesioni orticarioidi che ricoprono $< 10\%$ della superficie corporea; indicato trattamento topico	Lesioni orticarioidi che ricoprono il 10-30% della superficie corporea; indicato trattamento per os	Lesioni orticarioidi che ricoprono $> 30\%$ della superficie corporea; indicato intervento ev	–	–	10046735
Perdita dell'unghia	Separazione asintomatica del letto ungueale dalla lamina o perdita dell'unghia	Sintomatica separazione del letto ungueale dalla lamina dell'unghia o perdita dell'unghia; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	–	–	–	10049281
Porpora	Superficie complessiva delle lesioni $< 10\%$ della superficie corporea	Superficie complessiva delle lesioni pari al 10-30% della superficie corporea; sanguinamento in caso di trauma	Superficie complessiva delle lesioni $> 30\%$ della superficie corporea; sanguinamento spontaneo	–	–	10037549
Prurito	Lieve o localizzato; indicato intervento topico	Intensa o diffusa; intermittente; cambiamento della cute come conseguenza delle graffiature (ad es., edema, formazione di papule, escoriazioni, lichenificazione, trasudazione/croste); indicato trattamento per os; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Intensa o diffusa; costante; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2) o il sonno; indicata terapia con corticosteroidi orali o terapia immunosoppressiva	–	–	10037087
Rash acneiforme	Papule e/o pustole che ricoprono meno del 10% della superficie corporea, che possono o meno essere associate a sintomi di prurito o di dolore	Papule e/o pustole che ricoprono il 10-30% della superficie corporea, che possono o meno essere associate a sintomi di prurito o di dolore; hanno un impatto psicosociale; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Papule e/o pustole che ricoprono $> 30\%$ della superficie corporea, che possono o meno essere associate a sintomi di prurito o di dolore; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); associate a superinfezione locale con indicazione ad un trattamento antibiotico per os	Papule e/o pustole che ricoprono qualsiasi% di superficie corporea, con presenza meno di sintomi di prurito o di dolore, e associate invece a estesa sovrainfezione con indicazione ad un trattamento antibiotico e.v.; conseguenze potenzialmente letali	Decesso	10037847
Rash maculopapulare	Macule/papule che ricoprono $< 10\%$ della superficie corporea con o senza sintomi (ad es., prurito, bruciore, senso di tensione)	Macule/papule che ricoprono il 10-30% della superficie corporea con o senza sintomi (ad es., prurito, bruciore, senso di tensione); limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Macule/papule che ricoprono $> 30\%$ della superficie corporea, con o senza sintomi associati; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10037868

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Scolorimento dell'unghia	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	–	–	–	–	10028691
Secchezza cutanea	Ricopre <10% della superficie corporea e non è associata ad eritema o prurito	Ricopre il 10-30% della superficie corporea e si associa a eritema o prurito; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Ricopre >30% della superficie corporea e si associa a prurito; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10013786
Sindrome di Stevens-Johnson	–	–	Desquamazione della cute che coinvolge <10% della superficie corporea con segni associati (ad es., eritema, porpora, distacco dell'epidermide e distacco della membrana mucosa)	Desquamazione della pelle che ricopre il 10-30% della superficie corporea con segni associati (ad es., eritema, porpora, distacco dell'epidermide e delle mucose)	Decesso	10042033
Telangiectasia	Telangiectasie che ricoprono <10% della superficie corporea	Telangiectasie che ricoprono >10% della superficie corporea; associate con un impatto psicosociale	–	–	–	10043189
Ulcerazione della cute	Superficie complessiva delle ulcere <1 cm; eritema irreversibile della cute intatta con associato calore o edema	Superficie complessiva delle ulcere 1-2 cm; parziale perdita dello spessore cutaneo che coinvolge la cute o il tessuto adiposo sottocutaneo	Superficie complessiva delle ulcere >2 cm; perdita cutanea a tutto spessore che comporta danno o necrosi del tessuto sottocutaneo che può estendersi fino alla fascia	Ulcera di qualsiasi dimensione, con estesa distruzione, necrosi tissutale o danni a muscoli, ossa, o strutture di supporto, con o senza perdita completa dello spessore cutaneo	Decesso	10040947
Disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo - Altro, specificare	Asintomatici o sintomi lievi; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicati interventi	Moderato; indicato intervento minimo, locale o non invasivo; limitazioni in rapporto all'età delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi o significativi dal punto di vista medico ma non immediatamente letali; indicata ospedalizzazione o prolungamento del ricovero in corso; invalidanti; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10040785

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Crescita accelerata	–	≥+2 SD (deviazione standard) sopra l'altezza media dei genitori o l'altezza di riferimento	–	–	–	10018746
Insufficienza surrenalica	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomi moderati; indicato intervento medico	Gravi sintomi; indicata l'ospedalizzazione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10001367
Iperparatiroidismo	Sintomi lievi; intervento non indicato	Sintomi moderati; indicato intervento medico	–	–	–	10020705
Ipertiroidismo	Asintomatico; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatico, è indicata la terapia soppressiva; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); indicata l'ospedalizzazione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10020850
Ipoparatiroidismo	Asintomatico; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomi moderati; indicato intervento medico	Gravi sintomi, indicazione a intervento medico o ospedalizzazione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10021041
Ipotiroidismo	Asintomatico; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatico; indicata la terapia sostitutiva con ormoni tiroidei; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); indicata l'ospedalizzazione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10021114
Pubertà precoce	Segni fisici della pubertà, senza marcatori biochimici per le femmine <8 anni e i maschi <9 anni	Presenza di segni fisici e marcatori biochimici di pubertà per le femmine di <8 anni e per i maschi di <9 anni	–	–	–	10058084
Pubertà ritardata	–	Nessuno sviluppo delle mammelle entro i 13 anni per le femmine; testicoli di volume <3 cc o nessuno sviluppo allo stadio 2 secondo la scala di Tanner entro l'età di 14,5 anni per i maschi	Nessuno sviluppo delle mammelle entro i 14 anni per le femmine; nessun aumento nel volume dei testicoli o nessuno sviluppo allo stadio 2 secondo la scala di Tanner entro i 16 anni per i maschi; indicata terapia ormonale sostitutiva	–	–	10012205

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Sindrome cushingoides	Sintomi lievi; intervento non indicato	Sintomi moderati; indicato intervento medico	Gravi sintomi, indicazione a intervento medico o ospedalizzazione	–	–	10011655
Virilizzazione	Sintomi lievi; intervento non indicato	Sintomi moderati; indicato intervento medico	–	–	–	10047488
Disturbi endocrini - Altro, specificare	Asintomatici o sintomi lievi; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicati interventi	Moderati; indicato intervento minimo, locale o non invasivo; limitazioni in rapporto all'età delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi o significativi dal punto di vista medico ma non immediatamente letali; indicata ospedalizzazione o prolungamento del ricovero in corso; invalidanti; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10014698

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Alterazione dello sviluppo dentale	Asintomatica; ipoplasia del dente o dello smalto	Menomazione correggibile con la chirurgia orale	Malformazioni non correggibili chirurgicamente; invalidante	–	–	10044030
Ascite	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; indicato intervento medico	Gravi sintomi; indicato intervento invasivo	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10003445
Carie dentale	Uno o più carie, che non intaccano la radice	Carie che coinvolgono le radici	Carie dentale che esita in pulpite o ascesso periapicale o in perdita del dente	–	–	10012318
Cheilite	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomi moderati; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); indicato intervento	–	–	10008417
Colite	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Dolore addominale; muco o sangue nelle feci	Grave dolore addominale; cambiamento delle abitudini intestinali; indicato intervento medico; segni peritoneali	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10009887
Diarrea	Aumento <a 4 evacuazioni al giorno rispetto alla norma; lieve aumento nella evacuazione dalla stomia rispetto alla norma	Aumento della frequenza di evacuazione di 4-6 volte al giorno rispetto alla norma; moderato aumento nella evacuazione dalla stomia rispetto alla norma	Aumento ≥a 7 evacuazioni al giorno rispetto alla norma; incontinenza; indicata l'ospedalizzazione; importante aumento nell'evacuazione dalla stomia rispetto alla norma; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10012727
Discromia dentale	Presenza di macchie sulla superficie dentale	–	–	–	–	10044031
Disestesia orale	Lieve fastidio; non interferisce con l'assunzione orale	Dolore moderato; interferisce con l'assunzione orale	Dolore invalidante; indicata la nutrizione enterale o NPT	–	–	10054520
Disfagia	Sintomatica, in grado di assumere una dieta regolare	Sintomatica, alterazione nell'assunzione di cibo o nella deglutizione	Gravemente alterata la nutrizione/deglutizione; indicata la nutrizione enterale o NPT o ospedalizzazione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10013950

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Dispepsia	Sintomi lievi; intervento non indicato	Sintomi moderati; indicato intervento medico	Gravi sintomi; indicato intervento chirurgico	–	–	10013946
Distensione addominale	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicati interventi	Sintomatica; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Grave disagio; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10000060
Dolore addominale	Dolore lieve	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10000081
Dolore anale	Dolore lieve	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10002167
Dolore del cavo orale	Dolore lieve	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10031009
Dolore esofageo	Dolore lieve	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10015388
Dolore gastrointestinale	Dolore lieve	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10017999
Dolore gengivale	Dolore lieve	Dolore moderato che interferisce con l'assunzione orale	Dolore grave; incapacità di alimentarsi per os	–	–	10018286
Dolore labiale	Dolore lieve	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10024561
Dolore rettale	Dolore lieve	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10038072

Emorragia anale	Lieve; nessun intervento indicato	Sintomi moderati; sono indicati intervento medico o cauterizzazione minore	Indicati la trasfusione, le procedure di radiologia interventistica, l'endoscopia o l'intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10055226
Emorragia cecale	Lieve; intervento non indicato	Sintomi moderati; sono indicati intervento medico o cauterizzazione minore	Indicati la trasfusione, le procedure di radiologia interventistica, l'endoscopia o l'intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065747
Emorragia da varici esofagee	–	Auto-limitante; intervento non indicato	Indicati la trasfusione, le procedure di radiologia interventistica, l'endoscopia o l'intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10015453
Emorragia del cavo orale	Lieve; intervento non indicato	Sintomi moderati; sono indicati intervento medico o cauterizzazione minore	Indicati la trasfusione, le procedure di radiologia interventistica, l'endoscopia o l'intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10030980
Emorragia del colon	Lieve; intervento non indicato	Sintomi moderati; sono indicati intervento medico o cauterizzazione minore	Indicati la trasfusione, le procedure di radiologia interventistica, l'endoscopia o l'intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10009998
Emorragia digiunale	Lieve; intervento non indicato	Sintomi moderati; sono indicati intervento medico o cauterizzazione minore	Indicati la trasfusione, le procedure di radiologia interventistica, l'endoscopia o l'intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10055300
Emorragia duodenale	Lieve; intervento non indicato	Sintomi moderati; sono indicati intervento medico o cauterizzazione minore	Indicati la trasfusione, le procedure di radiologia interventistica, l'endoscopia o l'intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10055242
Emorragia emorroidaria	Lieve; intervento non indicato	Sintomi moderati; sono indicati intervento medico o cauterizzazione minore	Indicati la trasfusione, le procedure di radiologia interventistica, l'endoscopia o l'intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10060640
Emorragia esofagea	Lieve; intervento non indicato	Sintomi moderati; è indicato intervento medico o cauterizzazione minore	Indicati la trasfusione, le procedure di radiologia interventistica, l'endoscopia o l'intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10015384
Emorragia gastrica	Lieve; intervento non indicato	Sintomi moderati; sono indicati intervento medico o cauterizzazione minore	Indicati la trasfusione, le procedure di radiologia interventistica, l'endoscopia o l'intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10017789
Emorragia gastrointestinale bassa	Lieve; intervento non indicato	Sintomi moderati; sono indicati intervento medico o cauterizzazione minore	Indicati la trasfusione, le procedure di radiologia interventistica, l'endoscopia o l'intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10051746

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Emorragia gastrointestinale superiore	Lieve; intervento non indicato	Sintomi moderati; sono indicati intervento medico o cauterizzazione minore	Indicati la trasfusione, le procedure di radiologia interventistica, l'endoscopia o l'intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10055356
Emorragia ileale	Lieve; intervento non indicato	Sintomi moderati; sono indicati intervento medico o cauterizzazione minore	Indicati la trasfusione, le procedure di radiologia interventistica, l'endoscopia o l'intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10055287
Emorragia intra-addominale	–	Indicati l'intervento medico o la cauterizzazione minore	Indicati la trasfusione, le procedure di radiologia interventistica, l'endoscopia o l'intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10055291
Emorragia pancreatica	Lieve; intervento non indicato	Sintomi moderati; sono indicati intervento medico o cauterizzazione minore	Indicati la trasfusione, le procedure di radiologia interventistica, l'endoscopia o l'intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10033626
Emorragia retroperitoneale	–	Auto-limitante; indicato intervento	Indicati la trasfusione, le procedure di radiologia interventistica, l'endoscopia o l'intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10038981
Emorragia rettale	Lieve; intervento non indicato	Sintomi moderati; sono indicati intervento medico o cauterizzazione minore	Indicati la trasfusione, le procedure di radiologia interventistica, l'endoscopia o l'intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10038064
Emorroidi	Asintomatiche; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatiche; sono indicati legatura elastica o trattamento medico	Gravi sintomi; indicazione a radiologia interventistica, endoscopia o chirurgia d'elezione	–	–	10019611
Enterocolite	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Dolore addominale; muco o sangue nelle feci	Dolore addominale grave o persistente; febbre; ileo; segni peritoneali	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10014893
Esofagite	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; alterazioni nell'assunzione di cibo/nella deglutizione, indicati integratori orali	Gravemente alterate la nutrizione/deglutizione; indicate nutrizione enterale o NPT o ospedalizzazione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10015461

Fistola anale	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; alterata funzionalità gastrointestinale	Grave alterazione della funzionalità gastrointestinale; indicate nutrizione enterale o NPT o ospedalizzazione; indicato intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10002156
Fistola del cavo orale	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; alterata funzionalità gastrointestinale	Grave alterazione della funzionalità gastrointestinale, indicate NPT o ospedalizzazione; indicato intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065720
Fistola del colon	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; alterata funzionalità gastrointestinale	Grave alterazione della funzionalità gastrointestinale; indicato riposo intestinale, indicati NPT o ospedalizzazione; indicato intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10009995
Fistola della ghiandola salivare	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; alterata funzionalità gastrointestinale; indicata alimentazione enterale	Grave alterazione della funzionalità gastrointestinale; indicata ospedalizzazione; indicato intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10039411
Fistola digiunale	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; alterata funzionalità gastrointestinale	Grave alterazione della funzionalità gastrointestinale, indicate NPT o ospedalizzazione; indicato intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065719
Fistola duodenale	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; alterata funzionalità gastrointestinale	Grave alterazione della funzionalità gastrointestinale; indicate nutrizione enterale o NPT o ospedalizzazione; indicato intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10013828
Fistola enterovesicale	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; indicato intervento non invasivo	Grave, significativa dal punto di vista clinico; indicato intervento medico	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10062570
Fistola esofagea	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; alterata funzionalità gastrointestinale	Grave alterazione della funzionalità gastrointestinale; indicate la nutrizione enterale o NPT o ospedalizzazione; indicato intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065851

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Fistola gastrica	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; alterata funzionalità gastrointestinale	Grave alterazione della funzionalità gastrointestinale; indicato riposo intestinale; indicate nutrizione enterale o NPT o ospedalizzazione; indicato intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10065713
Fistola gastrointestinale	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; alterata funzionalità gastrointestinale	Grave alterazione della funzionalità gastrointestinale; indicate nutrizione enterale o NPT o ospedalizzazione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10017877
Fistola ileale	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; alterata funzionalità gastrointestinale	Grave alterazione della funzionalità gastrointestinale, indicate NPT o ospedalizzazione; indicato intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065728
Fistola pancreatica	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; alterata funzionalità gastrointestinale	Grave alterazione della funzionalità gastrointestinale; indicate nutrizione enterale o NPT o ospedalizzazione; indicato intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10049192
Fistola rettale	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; alterata funzionalità gastrointestinale	Grave alterazione della funzionalità gastrointestinale; indicate NPT o ospedalizzazione; indicato intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10038062
Flatulenza	Sintomi lievi; intervento non indicato	Moderata; persistente; sequele psicosociali	–	–	–	10016766
Gastralgia	Dolore lieve	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (Instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10042112
Gastrite	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; alterata funzionalità gastrointestinale; indicato intervento medico	Alterata funzione alimentare o gastrica; indicata NPT o ospedalizzazione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10017853
Gastroparesi	Lieve nausea, sazietà precoce e gonfiore addominale, in grado di mantenere l'apporto calorico con una dieta regolare	Sintomi moderati; in grado di nutrirsi adeguatamente con cambiamenti dietetici e di stile di vita; può essere necessario un intervento farmacologico	Perdita di peso; refrattarietà all'intervento medico, non in grado di mantenere una dieta adeguata per os	–	–	10018043

Gonfiore	Nessun cambiamento nella funzione intestinale o nell'assunzione orale	Sintomatico, riduzione dell'assunzione orale; cambiamenti nella funzione intestinale	–	–	–	10005265
Ileo	–	Sintomatico; alterata funzionalità gastrointestinale; indicato riposo intestinale	Grave alterazione della funzionalità gastrointestinale; indicata NPT	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10021328
Incontinenza fecale	Richiesto l'uso occasionale di pannoloni	Necessario l'uso quotidiano di pannoloni	Gravi sintomi; indicato intervento chirurgico in elezione	–	–	10016296
Infiammazione del dotto salivare	Saliva leggermente densa; sapore leggermente alterato (ad es., metallico)	Saliva densa, filamentosa, appiccicosa; notevole alterazione del gusto; indicato cambiamento nella dieta; sintomi da indotta secrezione; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Necrosi acuta della ghiandola salivare; sintomi gravi indotti dalla secrezione (per esempio, saliva densa/secrezioni orali o conati di vomito); indicate nutrizione enterale o NPT; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); invalidante	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10056681
Mal di denti	Dolore lieve	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10044055
Malassorbimento	–	Modificazioni della dieta; indicato intervento per os	Incapacità di alimentarsi in modo adeguato; indicata NPT	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10025476
Malattia da reflusso gastroesofageo	Sintomi lievi; intervento non indicato	Sintomi moderati; indicato intervento medico	Gravi sintomi; indicato intervento chirurgico	–	–	10066874
Malattia parodontale	Recessione gengivale o gengivite, sanguinamento al sondaggio; lieve perdita di massa ossea locale	Moderata recessione gengivale o gengivite; multiple sedi di sanguinamento al sondaggio; perdita ossea moderata	Sanguinamento spontaneo; grave perdita ossea con o senza perdita del dente; osteonecrosi della mascella o della mandibola	–	–	10034536
Mucosite anale	Asintomatica o sintomi lievi; intervento non indicato	Sintomatica; intervento medico indicato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065721

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Mucosite del tenue	Asintomatica o sintomi lievi; intervento non indicato	Sintomatica; indicato intervento medico; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; interferisce con l'assunzione per os; nutrizione enterale, NPT o ospedalizzazione indicate; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065710
Mucosite orale	Asintomatica o sintomi lievi; intervento non indicato	Dolore moderato; non interferisce con l'assunzione orale; indicato cambiamento della dieta	Dolore grave; interferisce con l'assunzione orale	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10028130
Mucosite rettale	Asintomatica o sintomi lievi; intervento non indicato	Sintomatica; indicato intervento medico; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10063190
Nausea	Perdita di appetito senza alterazione delle abitudini alimentari	Diminuzione dell'assunzione orale senza significativa perdita di peso, disidratazione o malnutrizione	Inadeguato apporto calorico o di liquidi per os; indicate nutrizione enterale o NPT o ospedalizzazione	–	–	10028813
Necrosi anale	–	–	Indicata NPT od ospedalizzazione; indicato intervento radiologico interventistico, endoscopico o chirurgico	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10065722
Necrosi esofagea	–	–	Incapacità di alimentarsi in modo adeguato dal tratto gastrointestinale; indicazione a radiologia interventistica, endoscopia o intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10065727
Necrosi gastrica	–	–	Incapacità di alimentarsi in modo adeguato dal tratto gastrointestinale, indicata radiologia interventistica, endoscopia o intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10051886
Necrosi pancreatica	–	–	Indicate nutrizione enterale o NPT; indicate le procedure di radiologia interventistica, endoscopiche o l'intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10058096

Necrosi peritoneale	–	–	Indicare nutrizione enterale o NPT; indicate le procedure di radiologia interventistica, endoscopiche o l'intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10065704
Necrosi rettale	–	–	Indicare nutrizione enterale o NPT; indicate le procedure di radiologia interventistica, endoscopiche o l'intervento chirurgico	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10065709
Occlusione del colon	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; alterata funzionalità gastrointestinale	Indicata l'ospedalizzazione; intervento chirurgico in elezione; invalidante	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10010000
Ostruzione del tenue	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; alterata funzionalità gastrointestinale; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Indicata l'ospedalizzazione; indicato l'intervento chirurgico in elezione; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); invalidante	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10041101
Ostruzione digiunale	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; alterata funzionalità gastrointestinale; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Indicata l'ospedalizzazione; indicato l'intervento chirurgico in elezione; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); invalidante	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10065732
Ostruzione duodenale	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; alterata funzionalità gastrointestinale	Indicati ospedalizzazione o intervento chirurgico in elezione; invalidante	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10013830
Ostruzione esofagea	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; alterata la funzionalità gastrointestinale; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Indicata l'ospedalizzazione; indicato l'intervento chirurgico in elezione; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); invalidante	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10015387
Ostruzione gastrica	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; alterata funzionalità gastrointestinale; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Indicata l'ospedalizzazione; indicato l'intervento chirurgico in elezione; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); invalidante	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10029957

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Ostruzione ileale	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; alterata funzionalità gastrointestinale; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Indicata l'ospedalizzazione; indicato l'intervento chirurgico in elezione; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); invalidante	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10065730
Ostruzione rettale	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; alterata funzionalità gastrointestinale; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Indicata l'ospedalizzazione; indicato l'intervento chirurgico in elezione; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); invalidante	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10065707
Pancreatite	–	Elevazione degli enzimi o solo reperti radiologici	Dolore grave; vomito; indicato intervento medico (ad es., analgesia, supporto nutrizionale)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10033645
Perforazione del colon	–	Sintomatica; indicato intervento medico	Gravi sintomi; indicato intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10010001
Perforazione del retto	–	Sintomatica; indicato intervento medico	Gravi sintomi; indicato intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10038073
Perforazione del tenue	–	Sintomatica; indicato intervento medico	Gravi sintomi; indicato intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10041103
Perforazione digiunale	–	Sintomatica; indicato intervento medico	Gravi sintomi; indicato intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10023174
Perforazione duodenale	–	Sintomatica; indicato intervento medico	Gravi sintomi; indicato intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10013832
Perforazione esofagea	–	Sintomatica; indicato intervento medico	Gravi sintomi; indicato intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10055472
Perforazione gastrica	–	Sintomatica; indicato intervento medico	Gravi sintomi; indicato intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10017815

Perforazione ileale	–	Sintomatica; indicato intervento medico	Gravi sintomi; indicato intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10021305
Proctite	Fastidio rettale; intervento non indicato	Presenza di sintomi (ad es., fastidio rettale, perdita di sangue o muco); indicato intervento medico; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi, urgenza a defecare o incontinenza fecale; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10036774
Secchezza delle fauci	Sintomatica (ad es., saliva secca o densa) senza significative alterazioni della dieta; flusso di saliva non stimolato >0,2 ml/min	Sintomi moderati; alterazioni nella assunzione orale (ad es., molta acqua, altri lubrificanti, dieta limitata a purè e/o cibi soffici, umidi); secrezione salivare non stimolata da 0,1 a 0,2 ml/min	Incapacità di alimentarsi in modo adeguato; indicate nutrizione enterale o NPT; salivazione non stimolata <0,1 ml/min	–	–	10013781
Stenosi anale	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; alterata funzionalità gastrointestinale	Sintomatica e grave alterazione della funzionalità gastrointestinale; indicato intervento chirurgico non in emergenza; indicate NPT o ospedalizzazione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10002176
Stenosi del colon	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; alterata funzionalità gastrointestinale	Grave alterazione della funzionalità gastrointestinale; indicate nutrizione enterale o ospedalizzazione; indicato intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10010004
Stenosi del dotto pancreatico	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; alterata funzionalità gastrointestinale	Grave alterazione della funzionalità gastrointestinale; indicate nutrizione enterale o ospedalizzazione; indicato intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10065703
Stenosi del tenue	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; alterata funzionalità gastrointestinale	Sintomatica e con severa alterazione della funzionalità GI; indicate nutrizione enterale o NPT o ospedalizzazione; indicato intervento chirurgico non in emergenza	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10062263
Stenosi digiunale	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; alterata funzionalità gastrointestinale	Grave alterazione della funzionalità gastrointestinale; indicate nutrizione enterale o ospedalizzazione; indicato intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10023176

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Stenosi duodenale	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; alterata funzionalità gastrointestinale	Grave alterazione della funzionalità gastrointestinale, nutrizione enterale; indicata l'ospedalizzazione; indicato intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10050094
Stenosi esofagea	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; alterata funzionalità gastrointestinale	Grave alterazione della funzionalità gastrointestinale; nutrizione enterale; indicata l'ospedalizzazione; indicato intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10015448
Stenosi gastrica	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; alterata funzionalità gastrointestinale	Grave alterazione della funzionalità gastrointestinale; indicata la nutrizione enterale; indicata l'ospedalizzazione; indicato l'intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10061970
Stenosi ileale	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; alterata funzionalità gastrointestinale	Grave alterazione della funzionalità gastrointestinale; indicate nutrizione enterale o ospedalizzazione; indicato intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10021307
Stenosi rettale	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; alterata funzionalità gastrointestinale	Grave alterazione della funzionalità gastrointestinale; indicate nutrizione enterale o ospedalizzazione; indicato intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10038079
Stipsi	Sintomi occasionali o intermittenti; uso occasionale di emollienti delle feci, lassativi, cambiamenti della dieta o clistere	Sintomi persistenti con l'uso regolare di lassativi o clisteri; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Stipsi ostinata con indicazione all'evacuazione manuale; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10010774
Tiflite	–	–	Sintomatica (ad es., dolori addominali, febbre, cambiamento delle abitudini intestinali con ileo); segni peritoneali	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10045271

Ulcera anale	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; alterata funzionalità gastrointestinale	Grave alterazione della funzionalità gastrointestinale; indicata NPT; indicato intervento chirurgico in elezione o endoscopico; invalidante	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10002180
Ulcera del colon	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; alterata funzionalità gastrointestinale	Gravemente alterata la funzionalità GI; indicata NPT; indicato intervento chirurgico in elezione o per via endoscopica; invalidante	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10010006
Ulcera del tenue	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; alterata funzionalità gastrointestinale; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Grave alterazione della funzionalità gastrointestinale; indicata NPT; indicato intervento chirurgico in elezione o per via endoscopica; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); invalidante	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10041133
Ulcera digiunale	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; alterata funzionalità gastrointestinale	Grave alterazione della funzionalità gastrointestinale; indicata NPT; indicato intervento chirurgico in elezione o per via endoscopica; invalidante	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10023177
Ulcera duodenale	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomi moderati; indicato intervento medico; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Grave alterazione della funzionalità gastrointestinale; indicata NPT; indicato intervento chirurgico in elezione o per via endoscopica; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); invalidante	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10013836
Ulcera esofagea	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; alterata la funzionalità gastrointestinale; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Grave alterazione della funzionalità gastrointestinale; indicata NPT; indicato intervento chirurgico in elezione o per via endoscopica; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); invalidante	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10015451
Ulcera gastrica	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; alterata la funzionalità gastrointestinale; indicato intervento medico; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Grave alterazione della funzionalità gastrointestinale; indicata NPT; indicato intervento chirurgico in elezione o per via endoscopica; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); invalidante	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10017822

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Ulcera ileale	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; alterata funzionalità gastrointestinale	Grave alterazione della funzionalità gastrointestinale; indicata NPT; indicato intervento chirurgico in elezione o per via endoscopica; invalidante	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10021309
Ulcera rettale	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; alterata funzionalità gastrointestinale (ad es., cambiamento nelle abitudini alimentari, vomito, diarrea)	Grave alterazione della funzionalità gastrointestinale; indicata NPT; indicato l'intervento chirurgico in elezione o per via endoscopica; invalidante	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10038080
Vomito	1-2 episodi (separati da 5 minuti) in 24 ore	3-5 episodi (separati da 5 minuti) in 24 ore	≥6 episodi (separati da 5 minuti) in 24 ore; indicate nutrizione enterale o NPT o ospedalizzazione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10047700
Disturbi gastrointestinali - Altro, specificare	Asintomatici o sintomi lievi; solo osservazione clinico-diagnostica; intervento non indicato	Moderato; indicato intervento minimo, locale o non invasivo; limitazioni in rapporto all'età delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi o significativi dal punto di vista medico ma non immediatamente letali; indicati ospedalizzazione o prolungamento del ricovero in corso; invalidante; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10017947

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Artralgia	Dolore lieve	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10003239
Artrite	Dolore lieve con infiammazione, eritema o gonfiore articolare	Dolore moderato associato a segni di infiammazione, eritema, gonfiore dell'articolazione; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave associato a segni di infiammazione, eritema o gonfiore dell'articolazione; danno articolare irreversibile; invalidante; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10003246
Cifosi	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Moderata accentuazione; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Grave accentuazione; indicato intervento chirurgico; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10023509
Debolezza dei muscoli del tronco	Sintomatica; percepita dal paziente, ma non evidente all'esame obiettivo	Sintomatica; evidente all'esame obiettivo; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); invalidante	–	–	10065795
Debolezza muscolare agli arti inferiori	Sintomatica; percepita dal paziente, ma non evidente all'esame obiettivo	Sintomatica; evidente all'esame obiettivo; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); invalidante	–	–	10065776
Debolezza muscolare agli arti superiori	Sintomatica; percepita dal paziente, ma non evidente all'esame obiettivo	Sintomatica; evidente all'esame obiettivo; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); invalidante	–	–	10065895
Debolezza muscolare generalizzata	Sintomatico; debolezza percepita dal paziente, ma non evidente all'esame obiettivo	Sintomatico; evidente debolezza all'esame obiettivo; debolezza con limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Debolezza con limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); invalidante	–	–	10062572

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Debolezza muscolare sul lato destro del corpo	Sintomatica; percepita dal paziente, ma non evidente all'esame obiettivo	Sintomatica; evidente all'esame obiettivo; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); invalidante	–	–	10065794
Debolezza muscolare sul lato sinistro del corpo	Sintomatica; percepita dal paziente, ma non evidente all'esame obiettivo	Sintomatica; evidente all'esame obiettivo; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); invalidante	–	–	10065780
Deformità muscolo-scheletrica	Ipoplasia esteticamente e funzionalmente non significativa	Deformità, ipoplasia o asimmetria in grado di essere corretta con protesi (ad es., inserto in una scarpa) o mascherabile dagli indumenti	Significativa deformità, ipoplasia o asimmetria, non risolvibile con l'utilizzo di protesi o mascherabile con gli indumenti; invalidante	–	–	10065783
Disparità di lunghezza degli arti	Disparità di lunghezza <2 cm	Moderata discrepanza in lunghezza di 2-5 cm; indicata soletta per la scarpa; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Grave discrepanza in lunghezza >5 cm; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); invalidante; indicato intervento chirurgico	–	–	10065738
Dolore al collo	Dolore lieve	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10028836
Dolore al fianco	Dolore lieve	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10016750
Dolore al gluteo	Dolore lieve	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10048677
Dolore alle estremità	Dolore lieve	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10033425

Dolore della parete toracica	Dolore lieve	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	—	—	10008496
Dolore osseo	Dolore lieve	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	—	—	10006002
Esostosi	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatico; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); indicato intervento chirurgico in elezione	—	—	10015688
Fibrosi profonda del tessuto connettivo	Lieve indurimento, è possibile muovere la cute parallelamente a un piano (scorrimento) e perpendicolarmente alla cute stessa (pizzicamento)	Moderato indurimento, è possibile muovere la cute parallelamente a un piano (scorrimento) ma non perpendicolarmente alla cute stessa (pizzicamento); limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Grave indurimento; non è possibile far scorrere o pizzicare la cute; limitazione al movimento delle articolazioni e degli orifizi (ad esempio bocca, ano); limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Generalizzato; associato a segni o sintomi di insufficienza respiratoria o compromissione della nutrizione	Decesso	10065799
Fibrosi superficiale dei tessuti molli	Lieve indurimento, è possibile muovere la cute parallelamente a un piano (scorrimento) e perpendicolarmente alla cute stessa (pizzicamento)	Moderato indurimento, è possibile muovere la cute parallelamente a un piano (scorrimento) e perpendicolarmente alla cute stessa (pizzicamento); limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Grave indurimento; non è possibile far scorrere o a pizzicare la cute; limitazione dei movimenti articolari o degli orifizi (ad esempio bocca, ano); limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Generalizzato; associato a segni o sintomi di insufficienza respiratoria o compromissione della nutrizione	Decesso	10065798
Lordosi	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Moderata accentuazione; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Grave accentuazione; indicato intervento chirurgico; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	—	—	10024842
Mal di schiena	Dolore lieve	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	—	—	10003988
Mialgia	Dolore lieve	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	—	—	10028411

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Miosite	Dolore lieve	Dolore moderato associato a debolezza; dolore con limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore associato a una grave debolezza; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10028653
Necrosi avascolare	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); indicato intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10066480
Necrosi dei tessuti molli addominali	–	Cura locale della ferita; indicato intervento medico (ad es., medicazioni o farmaci topici)	Indicato intervento chirurgico di rimozione o altro intervento invasivo (ad es., ricostruzione dei tessuti, lembo o innesto)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065775
Necrosi dei tessuti molli degli arti inferiori	–	Trattamento locale della ferita; indicato intervento medico (ad es., medicazioni o farmaci topici)	Indicato intervento chirurgico di rimozione o altro intervento invasivo (ad es., ricostruzione dei tessuti, lembo o innesto)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065777
Necrosi dei tessuti molli degli arti superiori	–	Trattamento locale della ferita; indicato intervento medico (ad es., medicazioni o farmaci topici)	Indicato intervento chirurgico di rimozione o altro intervento invasivo (ad es., ricostruzione dei tessuti, lembo o innesto)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065778
Necrosi dei tessuti molli del capo	–	Cura locale della ferita; indicato intervento medico (ad es., medicazioni o farmaci topici)	Indicato intervento chirurgico di rimozione o altro intervento invasivo (ad es., ricostruzione dei tessuti, lembo o innesto)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065779
Necrosi dei tessuti molli del collo	–	Terapia locale della ferita; indicato intervento medico (ad es., medicazioni o farmaci topici)	Indicato intervento chirurgico di rimozione o altro intervento invasivo (ad es., ricostruzione dei tessuti, lembo o innesto)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065781
Necrosi dei tessuti molli della pelvi	–	Trattamento locale della ferita; indicato intervento medico (ad es., medicazioni o farmaci topici)	Indicato intervento chirurgico di rimozione o altro intervento invasivo (ad es., ricostruzione dei tessuti, lembo o innesto)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065793

Osteonecrosi della mandibola	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; indicato intervento medico (ad es., farmaci topici); limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); indicato intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10064658
Osteoporosi	Evidenza radiologica di osteoporosi o di densità minerale ossea (BMD) con t-score da -1 a -2,5 (osteopenia); nessuna perdita di altezza o indicazione all'intervento	BMD t-score <-2,5, perdita in altezza <2 cm; indicata terapia anti-osteoporotica; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Perdita in altezza ≥2 cm; indicata l'ospedalizzazione; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	—	—	10031282
Riduzione della motilità articolare	Riduzione della ROM (raggio di movimento) ≤25%; diminuita ROM con limitazione dell'attività sportiva	Riduzione >25-50% della ROM; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Diminuzione del 50% in ROM; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); invalidante	—	—	10048706
Riduzione della motilità articolare del rachide cervicale	Lieve limitazione di rotazione o di flessione tra 60-70 gradi	Rotazione <60 gradi a destra o a sinistra; <60 gradi di flessione	Anchilosi/fusione su più segmenti, senza rotazione della colonna cervicale	—	—	10065796
Riduzione della motilità articolare del rachide lombare	Rigidità; difficoltà a piegarsi a terra per raccogliere un oggetto molto leggero ma in grado di fare attività sportiva	Dolore con una certa gamma di movimento (ROM) nella colonna lombare; richiede aiuto per sollevare un oggetto molto leggero da terra	Flessione lombare della colonna vertebrale <50%, associata a sintomi di anchilosi o fusione di più segmenti, senza possibilità di flessione della colonna lombare (ad es., incapace di raggiungere il pavimento per raccogliere un oggetto molto leggero)	—	—	10065800
Scoliosi	<20 gradi; clinicamente non rilevabile	>20-45 gradi; visibile alla flessione in avanti; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	>45 gradi; protrusione scapolare nella flessione in avanti; indicato intervento chirurgico; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); invalidante	—	—	10039722
Soppressione della crescita	Riduzione delle velocità di crescita del 10-29% idealmente misurata nell'arco di un anno	Riduzione della velocità di crescita del 30-49% idealmente misurata in un periodo di un anno o 0-49% di riduzione della crescita rispetto alla curva di crescita di basale	Riduzione della velocità di crescita ≥50% idealmente misurata in un periodo di un anno	—	—	10018761

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Trisma	Diminuzione della ROM (range di movimento), senza compromissione nell'assunzione del cibo	Diminuzione del ROM che richiede piccoli morsi, cibi morbidi o puree	Diminuzione del ROM con incapacità di alimentarsi o idratarsi in modo adeguato per os	–	–	10044684
Versamento articolare	Asintomatico; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatico; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); indicato l'intervento chirurgico in elezione; invalidante	–	–	10023215
Disturbi muscoloscheletrici e del tessuto connettivo - Altro, specificare	Asintomatici o sintomi lievi; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicati interventi	Moderato; indicato intervento minimo, locale o non invasivo; con limitazioni in rapporto all'età delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi o significativi dal punto di vista medico ma non immediatamente letali; indicata ospedalizzazione o prolungamento del ricovero in corso; invalidanti; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10028395

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Cataratta	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; moderata diminuzione dell'acuità visiva (20/40 o superiore)	Sintomatica con marcata diminuzione dell'acuità visiva (inferiore a 20/40 ma sopra i 20/200); indicato l'intervento chirurgico (ad es., chirurgia della cataratta)	Cecità (20/200 o peggio) nell'occhio affetto	–	10007739
Cheratite	–	Sintomatica; indicato intervento medico (ad es., agenti topici); limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Diminuzione della visione (inferiore a 20/40 ma sopra i 20/200); limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Perforazione o cecità (20/200 o peggio) nell'occhio affetto	–	10023332
Congiuntivite	Asintomatica o sintomi lievi; intervento non indicato	Sintomatica, indicato intervento topico (ad es., antibiotici); limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10010741
Distacco della retina	Asintomatico	Essudativo e con acuità visiva di 20/40 o più	Distacco reumatogeno o essudativo; indicato l'intervento chirurgico; diminuzione del visus (inferiore a 20/40 ma sopra i 20/200)	Cecità (20/200 o peggio) nell'occhio affetto	–	10038848
Disturbi del nervo ottico	Asintomatici; solo osservazione clinico-diagnostica	Limitazione della visione nell'occhio coinvolto (20/40 o superiore)	Visione limitata nell'occhio interessato (inferiore a 20/40 ma sopra i 20/200)	Cecità (20/200 o peggio) nell'occhio affetto	–	10061322
Disturbi della sclera	Asintomatici; solo osservazione clinico-diagnostica	Sintomatici, limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1); moderata diminuzione dell'acuità visiva (20/40 o più)	Sintomatica, limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); marcata riduzione dell'acuità visiva (inferiore a 20/40)	Cecità (20/200 o peggio) nell'occhio affetto	–	10061510
Disturbi della vascolarizzazione retinica	–	Farmaco topico indicato	Farmaci intravitreali; indicato l'intervento chirurgico	–	–	10038901
Disturbo della funzione palpebrale	Asintomatico; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatico; indicato intervento non di tipo chirurgico; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); indicato l'intervento chirurgico	–	–	10061145

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Dolore oculare	Dolore lieve	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10015958
Emorragia del corpo vitreo	Asintomatica o sintomi lievi; solo osservazione clinico-diagnostica	Sintomatica; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); indicata vitrectomia	Cecità (20/200 o peggio) nell'occhio affetto	–	10047656
Fotofobia	Sintomatica ma senza limitazione delle attività quotidiane di cura della persona	Limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10034960
Fotopsie	Sintomatiche ma senza limitazione delle attività quotidiane di cura della persona	Limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10016757
Glaucoma	Aumento della pressione intraoculare (EIOP, elevated intraocular pression), con indicazione all'utilizzo di un singolo agente topico; nessun deficit del campo visivo	L' EIOP causa deficit precoci del campo visivo; diversi agenti topici o orali sono indicati; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	L'EIOP causa un marcato deficit del campo visivo (ad es., coinvolge entrambi i campi visivi superiore ed inferiore); indicato l'intervento chirurgico; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Cecità (20/200 o peggio) nell'occhio affetto	–	10018304
Iperlacrimia	Intervento non indicato	Indicato intervento	Indicato intervento chirurgico	–	–	10047848
Lacerazione della retina	–	Indicata laser terapia o retinopessia con gas	Indicata la chirurgia vitroretinica	Cecità (20/200 o peggio) nell'occhio affetto	–	10038897
Miodesopsie	Sintomatiche ma senza limitazione delle attività quotidiane di cura della persona	Limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10016778
Nictalopia	Sintomatica ma senza limitazione delle attività quotidiane di cura della persona	Limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Cecità (20/200 o peggio) nell'occhio affetto	–	10029404

Offuscamento della vista	Intervento non indicato	Sintomatico; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	1000586
Papilledema	Asintomatico; nessun difetto del campo visivo	Peggioramento sintomatico della visione; difetto del campo visivo con risparmio della visione nei 20 gradi centrali	Difetti marcati del campo visivo (inferiore a 20/40 ma sopra i 20/200)	Cecità (20/200 o peggio) nell'occhio affetto	–	10033703
Paresi dei muscoli extraoculari	Asintomatico; solo osservazioni clinico-diagnostica	Sintomatica; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); disabilità	–	–	10015829
Retinopatia	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica	Sintomatica con moderata diminuzione dell'acuità visiva (20/40 o più); limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Sintomatica con marcata diminuzione della acuità visiva (inferiore a 20/40); invalidante; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Cecità (20/200 o peggio) nell'occhio affetto	–	10038923
Secchezza oculare	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; sintomi lievi alleviati da lubrificanti	Sintomatica, indicati diversi agenti; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Riduzione dell'acuità visiva (<20/40); limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10013774
Ulcera corneale	–	Sintomatica; indicato intervento medico (ad es., agenti topici); limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); peggioramento del visus (inferiore a 20/40 ma sopra i 20/200)	Perforazione o cecità (20/200 o peggio) nell'occhio affetto	–	10048492
Uveite	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica	Uveite anteriore; indicato intervento medico	Uveite posteriore o pan-uveite	Cecità (20/200 o peggio) nell'occhio affetto	–	10046851
Disturbi oculari - Altro, specificare	Asintomatici o sintomi lievi; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicati interventi	Moderato; indicato intervento minimo, locale o non invasivo; con limitazioni in rapporto all'età delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi o significativi dal punto di vista medico ma non immediatamente pericolosi per la vista; indicata ospedalizzazione o prolungamento della stessa; invalidanti; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Conseguenze pericolose per la vista; indicato intervento urgente; cecità (20/200 o peggio) nell'occhio affetto	–	10015919

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Agitazione	Lieve alterazione dell'umore	Moderata alterazione dell'umore	Grave agitazione; ospedalizzazione non indicata	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	1001497
Allucinazioni	Lievi allucinazioni (ad es., distorsioni percettive)	Allucinazioni moderate	Gravi allucinazioni; ospedalizzazione non indicata	Conseguenze potenzialmente letali, minaccia di provocare lesioni a sé o agli altri; indicata l'ospedalizzazione	Decesso	10019077
Alterazione della personalità	Lieve alterazione della personalità	Moderata alterazione della personalità	Grave cambiamento di personalità; ospedalizzazione non indicata	Conseguenze potenzialmente letali, minaccia di provocare lesioni a sé o agli altri; indicata l'ospedalizzazione	Decesso	10034719
Anorgasmia	Impossibilità a raggiungere l'orgasmo che non incide negativamente sulla relazione	Impossibilità a raggiungere l'orgasmo che interferisce negativamente sulla relazione	–	–	–	10002652
Ansia	Sintomi lievi; intervento non indicato	Sintomi moderati; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi, limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); ospedalizzazione non indicata	Conseguenze potenzialmente letali; indicata l'ospedalizzazione	Decesso	10002855
Aumento della libido	Lieve aumento della libido che non incide negativamente sulla relazione	Moderato aumento della libido che interferisce negativamente sulla relazione	Grave aumento della libido che conduce a comportamenti pericolosi	–	–	10024421
Confusione	Lieve disorientamento	Moderato disorientamento; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Grave disorientamento; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10010300
Delirio	Lieve stato confusionale acuto	Stato confusionale moderato e acuto; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Stato confusionale grave e acuto; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); indicata l'ospedalizzazione	Conseguenze potenzialmente letali, minaccia di provocare lesioni a sé o agli altri; indicata l'ospedalizzazione	Decesso	10012218
Delusione	–	Moderati sintomi di delusione	Gravi sintomi di delusione; ospedalizzazione non indicata	Conseguenze potenzialmente letali, minacce di provocare lesioni a sé o agli altri; indicata l'ospedalizzazione	Decesso	10012260
Depressione	Lievi sintomi depressivi	Moderati sintomi depressivi; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi depressivi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); ospedalizzazione non indicata	Conseguenze potenzialmente letali, minaccia di provocare lesioni a sé o agli altri; indicata l'ospedalizzazione	Decesso	10012378

Euforia	Lieve elevazione del tono dell'umore	Moderata elevazione del tono dell'umore	Grave elevazione del tono dell'umore (ad es., ipomania)	–	–	10015533
Ideazione suicidaria	Aumento dei pensieri di morte non associato ad alcun desiderio di togliersi la vita	Ideazione suicidaria senza uno specifico piano o intento	Piano suicidario specifico senza un serio intento di morire; può non richiedere l'ospedalizzazione	Piano suicidario specifico con il serio intento di morire; necessaria l'ospedalizzazione	–	10042458
Insomnia	Lieve difficoltà ad addormentarsi, mantenere il sonno o svegliarsi presto	Moderata difficoltà ad addormentarsi, mantenere il sonno o svegliarsi presto	Gravi difficoltà ad addormentarsi, mantenere il sonno o svegliarsi presto	–	–	10022437
Irrequietezza	Sintomi lievi; intervento non indicato	Sintomi moderati; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10038743
Mania	Lievi sintomi maniacali (ad es., aumento del tono dell'umore, pensieri rapidi, eloquio rapido, riduzione del bisogno di dormire)	Sintomi maniacali moderati (ad es., in relazione a difficoltà di rapporti e di lavoro; scarsa igiene)	Sintomi maniacali gravi (ad es., ipomania; importanti indiscrezioni sessuali o finanziarie); ospedalizzazione non indicata	Conseguenze potenzialmente letali, minaccia di provocare lesioni a sé o agli altri; indicata l'ospedalizzazione	Decesso	10026749
Orgasmo ritardato	Ritardo nel raggiungimento dell'orgasmo che non incide negativamente sulla relazione	Ritardo nel raggiungimento dell'orgasmo che interferisce negativamente sulla relazione	–	–	–	10057066
Psicosi	Lievi sintomi psicotici	Moderati sintomi psicotici (ad es., discorso disorganizzato; alterata percezione della realtà)	Sintomi psicotici gravi (ad es., paranoia; estrema disorganizzazione); ospedalizzazione non indicata	Conseguenze potenzialmente letali, minaccia di provocare lesioni a sé o agli altri; indicata l'ospedalizzazione	Decesso	10037234
Riduzione della libido	Diminuzione della libido che non incide negativamente sulla relazione	Diminuzione della libido che interferisce negativamente sulla relazione	–	–	–	10024419
Tentativo di suicidio	–	–	Tentativo di suicidio o gesto senza alcun intento di morire, che può non richiedere l'ospedalizzazione	Tentativo di suicidio con l'intenzione di morire che richiede l'ospedalizzazione	Decesso	10042464
Disturbi psichiatrici - Altro, specificare	Asintomatici o sintomi lievi; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicati interventi	Moderati; indicato intervento minimo, locale o non invasivo; limitazioni in rapporto all'età delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi o significativi da un punto di vista medico ma non immediatamente letali; invalidanti; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Conseguenze potenzialmente letali; indicato ricovero o intervento urgente	Decesso	10037175

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Alterazione della voce	Lieve o intermittente cambiamento della voce	Cambiamento moderato o persistente della voce; ancora comprensibile	Grave cambiamento della voce inclusa predominanza di discorso sussurrato; la comprensione può passare attraverso la ripetizione frequente o il contatto visivo diretto; possono rendersi necessari supporti tecnologici	–	–	10047681
Apnea	–	–	Presente; indicato intervento medico	Compromissione respiratoria o emodinamica potenzialmente letale; indicate l'intubazione o l'intervento urgente	Decesso	10002972
Apnea notturna	Russamento e risveglio dal sonno notturno senza periodi di apnea	Moderata apnea e desaturazione dell'ossigeno; eccessiva sonnolenza diurna; indicata valutazione medica; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Desaturazione di ossigeno; associata ipertensione; indicato intervento medico; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Sintomi cardiovascolari o neuropsichiatrici; indicato intervento chirurgico urgente	Decesso	10040975
Aspirazione	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Alterazione delle abitudini alimentari; episodi di tosse o soffocamento dopo aver mangiato o durante la deglutizione; indicato intervento medico (ad es., aspirazione o ossigeno)	Dispnea e sintomi di polmonite (ad es., polmonite ab ingestis); indicata l'ospedalizzazione; non in grado di alimentarsi per os	Compromissione respiratoria o emodinamica potenzialmente letale; indicate l'intubazione o l'intervento urgente	Decesso	10003504
Atelettasia	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica (ad es., dispnea, tosse) indicato intervento medico (ad es., fisioterapia respiratoria, aspirazione); broncoaspirazione	Indicata l'ossigenoterapia; ospedalizzazione o intervento chirurgico in elezione (ad es., stent, laser)	Compromissione respiratoria o emodinamica potenzialmente letale; indicate l'intubazione o l'intervento urgente	Decesso	10003598
Broncospasmo	Sintomi lievi; intervento non indicato	Sintomatico; indicato intervento medico; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); diminuzione della saturazione di ossigeno	Compromissione respiratoria o emodinamica potenzialmente letale; indicate l'intubazione o l'intervento urgente	Decesso	10006482
Chilotorace	Asintomatico; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatico; indicata toracentesi o tubo di drenaggio	Gravi sintomi; indicato intervento chirurgico in elezione	Compromissione respiratoria o emodinamica potenzialmente letale; indicate l'intubazione o l'intervento urgente	Decesso	10051228

Congestione nasale	Sintomi lievi; intervento non indicato	Sintomi moderati; indicato intervento medico	Associata con secrezioni nasali ematiche o epistassi	–	–	10028735
Disestesia laringo-faringea	Lievi sintomi; nessuna sensazione di ansietà; intervento non indicato	Sintomi moderati; ansia lieve ma non dispnea; indicata osservazione di breve durata e/o ansiolitici; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; dispnea e difficoltà di deglutizione; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Conseguenze potenzialmente letali	Decesso	10062667
Dispnea	Dispnea per sforzo moderato	Dispnea per minimo sforzo; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dispnea a riposo, limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10013963
Dolore faringo-laringeo	Dolore lieve	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10034844
Dolore pleurítico	Dolore lieve	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10035623
Edema del laringe	Asintomatico; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatico; indicato intervento medico (ad es., desametasone, adrenalina, antistaminici)	Stridore, difficoltà respiratoria; indicata l'ospedalizzazione	Compromissione delle vie aeree potenzialmente letale; indicato intervento urgente (ad es., tracheotomia o intubazione)	Decesso	10023838
Edema polmonare	Solo riscontri radiologici; minima dispnea da sforzo	Moderata dispnea da sforzo; indicato intervento medico; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Grave dispnea o dispnea a riposo; indicato l'ossigeno; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Compromissione respiratoria potenzialmente letale; indicato intervento urgente o intubazione con supporto ventilatorio	Decesso	10037375
Emorragia broncopolmonare	Sintomi lievi; intervento non indicato	Sintomi moderati; indicato intervento medico	Indicate trasfusione, procedure di radiologia interventistica o endoscopiche, o intervento chirurgico (ad es., emostasi nelle sedi di emorragia)	Compromissione respiratoria o emodinamica potenzialmente letale; indicare l'intubazione o l'intervento urgente	Decesso	10065746
Emorragia faringea	Sintomi lievi; intervento non indicato	Sintomi moderati; indicato intervento medico	Indicate trasfusione, procedure di radiologia interventistica o endoscopiche, o intervento chirurgico (ad es., emostasi nelle sedi di emorragia)	Compromissione respiratoria o emodinamica potenzialmente letale, indicata intubazione o intervento urgente	Decesso	10055315

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Emorragia laringea	Lieve tosse o tracce di emottisi; riscontro laringoscopico	Sintomi moderati; indicato intervento medico	Indicare trasfusione, procedure di radiologia interventistica o endoscopiche, o intervento chirurgico (ad es., emostasi nelle sedi di emorragia)	Compromissione delle vie aeree potenzialmente letale; indicato intervento urgente (ad es., tracheotomia o intubazione)	Decesso	10065759
Emorragia mediastinica	Sola evidenza radiologica; sintomi minimi; non indicato intervento	Sintomi moderati; indicato intervento medico	Trasfusione, indagini radiologiche, intervento in endoscopia o chirurgico (ad es., emostasi in sedi di emorragie)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10056356
Emorragia pleurica	Asintomatica; lieve emorragia confermata alla toracentesi	Sintomatica o associata a pneumotorace; indicato drenaggio toracico	>1000 ml di sangue evacuati; sanguinamento persistente (150-200 ml/h per 2-4 ore); indicate ripetute trasfusioni; indicato intervento chirurgico in elezione	Compromissione respiratoria o emodinamica potenzialmente letale; indicata intubazione o intervento urgente	Decesso	10055319
Epistassi	Sintomi lievi; intervento non indicato	Sintomi moderati; indicato intervento medico (ad es., tampone nasale, cauterizzazione; vasocostrittori topici)	Indicare trasfusione, procedure di radiologia interventistica o endoscopiche, o intervento chirurgico (ad es., emostasi nelle sedi di emorragia)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10015090
Fibrosi polmonare	Lieve ipossiemia; fibrosi polmonare evidenziata radiologicamente con interessamento di <25% del volume polmonare	Moderata ipossiemia; evidenza di ipertensione polmonare; fibrosi polmonare alla radiografia del 25-50%	Grave ipossiemia; evidenza di scompenso cardiaco destro; fibrosi polmonare evidenziata radiologicamente >50-75%	Conseguenze potenzialmente letali (ad es., complicanze emodinamiche/polmonari); indicata intubazione con supporto ventilatorio; evidenza radiologica di fibrosi polmonare >75% con grave quadro a nido d'ape	Decesso	10037383
Fistola bronchiale	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; indicato drenaggio toracico o trattamento medico; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); indicata endoscopia o intervento chirurgico (ad es., stent o chiusura primaria)	Conseguenze potenzialmente letali; indicato l'intervento chirurgico urgente con toracoplastica, posizionamento di drenaggio stabile aperto o toracotomie multiple	Decesso	10006437
Fistola broncopleurica	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; indicato drenaggio toracico o trattamento medico; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); indicata endoscopia o intervento chirurgico (ad es., stent o chiusura primaria)	Conseguenze potenzialmente letali; indicato l'intervento chirurgico urgente con toracoplastica, posizionamento di drenaggio stabile aperto o toracotomie multiple	Decesso	10053481

Fistola faringea	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; indicato drenaggio toracico o intervento medico; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); indicata endoscopia o intervento chirurgico (ad es., stent o sutura primaria primaria)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10034825
Fistola laringea	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; indicato drenaggio toracico o terapia medica; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); indicata endoscopia o intervento chirurgico (ad es., stent o chiusura primaria)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente (ad es., toracoplastica, drenaggio stabile aperto o toracotomie multiple)	Decesso	10065786
Fistola polmonare	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatico; indicato drenaggio toracico o trattamento medico; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); indicati il posizionamento di stent in endoscopia o l'intervento chirurgico	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10065873
Fistola tracheale	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; indicato drenaggio toracico o intervento medico; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); indicati l'intervento in endoscopia o chirurgico (ad es., stent o sutura primaria)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente (ad es., toracoplastica, drenaggio stabile o multiple toracotomie)	Decesso	10065787
Gocciolamento rinofaringeo	Sintomi lievi; intervento non indicato	Sintomi moderati; indicato intervento medico	–	–	–	10036402
Insufficienza respiratoria	–	–	–	Conseguenze potenzialmente letali; indicato intervento urgente, intubazione o supporto ventilatorio	Decesso	10038695
Ipertensione polmonare	Dispnea minima; riscontro all'esame obiettivo o altro tipo di valutazione	Dispnea moderata; tosse; necessari la valutazione con cateterismo cardiaco e l'intervento medico	Gravi sintomi, associati con ipossiemia, insufficienza cardiaca destra; indicata l'ossigenoterapia	Compromissione delle vie aeree potenzialmente letale; indicato intervento urgente (ad es., tracheotomia o intubazione)	Decesso	10037400
Ipossia	–	Diminuzione della saturazione di ossigeno con l'esercizio fisico (ad es., pulsossimetro <88%); indicato ossigeno supplementare non continuo	Diminuzione della saturazione di ossigeno a riposo (ad es., pulsossimetro <88% o PaO ₂ ≤55 mmHg)	Compromissione delle vie aeree potenzialmente letale; indicato intervento urgente (ad es., tracheotomia o intubazione)	Decesso	10021143
Laringite	Lieve mal di gola; voce roca	Moderato mal di gola; indicati analgesici	Grave dolore alla gola; indicata endoscopia	–	–	10065735

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Laringospasmo	–	Episodio transitorio, l'intervento non è indicato	Episodi ricorrenti; indicato intervento non invasivo (ad es., tecnica di respirazione, massaggio nel punto di pressione)	Episodi persistenti o gravi associati a sincopie; indicato intervento urgente (ad es., laringoscopia a fibre ottiche, intubazione, iniezione di botulino)	Decesso	10023891
Mal di gola	Dolore lieve	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); limitata capacità di deglutire	–	–	10041367
Mucosite faringea	Solo reperti endoscopici; sintomi minimi con normale assunzione di cibo; dolore lieve ma gli analgesici non sono indicati	Dolore moderato e indicazione all'uso di analgesici; alterata assunzione orale; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; non in grado di alimentarsi o idratarsi adeguatamente per os, limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065881
Mucosite laringea	Reperto solo endoscopico; lieve disagio con normale assunzione di cibo	Moderata sensazione di fastidio; alterata assunzione orale	Grave dolore; gravemente alterata la nutrizione/deglutizione; indicato intervento medico	Compromissione delle vie aeree potenzialmente letale; indicato intervento urgente (ad es., tracheotomia o intubazione)	Decesso	10065880
Mucosite tracheale	Solo riscontri endoscopici; minima emottisi, dolore o sintomi respiratori	Sintomi moderati; indicato intervento medico; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; emorragia o sintomi respiratori; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065900
Necrosi faringea	–	–	Incapacità di alimentarsi in modo adeguato dal tratto gastrointestinale; indicata nutrizione enterale o NPT; indicate procedure di radiologia interventistica o endoscopiche, o intervento chirurgico (ad es., emostasi nelle sedi di emorragia)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10065706
Ostruzione bronchiale	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica (ad es., dispnea lieve); indicata valutazione endoscopica; evidenze radiografiche di atelettasia/collasso lobare; indicato trattamento medico (ad es., cortisonici, broncodilatatori)	Dispnea con stridore; indicato intervento endoscopico (ad es., laser, posizionamento di stent)	Compromissione respiratoria o emodinamica potenzialmente letale; indicate l'intubazione o l'intervento urgente	Decesso	10006440

Ostruzione laringea	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica (ad es., respirazione rumorosa) ma che non provoca sofferenza respiratoria; terapia medica indicata (ad es., corticosteroidi), limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); stridore; indicato intervento endoscopico (ad es., stent, laser)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10059639
Pneumotorace	Asintomatico; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatico; indicato intervento (ad es., il posizionamento del drenaggio senza pleurodesi)	Sclerosi e/o intervento chirurgico indicati; indicata l'ospedalizzazione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10035759
Polmonite	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatico; indicato intervento medico; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); indicato l'ossigeno	Compromissione respiratoria potenzialmente letale; indicato intervento urgente (ad es., tracheotomia o intubazione)	Decesso	10035742
Raucedine	Lieve o intermittente cambiamento della voce; pienamente comprensibile; si risolve spontaneamente	Cambiamenti moderati o persistenti della voce; l'individuo può occasionalmente dover ripetere ma è comprensibile al telefono; indicata valutazione medica	Gravi cambiamenti della voce incluso discorso prevalentemente sussurrato	–	–	10020201
Rinite allergica	Sintomi lievi; intervento non indicato	Sintomi moderati; indicato intervento medico	–	–	–	10001723
Sibilo	Rilevabile rumore delle vie aeree con sintomi minimi	Sintomi moderati; indicato intervento medico; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi respiratori con limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); indicate l'ossigenoterapia o l'ospedalizzazione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10047924
Sindrome da acido retinoico	Ritenzione di liquidi; aumento di peso <3 kg; indicato intervento con restrizione di liquidi e/o diuretici	Segni o sintomi moderati; indicati gli steroidi	Gravi sintomi; indicata l'ospedalizzazione	Conseguenze potenzialmente letali; indicato supporto ventilatorio	Decesso	10038921
Sindrome da distress respiratorio (ARDS)	–	–	Presente con evidenze radiologiche; non indicata intubazione	Compromissione respiratoria o emodinamica potenzialmente letale; indicate l'intubazione o l'intervento urgente	Decesso	10001409
Singhiozzo	Sintomi lievi; intervento non indicato	Sintomi moderati; indicato intervento medico; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi, interferiscono con il sonno; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10020039

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Sinusite	Asintomatica formazione di croste sulla mucosa; secrezioni striate di sangue	Stenosi sintomatica o edema/restringimento che interferisce con il flusso d'aria; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Stenosi con una significativa ostruzione nasale; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Necrosi dei tessuti molli o ossei; indicato intervento chirurgico urgente	Decesso	10062244
Starnuto	Sintomi lievi; intervento non indicato	Sintomi moderati; indicato intervento medico	–	–	–	10041232
Stenosi bronchiale	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica (ad es., ronchi o sibili) ma senza sofferenza respiratoria; indicato intervento medico (ad es., cortisonici, broncodilatatori)	Dispnea con stridore; indicato intervento endoscopico (ad es., laser, posizionamento di stent)	Compromissione respiratoria o emodinamica potenzialmente letale; indicate l'intubazione o l'intervento urgente	Decesso	10063524
Stenosi faringea	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica (ad es., respirazione rumorosa), ma che non provoca sofferenza respiratoria, terapia medica indicata (ad es., corticosteroidi), limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); stridore; indicato intervento in endoscopia (ad es., stent, laser)	Compromissione delle vie aeree potenzialmente letale; indicato intervento urgente (ad es., tracheotomia o intubazione)	Decesso	10050028
Stenosi laringea	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica (ad es., respirazione rumorosa) ma che non provoca sofferenza respiratoria, terapia medica indicata (ad es., corticosteroidi)	Limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); stridore; indicato intervento endoscopico (ad es., stent, laser)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10023862
Stenosi tracheale	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica (ad es., respirazione rumorosa) ma che non provoca sofferenza respiratoria, terapia medica indicata (ad es., corticosteroidi)	Stridore o insufficienza respiratoria con limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); indicato intervento endoscopico (ad es., stent, laser)	Compromissione delle vie aeree potenzialmente letale; indicato intervento urgente (ad es., tracheotomia o intubazione)	Decesso	10050816
Stridore	–	–	Insufficienza respiratoria con limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); indicato intervento medico	Compromissione delle vie aeree potenzialmente letale; indicato intervento urgente (ad es., tracheotomia o intubazione)	Decesso	10042241

Tosse	Lievi sintomi; non indicato intervento	Sintomi moderati, indicato intervento medico; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10011224
Tosse produttiva	Occasionale/minima produzione di espettorato con la tosse	Moderata produzione di espettorato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Produzione di espettorato persistente o copiosa; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10036790
Versamento pleurico	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatico; indicato intervento (ad es. diuretici o toracentesi terapeutica)	Sintomatico con insufficienza respiratoria e ipossia; indicato intervento chirurgico compreso drenaggio toracico o pleurodesi	Compromissione respiratoria o emodinamica potenzialmente letale; indicata intubazione o intervento urgente	Decesso	10035598
Disturbi respiratori, toracici e mediastinici - Altro, specificare	Asintomatici o sintomi lievi; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicati interventi	Moderati; indicato intervento minimo, locale o non invasivo; con limitazioni in rapporto all'età delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi o significativi dal punto di vista medico ma non immediatamente letali; indicata ospedalizzazione o prolungamento della stessa; invalidanti; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10038738

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Decesso fetale	–	–	–	–	Perdita del feto a qualsiasi età gestazionale	10016479
Gravidanza inattesa	–	–	Gravidanza inattesa	–	–	10045542
Parto prematuro	Parto di un neonato nato vivo a >34-37 settimane di gestazione	Parto di un neonato nato vivo a >28-34 settimane di gestazione	Parto di un neonato nato vivo a 24-28 settimane di gestazione	Parto di un neonato nato vivo a 24 settimane di gestazione o meno	–	10036595
Ritardo della crescita fetale	–	<10% percentile del peso per l'età gestazionale	<5% percentile del peso per l'età gestazionale	<1% percentile del peso per l'età gestazionale	–	10054746
Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali - Altro, specificare	Asintomatici o sintomi lievi; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicati interventi	Moderati; indicato intervento minimo, locale o non invasivo; limitazioni in rapporto all'età delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi o significativi dal punto di vista medico ma non immediatamente letali; indicata ospedalizzazione o prolungamento del ricovero in corso; invalidanti; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10036585

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Aumento della bilirubinemia	>LSN-1,5 x LSN	>1,5-3,0 x LSN	>3,0-10,0 x LSN	>10,0 x LSN	–	10005364
Aumento della conta linfocitaria	–	>4000/mm ³ -20000/mm ³	>20000/mm ³	–	–	10025258
Aumento della CPK	>LSN-2,5 x LSN	>2,5 x LSN-5 x LSN	>5 x LSN-10 x LSN	>10,0 x LSN	–	10011268
Aumento della creatinina	>1-1,5 x basale; >LSN-1,5 x LSN	>1,5-3,0 x basale; >1,5-3,0 x LSN	>3,0 x basale; >3,0-6,0 x LSN	>6,0 x LSN	–	10011368
Aumento della fosfatasi alcalina	>LSN-2,5 x LSN	>2,5-5,0 x LSN	>5,0-20,0 x LSN	>20,0 x LSN	–	10001675
Aumento della lipasi	>LSN-1,5 x LSN	>1,5-2,0 x LSN	>2,0-5,0 x LSN	>5,0 x LSN	–	10024574
Aumento della troponina I cardiaca	Livelli al di sopra del limite superiore di normalità e al di sotto del valore indicativo di infarto del miocardio, come definito dal produttore del kit di laboratorio	–	Livelli coerenti con infarto del miocardio, come definito dal produttore del kit di laboratorio	–	–	10007612
Aumento della troponina T cardiaca	Livelli al di sopra del limite superiore di normalità e al di sotto del valore indicativo di infarto del miocardio, come definito dal produttore del kit di laboratorio	–	Livelli coerenti con infarto del miocardio, come definito dal produttore del kit di laboratorio	–	–	10007613
Aumento dell'alanina aminotransferasi	>LSN-3,0 x LSN	>3,0-5,0 x LSN	>5,0-20,0 x LSN	>20,0 x LSN	–	10001551

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Aumento dell'aspartato aminotransferasi	>LSN-3,0 x LSN	>3,0-5,0 x LSN	>5,0-20,0 x LSN	>20,0 x LSN	–	1003481
Aumento delle GGT	>LSN-2,5 x LSN	>2,5-5,0 x LSN	>5,0-20,0 x LSN	>20,0 x LSN	–	10056910
Aumento dell'emoglobina	Aumento >0-2 g/dL al di sopra del LSN o al di sopra del basale se il basale è al di sopra del LSN	Aumento >2-4 g/dL sopra il LSN o sopra il valore basale se il basale è al di sopra del LSN	Aumento >4 g/dL al di sopra del LSN o al di sopra del basale se questo è al di sopra del LSN	–	–	10055599
Aumento di peso	5-<10% rispetto al basale	10-<20% rispetto al basale	≥20% rispetto al basale	–	–	10047896
Capacità vitale anormale	90-75% del valore atteso	<75-50% del valore atteso; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	<50% del valore atteso; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10047580
Diminuita capacità di diffusione del monossido di carbonio	3-5 unità al di sotto del LIN; per il follow-up, diminuzione di 3-5 unità (ml/min/mmHg) al di sotto del valore basale	6-8 unità al di sotto del LIN; per il follow-up, in un soggetto asintomatico diminuzione di >5-8 unità (ml/min/mmHg) al di sotto del valore basale	Riduzione asintomatica; calo >8 unità; calo >5 unità insieme alla presenza di sintomi polmonari (ad es., ipossia di grado >2 o dispnea di grado >2 o superiore)	–	–	10065906
Diminuzione degli enzimi pancreatici	<LIN e asintomatico	Aumento della frequenza delle evacuazioni, del loro volume o cattivo odore; steatorrea	Sequela di deficit di assorbimento	–	–	10062646
Diminuzione dei globuli bianchi	<LIN-3000/mm ³ ; <LIN-3,0 x 10 ⁹ /L	<3000-2000/mm ³ ; <3,0-2,0 x 10 ⁹ /L	<2000-1000/mm ³ ; <2,0-1,0 x 10 ⁹ /L	<1000/mm ³ ; <1,0 x 10 ⁹ /L	–	10049182
Diminuzione dei linfociti CD4	<LIN-500/mm ³ ; <LIN-0,5 x 10 ⁹ /L	<500-200/mm ³ ; <0,5-0,2 x 10 ⁹ /L	<200-50/mm ³ ; <0,2 x 0,05-10e9/L	<50/mm ³ ; <0,05 x 10 ⁹ /L	–	10007839
Diminuzione del fibrinogeno	<1,0-0,75 x LIN o diminuzione <del 25% rispetto al basale	<0,75-0,5 x LIN o riduzione del 25-<50% rispetto al basale	<0,5-0,25 X LIN o riduzione 50-<75% rispetto al basale	<0,25 x LIN o riduzione del 75% rispetto al valore basale o valore assoluto <50 mg/dL	–	10016596

Diminuzione del volume espiratorio forzato	FEV1% (percentuali osservate di FEV1 e FVC in relazione ai rispettivi valori attesi) 99-70% del previsto	FEV1 60-69%	50-59%	≤49%	–	10016987
Diminuzione dell'aptoglobina	<LIN	–	–	–	–	10019150
Diminuzione dell'escrezione di urina	–	–	Oliguria (<80 ml in 8 ore)	Anuria (<240 ml nelle 24 ore)	–	10059895
Diminuzione della conta dei neutrofilii	<LIN-1500/mm ³ ; <LIN-1,5 x 10 ⁹ /L	<1500-1000/mm ³ ; <1,5-1,0 x 10 ⁹ /L	<1000-500/mm ³ ; <1,0-0,5 x 10 ⁹ /L	<500/mm ³ ; <0,5 x 10 ⁹ /L	–	10029366
Diminuzione della conta linfocitaria	<LIN-800/mm ³ ; <LIN-0,8-10 ⁹ /L	<800-500/mm ³ ; <0,8-0,5 x 10 ⁹ /L	<500-200/mm ³ ; <0,5-0,2 x 10 ⁹ /L	<200/mm ³ ; <0,2 x 10 ⁹ /L	–	10025256
Diminuzione della conta piastrinica	<LIN-75000/mm ³ ; <LIN-75,0 x 10 ⁹ /L	<75000-50.000/mm ³ ; 75,0 <- 50,0 x 10 ⁹ /L	<50000-25000/mm ³ ; <50,0-25,0 x 10 ⁹ /L	<25000/mm ³ ; <25,0 x 10 ⁹ /L	–	10035528
Diminuzione della corticotropina plasmatica	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; indicato intervento medico	Indicata l'ospedalizzazione	–	–	10005452
Incremento dei livelli di amilasi	>LSN-1,5 x LSN	>1,5-2,0 x LSN	>2,0-5,0 x LSN	>5,0 x LSN	–	10040139
Incremento dell'INR	>1-1,5 x LSN; >1-1,5 volte superiore al basale se in terapia anticoagulante	>1,5-2,5 x LSN; >1,5-2,5 volte superiore al basale se in terapia anticoagulante	>2,5 x LSN; >2,5 volte superiore al basale se in terapia anticoagulante	–	–	10022402
Ipercolesterolemia	>LSN-300 mg/dL; >LSN-7,75 mmol/L	>300-400 mg/dL; >7,75-10,34 mmol/L	>400-500 mg/dL; >10,34-12,92 mmol/L	>500 mg/dL; >12,92 mmol/L	–	10008661
Livelli anormali di gonadotropine nel sangue	Asintomatici; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatici; indicato intervento medico; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10005561
Livelli anormali di ormone antidiuretico nel sangue	Asintomatici; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatici; indicato intervento medico	Indicata l'ospedalizzazione	–	–	10005332

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Livelli anormali di ormone della crescita	Asintomatici; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatici; indicato intervento medico; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	–	–	–	10018748
Livelli anormali di prolattina nel sangue	Asintomatici; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomi moderati; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	–	–	–	10005778
Perdita di peso	Da 5 a <10% rispetto al basale; intervento non indicato	10-<20% rispetto al basale; supporto nutrizionale indicato	≥20% rispetto al basale; indicate nutrizione enterale o NPT	–	–	10047900
Prolungamento del tempo di tromboplastina parziale attivato	>LSN-1,5 x LSN	>1,5-2,5 x LSN	>2,5 x LSN; emorragia	–	–	10000636
Prolungamento all'ECG dell'intervallo QT corretto	QTc 450-480 ms	QTc 481-500 ms	QTc ≥501 ms in almeno due distinti ECG	QTc ≥501 o variazione >60 ms rispetto al basale e torsione di punta o tachicardia ventricolare polimorfa o segni/sintomi di grave aritmia	–	10014383
Ridotta frazione di eiezione	–	Frazione di eiezione a riposo (FE) 50-40%; riduzione del 10-19% rispetto al basale	Frazione di eiezione a riposo (FE) 39-20%; riduzione >20% rispetto al basale	Frazione di eiezione a riposo (FE) <20%	–	10050528
Indagini - Altro, specificare	Asintomatici o sintomi lievi; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicati interventi	Moderati; indicato intervento minimo, locale o non invasivo; con limitazioni in rapporto all'età delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi o significativi dal punto di vista medico ma non immediatamente letali; indicata ospedalizzazione o prolungamento della stessa; invalidanti; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10022891

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Appendicite	–	–	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10003011
Appendicite perforata	–	Sintomatica; indicato intervento medico	Gravi sintomi; indicato intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10003012
Arterite infettiva	–	–	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065744
Cervicite	–	Localizzata; indicato intervento locale (ad es., antibiotico topico, antifungini o antivirali)	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10008330
Colecistite	–	–	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica, endoscopia o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10062632
Congiuntivite infettiva	–	Localizzata; indicato intervento locale (ad es., antibiotico topico, antifungini o antivirali)	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10010742
Encefalite	–	–	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; gravi alterazioni dello stato mentale; crisi auto-limitantisi; anomalie neurologiche focali	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10014594
Encefalomielite	–	–	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10014621
Endocardite	–	–	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10014678

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Endoftalmite	–	Indicato intervento locale	Indicati intervento sistemico o ospedalizzazione	Cecità (20/200 o peggio)	–	10014801
Enterocolite	–	Più di 3 evacuazioni di feci non formate nelle 24 ore o durata del disturbo >48 ore; moderato dolore addominale	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica, endoscopia o chirurgia; diarrea acquosa profusa con segni di ipovolemia; diarrea ematica; febbre; severo dolore addominale; indicata l'ospedalizzazione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10058838
Epatite	–	–	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10056522
Epatite virale	Asintomatica, trattamento non indicato	–	Disfunzione epatica sintomatica; fibrosi all'esame biptico; cirrosi compensata; riattivazione di un'epatite cronica	Scompenso epatico (ad es., ascite, coagulopatia, encefalopatia, coma)	Decesso	10019799
Faringite	–	Localizzata; indicato intervento locale (ad es., antibiotico topico, antifungini o antivirali)	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10034835
Flebite infettiva	–	Localizzata; indicato intervento locale (ad es., antibiotico topico, antifungini o antivirali)	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10056627
Gengivite	Indicazione a terapia locale (sciacquo orale da ingerire)	Sintomi moderati; indicato trattamento per os (ad es., antibiotici, antifungini, antivirali)	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10018784
Infezione a un nervo craniale	–	–	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065765
Infezione addominale	–	–	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10056519

Infezione alla prostata	–	Sintomi moderati; indicato trattamento per os (ad es., antibiotici, antifungini, antivirali)	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica, endoscopia o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	1005062
Infezione anorettale	Localizzata; indicato un intervento locale	Indicato trattamento per os (ad es., antibiotici, antifungini, antivirali)	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica, endoscopia o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10061640
Infezione articolare	–	Localizzata; indicato intervento locale; indicato intervento per os (ad es., antibiotici, antifungini, antivirali); indicata agoaspirazione (singola o multipla)	Indicato intervento artroscopico (ad es., drenaggio) o artrotomia (ad es., drenaggio chirurgico aperto)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10023216
Infezione bronchiale	–	Sintomi moderati; indicato trattamento per os (ad es., antibiotici, antifungini, antivirali)	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica, endoscopia o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10055078
Infezione ciecale	–	–	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; radiologia interventistica, endoscopia o chirurgia indicate	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065761
Infezione correlata ad un dispositivo medico	–	–	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10064687
Infezione cutanea	Localizzata, indicato un intervento locale	Indicato trattamento per os (ad es., antibiotici, antifungini, antivirali)	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10040872
Infezione da catetere	–	Localizzata; indicato intervento locale; indicato intervento per os (ad es., antibiotici, antifungini, antivirali)	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10007810
Infezione dei tessuti molli	–	Localizzata; indicato intervento locale (ad es., antibiotico topico, antifungini o antivirali)	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10062255
Infezione del labbro	Localizzata, indicato un intervento locale	Indicato trattamento per os (ad es., antibiotici, antifungini, antivirali)	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica o chirurgia	–	–	10065755

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Infezione del pene	–	Localizzata; indicato intervento locale (ad es., antibiotico topico, antifungini o antivirali)	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10061912
Infezione del tenue	–	Sintomi moderati; indicato trattamento per os (ad es., antibiotici, antifungini, antivirali)	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065771
Infezione del tratto biliare	–	–	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10061695
Infezione della cornea	–	Localizzata; indicato intervento locale (ad es., antibiotico topico, antifungini o antivirali)	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10061788
Infezione della ghiandola salivare	–	Sintomi moderati; indicato trattamento per os (ad es., antibiotici, antifungini, antivirali)	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10039413
infezione della mammella	–	Infezione locale con sintomi moderati; indicato trattamento per os (ad es., antibiotici, antifungini, antivirali)	Gravi infezioni; adenite ascellare; indicato intervento con antibatterici e.v., antimicotici o antivirali	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10006259
Infezione della mucosa	Localizzata, indicato un intervento locale	Indicato trattamento per os (ad es., antibiotici, antifungini, antivirali)	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065764
Infezione della vescica	–	Indicato trattamento per os (ad es., antibiotici, antifungini, antivirali)	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica, endoscopia o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10005047
Infezione delle alte vie respiratorie	–	Sintomi moderati; indicato trattamento per os (ad es., antibiotici, antifungini, antivirali)	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica, endoscopia o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10046300

Infezione delle vie urinarie	–	Localizzata; indicato intervento locale (ad es., antibiotico topico, antifungini o antivirali)	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10046571
Infezione dentale	–	Localizzata; indicato intervento locale (ad es., antibiotico topico, antifungini, antivirali o),	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10048762
Infezione di un nervo periferico	–	Localizzata; indicato intervento locale (ad es., antibiotico topico, antifungini o antivirali)	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065766
Infezione di una ferita	–	Localizzata; indicato intervento locale (ad es., antibiotico topico, antifungini o antivirali)	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10048038
Infezione duodenale	–	Sintomi moderati; indicato intervento medico (ad es., antibiotici per os)	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065752
Infezione esofagea	–	Indicato intervento locale (ad es., antibiotici per os, antifungini, antivirali)	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10058804
Infezione nella sede della stomia	Localizzata, indicato un intervento locale	Indicato trattamento per os (ad es., antibiotici, antifungini, antivirali)	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica, endoscopia o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10064505
Infezione oculare	–	Localizzata; indicato intervento locale (ad es., antibiotico topico, antifungini o antivirali)	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente; enucleazione	Decesso	10015929
Infezione ossea	–	–	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10061017
Infezione ovarica	–	Localizzata; indicato intervento locale (ad es., antibiotico topico, antifungini o antivirali)	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10055005

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Infezione pancreatica	–	–	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10051741
Infezione pelvica	–	Sintomi moderati; indicato trattamento per os (ad es., antibiotici, antifungini, antivirali)	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10058674
Infezione periorbitale	–	Localizzata; indicato intervento locale (ad es., antibiotico topico, antifungini o antivirali)	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10051472
Infezione peritoneale	–	–	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica, endoscopia o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10057262
Infezione pleurica	–	Localizzata; indicato intervento locale (ad es., antibiotico topico, antifungini o antivirali)	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica, endoscopia o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10061351
Infezione polmonare	–	Sintomi moderati; indicato trattamento per os (ad es., antibiotici, antifungini, antivirali)	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica, endoscopia o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10061229
Infezione scrotale	–	Localizzata; indicato intervento locale (ad es., antibiotico topico, antifungini o antivirali)	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10062156
Infezione splenica	–	–	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10062112
Infezione ungueale	Localizzata, indicato un intervento locale	Indicato trattamento per os (ad es., antibiotici, antifungini, antivirali)	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica o chirurgia	–	–	10061304

Infezione uretrale	–	Localizzata; indicato intervento locale (ad es., antibiotico topico, antifungini o antivirali)	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica, endoscopia o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10052298
Infezione uterina	–	Sintomi moderati; indicato trattamento per os (ad es., antibiotici, antifungini, antivirali)	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; radiologia interventistica o chirurgia indicate	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10062233
Infezione vaginale	–	Localizzata; indicato intervento locale (ad es., antibiotico topico, antifungini o antivirali)	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; radiologia interventistica o chirurgia indicate	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10046914
Infezione vulvare	Localizzata, indicato un intervento locale	Indicato trattamento per os (ad es., antibiotici, antifungini, antivirali)	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; radiologia interventistica o chirurgia indicate	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065772
Infezioni renali	–	–	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica, endoscopia o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10023424
Laringite	–	Sintomi moderati; indicato trattamento per os (ad es., antibiotici, antifungini, antivirali)	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10023874
Linfadenite	–	Localizzata; indicato intervento locale (ad es., antibiotico topico, antifungini o antivirali)	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10050823
Mediastinite	–	–	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10057483
Meningite	–	–	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; radiologia interventistica o chirurgia indicate; deficit neurologici focali	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10027199
Miosite	–	Localizzata; indicato intervento locale (ad es., antibiotico topico, antifungini o antivirali)	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10021918

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Otite esterna	–	Localizzata; indicato intervento locale (ad es., antibiotico topico, antifungini o antivirali)	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10033072
Otite media	–	Localizzata; indicato intervento locale (ad es., antibiotico topico, antifungini o antivirali)	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; indicate radiologia interventistica o chirurgia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10033078
Paronichia	Edema o eritema del vallo ungueale; interruzione della cuticola	Indicato intervento localizzato; indicato trattamento per os (ad es., antibiotici, antifungini, antivirali); edema o eritema con dolore dell'eponichio; associato a perdita o separazione della lamina ungueale; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Indicato intervento chirurgico o antibiotici e.v.; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10034016
Rash papulo-pustoloso	Papule e/o pustole che ricoprono <10% della superficie corporea, che possono o meno essere associate a sintomi di prurito o di dolore	Papule e/o pustole che ricoprono il 10-30% della superficie corporea, che possono o meno essere associate a sintomi di prurito o dolore; associate a conseguenze psicosociali; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Papule e/o pustole che ricoprono >30% della superficie corporea, che possono o meno essere associate a sintomi di prurito o dolore, limitando le attività quotidiane di cura della persona (self-care ADL, nota 2); associate a superinfezione locale con indicazione all'uso di antibiotici per os	Papule e/o pustole che ricoprono qualsiasi% di superficie corporea, che possono o meno essere associate a sintomi di prurito o dolore e sono associate a sovrainfezione con indicazione ad antibiotico terapia ev; conseguenze potenzialmente letali	Decesso	10069138
Rash pustoloso	–	Localizzato; indicato intervento locale (ad es., antibiotico topico, antifungini o antivirali)	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; radiologia interventistica o chirurgia indicate	–	–	10037888
Rinite infettiva	–	Localizzata; indicato intervento locale (ad es., antibiotico topico, antifungini o antivirali)	–	–	–	10059827
Sepsi	–	–	–	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10040047

Sinusite	–	Localizzata; indicato intervento locale (ad es., antibiotico topico, antifungini o antivirali)	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; radiologia interventistica, endoscopia o chirurgia indicate	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10040753
Tracheite	–	Sintomi moderati; indicato trattamento per os (ad es., antibiotici, antifungini, antivirali)	Indicato intervento con antibiotici e.v., antifungini o antivirali; radiologia interventistica, endoscopia o chirurgia indicate	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10044302
Infezioni e infestazioni - Altro, specificare	Asintomatici o sintomi lievi; solo osservazione clinico-diagnostica; interventi non indicati	Moderati; indicato intervento minimo, locale o non invasivo; in rapporto all'età limitazioni delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi o significativi dal punto di vista medico ma non immediatamente letali; indicata l'ospedalizzazione o un prolungamento della stessa; invalidanti; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10021881

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Caduta	Minore, senza lesioni conseguenti; intervento non indicato	Sintomatica; indicato intervento non invasivo	Indicata l'ospedalizzazione	–	–	10016173
Complicanza di un accesso vascolare	–	Dislocazione del dispositivo, ostruzione, perdita o malposizionamento; è indicata la sostituzione del dispositivo	Trombosi venosa profonda o cardiaca; indicato intervento (ad es., anticoagulante, lisi, filtro, procedure invasive)	Evento embolico inclusa l'embolia polmonare o una trombosi potenzialmente fatale	Decesso	10062169
Complicanza postoperatoria di una procedura toracica	–	Estubato entro 24-72 ore dopo l'intervento	Estubato >72 ore dopo l'intervento, ma prima che si potesse indicazione alla tracheostomia	Compromissione potenzialmente letale delle vie aeree; indicato intervento urgente (ad es., tracheotomia o intubazione)	Decesso	10056745
Complicanze da ferita	Separazione dei margini della ferita ≤25%, non più profonda della fascia superficiale	Separazione dei margini della ferita >25%; indicato trattamento locale	Ernia senza segni di strozzamento; distruzione/deiscenza fasciale; chiusura primaria della ferita o indicazione alla revisione chirurgica	Ernia con segni di strozzamento; indicata ricostruzione maggiore con lembo, innesto, resezione o amputazione	Decesso	10053692
Deiscenza della ferita	Separazione dei margini della ferita ≤25%, non più profonda della fascia superficiale	Separazione dei margini della ferita >25% con trattamento locale; ernia asintomatica o ernia sintomatica senza evidenza di strozzamento	Lacerazione fasciale o deiscenza senza eviscerazione; chiusura primaria della ferita o indicazione alla revisione chirurgica	Conseguenze potenzialmente letali; ernia sintomatica con segni di strozzamento; rottura fasciale con eviscerazione; indicata ricostruzione maggiore con lembo, innesto, resezione o amputazione	Decesso	10048031
Dermatite da radiazione	Lieve eritema o desquamazione secca	Eritema da modesto a vivace; desquamazione umida irregolare, per lo più confinata a pieghe e rughe cutanee; edema moderato	Desquamazione umida in zone diverse dalle pieghe cutanee; emorragia indotta da trauma minore o abrasione	Conseguenze potenzialmente letali; necrosi cutanea o ulcerazione a tutto spessore del derma; sanguinamento spontaneo dalla sede interessata; indicato innesto cutaneo	Decesso	10061103
Emorragia intraoperatoria	–	–	Indicati esami radiologici o endoscopici post-operatori o intervento chirurgico	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10055298
Emorragia post-operatoria	Minimo sanguinamento individuato durante l'esame clinico; intervento non indicato	Moderato sanguinamento; indicato intervento di radiologia interventistica, endoscopico o chirurgico	Indicata trasfusione di ≥2 unità (10 cc/kg in ambito pediatrico) di pRBCs al di là delle specifiche del protocollo; urgente indicazione a radiologia interventistica, endoscopia o chirurgia d'elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10055322

Emorragia tracheale	Minimo sanguinamento evidenziato agli esami clinici o diagnostici; intervento non indicato	Moderato sanguinamento; indicato intervento medico	Grave emorragia; indicata trasfusione; indicate procedure di radiologia interventistica o endoscopiche	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10062548
Frattura	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica ma non scomposta; indicata immobilizzazione	Gravi sintomi; dislocazione dell'osso o ferita aperta con esposizione ossea; invalidante; indicato intervento chirurgico	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10017076
Frattura del polso	Lieve; indicato un intervento non di tipo chirurgico	Limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1); indicato l'intervento chirurgico	Limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); indicata chirurgia in elezione	–	–	10048049
Frattura della caviglia	Lieve; non indicato l'intervento chirurgico	Limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1); indicato intervento chirurgico	Limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); indicata chirurgia in elezione	–	–	10002544
Frattura dell'anca	–	Frattura composta; dolore lieve; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1); non indicato intervento chirurgico	Dolore grave; indicata l'ospedalizzazione o interventi per il controllo del dolore (ad es., trazione); indicato intervento chirurgico	Conseguenze potenzialmente letali; sintomi associati a compromissione neurovascolare	–	10020100
Frattura vertebrale	Lieve dolore alla schiena; indicata la prescrizione di analgesici da banco	Moderato dolore alla schiena; indicata la prescrizione di analgesici; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Grave dolore di schiena; indicati ospedalizzazione o interventi per il controllo del dolore (ad es., vertebroplastica); limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); disabilità	Conseguenze potenzialmente letali; sintomi associati a compromissione neurovascolare	Decesso	10041569
Lacerazione della stomia intestinale	Solo osservazioni diagnostiche in soggetto asintomatico; intervento non indicato	Sintomatica; indicato intervento medico	Gravi sintomi; indicate radiologia interventistica, endoscopia o chirurgia d'elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10059095
Lesione alla testa e al collo intraoperatoria	È indicata una riparazione primaria dell'organo/struttura danneggiati	È indicata una resezione parziale degli organi/strutture danneggiati	Indicate resezione completa o ricostruzione di organi/strutture danneggiate; invalidante	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065842
Lesione all'orecchio intraoperatoria	È indicata una riparazione primaria dell'organo/struttura danneggiati	È indicata una resezione parziale degli organi/strutture danneggiati	Indicata resezione completa dell'organo/struttura danneggiati; invalidante (ad es., disturbi dell'udito, disturbi dell'equilibrio)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065844

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Lesione aortica	–	–	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); invalidante; indicate riparazione o revisione	Conseguenze potenzialmente letali; evidenza di danno d'organo; indicato intervento chirurgico urgente	Decesso	10002899
Lesione arteriosa	Evidenza diagnostica in soggetto asintomatico; intervento non indicato	Sintomatica (ad es., claudicatio); riparazione o revisione non indicate	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); invalidante; indicate riparazione o revisione	Conseguenze potenzialmente letali; evidenza di danno d'organo; indicato intervento chirurgico urgente	Decesso	10003162
Lesione arteriosa intraoperatoria	È indicata una riparazione primaria dell'organo/struttura danneggiati	È indicata una resezione parziale degli organi/strutture lesionati	Indicate resezione completa o ricostruzione di organi/strutture danneggiati; invalidante	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065826
Lesione cardiaca intraoperatoria	–	–	Indicata riparazione primaria di organi/strutture danneggiate	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065843
Lesione della cute intraoperatoria	È indicata una riparazione primaria dell'organo/struttura danneggiati	È indicata una resezione parziale degli organi/strutture lesionati	Indicate resezione completa o ricostruzione di organi/strutture danneggiati; invalidante	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065846
Lesione dell'apparato riproduttivo intraoperatoria	È indicata una riparazione primaria dell'organo/struttura danneggiati	È indicata una resezione parziale degli organi/strutture lesionati	Indicate resezione completa o ricostruzione di organi/strutture danneggiati; invalidante	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065840
Lesione delle vie respiratorie intraoperatoria	È indicata una riparazione primaria dell'organo/struttura danneggiati	È indicata una resezione parziale degli organi/strutture lesionati	Indicate resezione completa o ricostruzione di organi/strutture danneggiati; invalidante	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065832
Lesione delle vie urinarie intraoperatoria	È indicata una riparazione primaria dell'organo/struttura danneggiati	È indicata una resezione parziale degli organi/strutture lesionati	Indicate resezione completa o ricostruzione di organi/strutture danneggiati; invalidante	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065828
Lesione endocrina intraoperatoria	È indicata una riparazione primaria dell'organo/struttura danneggiati	È indicata una resezione parziale degli organi/strutture lesionati	Indicate resezione completa o ricostruzione di organi/strutture danneggiati; invalidante	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065834

Lesione epatobiliare intraoperatoria	È indicata una riparazione primaria dell'organo/struttura danneggiati	È indicata una resezione parziale degli organi/strutture lesionati	Indicate resezione completa o ricostruzione di organi/strutture danneggiati; invalidante	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065827
Lesione gastrointestinale intraoperatoria	È indicata una riparazione primaria dell'organo/struttura danneggiati	È indicata una resezione parziale degli organi/strutture lesionati	Indicate resezione completa o ricostruzione di organi/strutture danneggiati; invalidante	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065825
Lesione mammaria intraoperatoria	È indicata una riparazione primaria dell'organo/struttura danneggiati	È indicata una resezione parziale degli organi/strutture lesionati	Indicate resezione completa o ricostruzione di organi/strutture danneggiati; invalidante	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065831
Lesione muscoloscheletrica intraoperatoria	È indicata una riparazione primaria dell'organo/struttura danneggiati	È indicata una resezione parziale degli organi/strutture lesionati	Indicate resezione completa o ricostruzione di organi/strutture danneggiati; invalidante	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065829
Lesione neurologica intraoperatoria	È indicata una riparazione primaria dell'organo/struttura	È indicata una resezione parziale degli organi/strutture lesionati	Indicate resezione completa o ricostruzione di organi/strutture danneggiati; invalidante	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065830
Lesione oculare intraoperatoria	È indicata una riparazione primaria dell'organo/struttura danneggiati	È indicata una resezione parziale degli organi/strutture lesionati	Indicate resezione completa o ricostruzione di organi/strutture danneggiati; invalidante	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065841
Lesione renale intraoperatoria	È indicata una riparazione primaria dell'organo/struttura danneggiati	È indicata una resezione parziale degli organi/strutture lesionati	Indicate resezione completa o ricostruzione di organi/strutture danneggiati; invalidante	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065845
Lesione splenica intraoperatoria	–	È indicata una riparazione primaria dell'organo/struttura lesionati	Indicate resezione completa o ricostruzione di organi/strutture danneggiati; invalidante	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065847
Lesione venosa	Evidenza diagnostica in soggetto asintomatico; intervento non indicato	Sintomatica (ad es., claudicatio), riparazione o revisione non indicate	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); indicata riparazione o revisione; invalidante	Conseguenze potenzialmente letali; evidenza di danno d'organo; indicato intervento chirurgico urgente	Decesso	10047228
Lesione venosa intraoperatoria	È indicata una riparazione primaria dell'organo/struttura danneggiati	È indicata una resezione parziale degli organi/strutture lesionati	Indicate resezione completa o ricostruzione di organi/strutture danneggiati; invalidante	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065848

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Lesione alla vena cava inferiore	–	–	–	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10022213
Lesione alla vena cava superiore	Evidenza diagnostica in soggetto asintomatico; intervento non indicato	Sintomatiche; riparazione o revisione non indicate	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); invalidante; indicate riparazione o revisione	Conseguenze potenzialmente letali; evidenza di danno d'organo; indicato intervento chirurgico urgente	Decesso	10022356
Lesione alla vena giugulare	–	–	Sintomatica; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); invalidante; indicate riparazione o revisione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065849
Lesione all'arteria carotide	–	–	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)(es. ischemia cerebrale transitoria); indicate riparazione o revisione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10022161
Lividi	Localizzati	Generalizzati	–	–	–	10006504
Necrosi di una stomia gastrointestinale	–	Necrosi superficiale; intervento non indicato	Gravi sintomi; indicati ospedalizzazione o intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065712
Ostruzione della stomia intestinale	–	Auto-limitante; intervento non indicato	Gravi sintomi; liquidi ev, nutrizione enterale o NPT indicate per ≥24 h; indicato intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10059094
Ostruzione dell'urostomia	Solo osservazioni diagnostiche asintomatiche; intervento non indicato	Sintomatica; indicata dilatazione o riparazione endoscopica o posizionamento di stent	Alterazione della funzione d'organo (ad es., sepsi o idronefrosi o disfunzione renale); indicato intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; insufficienza d'organo; indicato intervento chirurgico urgente	Decesso	10065883
Ostruzione tracheale	Parziale ostruzione asintomatica evidenziata da un esame (ad es., visivo, radiologico o endoscopico)	Sintomatica (ad es., respirazione rumorosa), nessuna difficoltà respiratoria; indicato intervento medico (ad es., corticosteroidi); limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Stridore, indicate procedure di radiologia interventistica o endoscopiche (ad es., stent, laser); limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Compromissione potenzialmente letale delle vie aeree; indicato intervento urgente (ad es., tracheotomia o intubazione)	Decesso	10044291

Perdita dall'urostomia	Solo osservazioni diagnostiche asintomatiche; intervento non indicato	Sintomatica; indicato intervento medico	Gravi sintomi; indicate radiologia interventistica, endoscopia o chirurgia d'elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10065882
Perforazione della tuba di Falloppio	Solo osservazioni diagnostiche in soggetto asintomatico; intervento non indicato	Sintomatica; intervento non indicato	Gravi sintomi; indicato intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente (ad es., la resezione d'organo)	Decesso	10065790
Perforazione uterina	Solo osservazioni diagnostiche asintomatiche; intervento non indicato	Sintomatica; intervento non indicato	Gravi sintomi; indicato intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10046810
Prolasso di stomia intestinale	Asintomatico; riducibile	Si ripresenta dopo riduzione manuale; irritazione locale o perdita di feci; difficoltà di adattamento al dispositivo; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; indicato intervento chirurgico in elezione; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10065745
Prolasso di urostomia	Asintomatico; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Trattamento locale o manutenzione; indicata revisione minore	Disfunzione della stomia; indicato intervento chirurgico in elezione o revisione maggiore della stomia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065822
Radiation recall (dermatologica)	Lieve eritema o desquamazione secca	Eritema da modesto a vivace; desquamazione umida irregolare, per lo più confinata a pieghe e rughe cutanee; edema moderato	Desquamazione umida in zone diverse dalle pieghe e creste della cute; emorragia indotta da trauma minore o abrasione	Conseguenze potenzialmente letali; necrosi cutanea o ulcerazione a tutto spessore del derma; sanguinamento spontaneo dalla sede interessata; indicato innesto cutaneo	Decesso	10037767
Rottura di anastomosi biliare	Solo osservazioni diagnostiche in soggetto asintomatico; intervento non indicato	Sintomatica; indicato intervento medico	Gravi sintomi; indicate radiologia interventistica, endoscopia o chirurgia d'elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10050458
Rottura di anastomosi del crasso	Solo osservazioni diagnostiche asintomatiche; intervento non indicato	Sintomatica; indicato intervento medico	Gravi sintomi; indicate radiologia interventistica, endoscopia o chirurgia d'elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10065891
Rottura di anastomosi del funicolo spermatico	Solo osservazioni diagnostiche asintomatiche; intervento non indicato	Sintomatica; indicato intervento medico	Gravi sintomi; indicate radiologia interventistica, endoscopia o chirurgia d'elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10065897
Rottura di anastomosi del tenue	Solo osservazioni diagnostiche asintomatiche; intervento non indicato	Sintomatica; indicato intervento medico	Gravi sintomi; indicate radiologia interventistica, endoscopia o chirurgia d'elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10065892

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Rottura di anastomosi della tuba di Falloppio	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; indicato intervento medico	Gravi sintomi; indicate radiologia interventistica, endoscopia o chirurgia d'elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10065788
Rottura di anastomosi di un vaso deferente	Solo osservazioni diagnostiche asintomatiche; intervento non indicato	Sintomatica; indicato intervento medico	Gravi sintomi; indicate radiologia interventistica, endoscopia o chirurgia d'elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10065888
Rottura di anastomosi esofagea	Solo osservazioni diagnostiche in soggetto asintomatico; intervento non indicato	Sintomatica; indicato intervento medico	Gravi sintomi; indicate radiologia interventistica, endoscopia o chirurgia d'elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10065961
Rottura di anastomosi faringea	Solo osservazioni diagnostiche asintomatiche; intervento non indicato	Sintomatica; indicato intervento medico	Gravi sintomi; indicate radiologia interventistica, endoscopia o chirurgia d'elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10065705
Rottura di anastomosi gastrica	Solo osservazioni diagnostiche in soggetto asintomatico; intervento non indicato	Sintomatica; indicato intervento medico	Gravi sintomi; indicate radiologia interventistica, endoscopia o chirurgia d'elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10065893
Rottura di anastomosi gastrointestinale	Solo osservazioni diagnostiche in soggetto asintomatico; intervento non indicato	Sintomatica; indicato intervento medico	Gravi sintomi; indicate radiologia interventistica, endoscopia o chirurgia d'elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10065879
Rottura di anastomosi pancreaticca	Solo osservazioni diagnostiche asintomatiche; intervento non indicato	Sintomatica; indicato intervento medico	Gravi sintomi; indicate radiologia interventistica, endoscopia o chirurgia d'elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10050457
Rottura di anastomosi renale	Solo osservazioni diagnostiche asintomatiche; intervento non indicato	Sintomatica; indicato intervento medico	Gravi sintomi; indicate radiologia interventistica, endoscopia o chirurgia d'elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10065803
Rottura di anastomosi rettale	Solo osservazioni diagnostiche asintomatiche; intervento non indicato	Sintomatica; indicato intervento medico	Gravi sintomi; indicate radiologia interventistica, endoscopia o chirurgia d'elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10065894

Rottura di anastomosi ureterale	Solo osservazioni diagnostiche asintomatiche; intervento non indicato	Sintomatica; indicato intervento medico	Gravi sintomi; indicate radiologia interventistica, endoscopia o chirurgia d'elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10065814
Rottura di anastomosi uretrale	Solo osservazioni diagnostiche asintomatiche; intervento non indicato	Sintomatica; indicato intervento medico	Gravi sintomi; indicate radiologia interventistica, endoscopia o chirurgia d'elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10065815
Rottura di anastomosi uterina	Solo osservazioni diagnostiche asintomatiche; intervento non indicato	Sintomatica; indicato intervento medico	Gravi sintomi; indicate radiologia interventistica, endoscopia o chirurgia d'elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10065886
Rottura di anastomosi vaginale	Solo osservazioni diagnostiche asintomatiche; intervento non indicato	Sintomatica; indicato intervento medico	Gravi sintomi; indicate radiologia interventistica, endoscopia o chirurgia d'elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10065887
Rottura di anastomosi vescicale	Solo osservazioni diagnostiche in soggetto asintomatico; intervento non indicato	Sintomatica; indicato intervento medico	Gravi sintomi; indicate radiologia interventistica, endoscopia o chirurgia d'elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10065802
Sanguinamento della stomia intestinale	Minimo sanguinamento individuato durante l'esame clinico; intervento non indicato	Moderato sanguinamento; indicato intervento medico	Grave emorragia; indicata trasfusione; indicate radiologia interventistica o endoscopia	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10049468
Sanguinamento nella sede della tracheostomia	Minimo sanguinamento individuato durante l'esame clinico; intervento non indicato	Moderato sanguinamento; indicato intervento medico	Grave emorragia; indicata trasfusione; indicate procedure di radiologia interventistica o endoscopiche	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065749
Sanguinamento nella sede dell'urostomia	Minimo sanguinamento individuato durante l'esame clinico; intervento non indicato	Moderato sanguinamento; indicato intervento medico	Grave emorragia; indicata trasfusione; indicate procedure di radiologia interventistica o endoscopiche	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10065748
Sieroma	Asintomatico; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatico; indicata la semplice aspirazione	Sintomatico, indicate radiologia interventistica o chirurgia d'elezione	–	–	10040102
Stenosi della stomia gastrointestinale	–	Sintomatica; indicati liquidi ev per <24 ore; dilatazione manuale al letto del paziente	Grave alterazione della funzionalità gastrointestinale; indicate nutrizione enterale o NPT o ospedalizzazione; indicato intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10065898

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Stenosi dell'urostomia	–	Sintomatica ma senza idronefrosi, né sepsi né disfunzione renale; indicati dilatazione o riparazione endoscopica o posizionamento di stent	Sintomatica (ad es., idronefrosi o disfunzione renale); indicato intervento chirurgico in elezione	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento chirurgico urgente	Decesso	10065885
Ulcera stomale	Asintomatica; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicato intervento	Sintomatica; indicato intervento medico	Gravi sintomi; indicato intervento chirurgico in elezione	–	–	10042127
Ustione	Sintomi minimi; intervento non indicato	Intervento medico; indicato minimo debridement	Indicati debridement da moderato a maggiore o ricostruzione	Conseguenze potenzialmente letali	Decesso	10006634
Lesioni, avvelenamento e complicanze da procedura - Altro, specificare	Asintomatici o sintomi lievi; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicati interventi	Moderati; indicato intervento minimo, locale o non invasivo; limitazioni in rapporto all'età delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi o significativi dal punto di vista medico ma non immediatamente letali; indicata ospedalizzazione o prolungamento della stessa; invalidanti; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10022117

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Dolore neoplastico	Dolore lieve	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10045158
Leucemia secondaria a chemioterapia	–	–	–	Presente	Decesso	10048293
Neoplasia secondaria correlata al trattamento	–	–	Neoplasia secondaria non potenzialmente letale	Neoplasia secondaria acuta potenzialmente letale; crisi blastica nella leucemia	Decesso	10049737
Sindrome mielodisplastica	–	–	–	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10028533
Neoplasie benigne, maligne e non specificate (incluso cisti e polipi) - Altro, specificare	Asintomatici o sintomi lievi; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicati interventi	Moderati; indicato intervento minimo, locale o non invasivo; con limitazioni in rapporto all'età delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi o significativi dal punto di vista medico ma non immediatamente letali; indicata ospedalizzazione o prolungamento del ricovero in corso; invalidanti; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10029104

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Astenia	Astenia alleviata dal riposo	Astenia non alleviata dal riposo; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Astenia non alleviata dal riposo, limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10016256
Brividi	Leggera sensazione di freddo; brividi; battito dei denti	Moderato tremore di tutto il corpo; indicati sedativi	Gravi o prolungati, non responsivi agli oppiacei	–	–	10008531
Decesso neonatale	–	–	–	–	Decesso	10011912
Decesso non altrimenti specificato	–	–	–	–	Decesso	10011914
Disturbo dell'andatura	Lieve cambiamento dell'andatura (ad es., a base allargata, zoppicante o claudicante)	Moderato cambiamento dell'andatura (ad es., a base allargata, zoppicante o claudicante); indicato l'utilizzo di un ausilio; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Invalidante; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10017577
Dolore	Dolore lieve	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10033371
Dolore facciale	Dolore lieve	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10016059
Dolore toracico non-cardiaco	Dolore lieve	Dolore moderato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Dolore grave; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10062501
Edema degli arti	Discrepanza del 5-10% tra gli arti valutate come volume o circonferenza al punto di maggiore differenza visibile; edema o mascheramento della architettura	Discrepanza >10-30% valutata come volume o circonferenza al punto di maggiore differenza visibile; mascheramento dell'architettura anatomica immediatamente evidente;	Discrepanza >30% nel volume degli arti; deviazione evidente dal normale profilo anatomico; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10050068

	anatomica ad una ispezione accurata	obliterazione delle pieghe cutanee; apparente cambiamento nel normale profilo anatomico; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)				
Edema del collo	Asintomatico e localizzato	Edema moderato al collo; lieve obliterazione dei punti di riferimento anatomici; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Edema generalizzato del collo (ad es., difficoltà a girare il collo); limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10054482
Edema del tronco	Edema o mascheramento della architettura anatomica a una ispezione accurata	Mascheramento evidente dell'architettura anatomica; obliterazione delle pieghe cutanee; apparente cambiamento nel normale profilo anatomico; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Importante cambiamento del normale profilo anatomico; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10058720
Edema facciale	Edema facciale localizzato	Moderato edema facciale localizzato; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Grave edema; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10014222
Edema localizzato	Localizzato in alcune zone, nessuna disabilità o compromissione funzionale	Moderato edema localizzato, indicato intervento; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Grave edema localizzato, indicato intervento; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10062466
Febbre	38,0-39,0 °C (100,4-102,2 °F)	>39,0-40,0 °C (102,3-104,0 °F)	>40,0 °C (>104,0 °F) per ≤24 ore	>40,0 °C (>104,0 °F) per >24 ore	Decesso	10016558
Insufficienza multi-organo	–	–	Shock con azotemia e disturbi acido-base; alterazioni significative della coagulazione	Conseguenze potenzialmente letali (ad es., paziente dipendente da vasopressori e oligurico o anurico o con colite ischemica o acidosis lattica)	Decesso	10028154
Ipotermia	–	35 ->32 °C; 95 ->89,6 °F	32 ->28 °C; 89,6 ->82,4 °F	≤28 °C; 82,4 °F; conseguenze potenzialmente letali (ad es., coma, ipotensione, edema polmonare, acidemia, fibrillazione ventricolare)	Decesso	10021113

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
Irritabilità	Lieve; facilmente consolabile	Moderata; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1); indicata una maggiore attenzione	Risposta anomala grave o eccessiva; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2); inconsolabile	–	–	10022998
Malessere	Disagio o mancanza di benessere	Disagio o mancanza di benessere; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	–	–	–	10025482
Morte improvvisa, causa non specificata	–	–	–	–	Decesso	10042435
Reazione infusionale	Lieve reazione transitoria; l'interruzione dell'infusione non è indicata; intervento non indicato	Indicata interruzione della terapia o dell'infusione ma pronta risposta al trattamento sintomatico (ad es., antistaminici, FANS, sonniferi, liquidi e.v.), è indicata una profilassi farmacologica per ≤24 ore	Prolungata (ad es., non rapidamente responsiva ai farmaci sintomatici e/o alla breve interruzione della infusione); ripresa dei sintomi dopo un iniziale miglioramento; indicata ospedalizzazione per possibili sequele cliniche	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10051792
Reazione nel sito di iniezione	Dolore con o senza sintomi associati (ad es., calore, eritema, prurito)	Dolore; lipodistrofia; edema; flebite	Ulcerazione o necrosi; danno tissutale grave; indicato intervento chirurgico	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10022095
Sintomi di tipo influenzale	Presenza di lievi sintomi simil-influenzali	Sintomi moderati; limitazione delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi sintomi; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	–	–	10016791
Stravaso nel sito di infusione	–	Eritema con sintomi associati (ad es., edema, dolore, indurimento, flebite)	Ulcerazione o necrosi; danno tissutale grave; indicato intervento chirurgico	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10064774
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione - Altro, specificare	Asintomatici o sintomi lievi; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicati interventi	Moderati; indicato intervento locale minimo o non invasivo; limitazioni in rapporto all'età delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)	Gravi o significativi dal punto di vista medico ma non immediatamente letali; indicata ospedalizzazione o prolungamento del ricovero in corso; invalidanti; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)	Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente	Decesso	10018065

Evento avverso	Grado 1	Grado 2	Grado 3	Grado 4	Grado 5	Cod. MedDRA
<p>Procedure mediche e chirurgiche - Altro, specificare</p>	<p>Asintomatici o sintomi lievi; solo osservazione clinico-diagnostica; non indicati interventi</p>	<p>Moderati; indicato intervento minimo, locale o non invasivo; limitazioni in rapporto all'età delle attività quotidiane non di cura della persona (instrumental ADL, nota 1)</p>	<p>Gravi o significativi dal punto di vista medico ma non immediatamente letali; indicata ospedalizzazione o prolungamento del ricovero in corso; invalidanti; limitazione delle attività quotidiane di cura della persona (self care ADL, nota 2)</p>	<p>Conseguenze potenzialmente letali; è indicato un intervento urgente</p>	<p>Decesso</p>	<p>10042613</p>

Acatisia (pag. 17) Un disturbo caratterizzato da una sensazione spiacevole di irrequietezza interiore e incapacità a stare fermo; si tratta di un effetto collaterale di alcuni farmaci psicotropi.

Acidiosi (pag. 11) Un disturbo caratterizzato da acidità anormalmente alta (concentrazione di ioni idrogeno elevata) nel sangue e in altri tessuti corporei.

Afonia (pag. 17) Un disturbo caratterizzato dalla incapacità di parlare. Esso può derivare da lesioni alle corde vocali o può essere funzionale (psicogeno).

Agitazione (pag. 64) Un disturbo caratterizzato da uno stato di irrequietezza associato a sensazioni spiacevoli di irritabilità e tensione.

Alcalosi (pag. 11) Un disturbo caratterizzato da alcalinità anormalmente elevata (bassa concentrazione di ioni idrogeno) del sangue e di altri tessuti corporei.

Allucinazioni (pag. 64) Un disturbo caratterizzato da una falsa percezione sensoriale in assenza di uno stimolo esterno.

Alopecia (pag. 34) Un disturbo caratterizzato da una diminuzione della densità dei capelli rispetto a quanto sarebbe normale per un dato individuo ad una determinata età e in una determinata sede.

Alterazione del colore delle urine (pag. 29) Un disturbo caratterizzato da un cambiamento del colore delle urine.

Alterazione della personalità (pag. 64) Un disturbo caratterizzato da un cambiamento evidente nel comportamento e nel modo di pensare di un individuo.

Alterazione della voce (pag. 66) Un disturbo caratterizzato da un cambiamento nel suono e/o nell'intensità della voce.

Alterazione dello sviluppo dentale (pag. 41) Un disturbo caratterizzato da un processo patologico dei denti che si verifica durante il loro sviluppo.

Amnesia (pag. 17) Un disturbo caratterizzato da perdita sistematica ed estensiva della memoria.

Anafilassi (pag. 16) Un disturbo caratterizzato da una reazione infiammatoria acuta derivante dal rilascio di istamina e sostanze simili all'istamina dai mastociti, con conseguente risposta immunitaria da ipersensibilità. Clinicamente si manifesta con difficoltà respiratorie, vertigini, ipotensione, cianosi e perdita di coscienza e può portare al decesso.

Anemia (pag. 13) Un disturbo caratterizzato da una riduzione della quantità di emoglobina in 100 ml di sangue. Segni e sintomi di anemia possono includere pallore cutaneo e delle mucose, dispnea, palpitations, soffi sistolici, letargia e affaticabilità.

Anoressia (pag. 11) Un disturbo caratterizzato da perdita di appetito.

Anorgasmia (pag. 64) Un disturbo caratterizzato da incapacità di raggiungere l'orgasmo.

Ansia (pag. 64) Un disturbo caratterizzato da timore del pericolo e paura accompagnata da irrequietezza, tensione, tachicardia, dispnea e non legato ad uno stimolo chiaramente identificabile.

Apnea (pag. 66) Un disturbo caratterizzato dalla cessazione della respirazione.

Apnea notturna (pag. 66) Un disturbo caratterizzato dalla cessazione della respirazione per brevi periodi durante il sonno.

Apoplessia (pag. 17) Un disturbo caratterizzato da una improvvisa, involontaria contrazione muscolare scheletrica che origina dall'encefalo o dal tronco cerebrale.

Appendicite (pag. 79) Un disturbo caratterizzato da infiammazione acuta dell'appendice vermiforme causata da un agente patogeno.

Appendicite perforata (pag. 79) Un disturbo caratterizzato da infiammazione acuta dell'appendice vermiforme causata da un agente patogeno con cancrena e conseguente rottura della parete appendicolare. Tale rottura determina il rilascio del contenuto infiammatorio e batterico dal lume appendicolare nella cavità addominale.

Aracnoideite (pag. 17) Un disturbo caratterizzato da infiammazione della membrana aracnoide e dell'adiacente spazio subaracnoideo.

Aritmia ventricolare (pag. 7) Un disturbo caratterizzato da una aritmia che ha origine nei ventricoli.

Arresto cardiaco (pag. 7) Un disturbo caratterizzato dalla cessazione della funzione di pompa del cuore.

Arrossamento (pag. 5) Un disturbo caratterizzato da episodi di arrossamento del viso.

Arterite infettiva (pag. 79) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge una arteria.

Artralgia (pag. 55) Un disturbo caratterizzato da una forte sensazione di dolore alle articolazioni.

Artrite (pag. 55) Un disturbo caratterizzato da un'infiammazione a livello articolare.

Ascite (pag. 41) Un disturbo caratterizzato da accumulo di liquido sieroso o emorragico nella cavità peritoneale

Asistolia (pag. 7) Un disturbo caratterizzato da una aritmia cardiaca, senza attività elettrica. In genere, si associa ad una cessazione della funzione di pompa del cuore.

Aspirazione (pag. 66) Un disturbo caratterizzato da inalazione di solidi o liquidi nei polmoni.

Astenia (pag. 98) Un disturbo caratterizzato da uno stato di debolezza generalizzato con una marcata incapacità a raccogliere le forze per compiere le attività quotidiane.

Atassia (pag. 17) Un disturbo caratterizzato da mancanza di coordinazione dei movimenti muscolari con conseguente compromissione o impossibilità a svolgere i movimenti volontari.

Atelettasia (pag. 66) Un disturbo caratterizzato da un collasso di una parte o dell'intero polmone.

Atrofia adiposa (pag. 34) Un disturbo caratterizzato da diminuzione del tessuto adiposo.

Atrofia della cute (pag. 34) Un disturbo caratterizzato dalla degenerazione e dall'assottigliamento dell'epidermide e del derma.

Atrofia mammaria (pag. 24) Un disturbo caratterizzato da uno sviluppo mammario ridotto.

Attacchi ischemici transitori (TIA) (pag. 17) Un disturbo caratterizzato da un breve attacco (meno di 24 ore) di origine vascolare con distruzione cerebrale, senza alcun deficit neurologico persistente.

Aumento dell'alanina aminotransferasi (pag. 75) Riscontro basato sui risultati dei test di laboratorio che indicano un aumento del livello di alanina aminotransferasi (ALT o SGPT) nel campione di sangue.

Aumento dell'aspartato aminotransferasi (pag. 76) Riscontro basato sui risultati dei test di laboratorio che indicano un aumento del livello di aspartato aminotransferasi (AST o SGOT) in un campione di sangue.

Aumento dell'emoglobina (pag. 76) Riscontro basato sui risultati dei test di laboratorio che indicano un aumento dei livelli di emoglobina in un campione biologico.

Aumento della bilirubinemia (pag. 75) Riscontro basato sui risultati dei test di laboratorio che indicano un livello anormalmente elevato di bilirubina nel sangue. Un eccesso di bilirubina si associa alla comparsa di ittero.

Aumento della conta linfocitaria (pag. 75) Riscontro basato sui risultati dei test di laboratorio che indicano un aumento anormale del numero di linfociti nel sangue, nei liquidi di versamento o nel midollo osseo.

Aumento della CPK (pag. 75) Riscontro basato sui risultati dei test di laboratorio che indicano un aumento dei livelli di creatinfosfochinasi in un campione di sangue.

Aumento della creatinina (pag. 75) Riscontro basato sui risultati dei test di laboratorio che indicano un aumento dei livelli di creatinina in un campione biologico.

Aumento della fosfatasi alcalina (pag. 75) Riscontro basato sui risultati dei test di laboratorio che indicano un aumento del livello di fosfatasi alcalina in un campione di sangue.

Aumento della libido (pag. 64) Un disturbo caratterizzato da un aumento del desiderio sessuale.

Aumento della lipasi (pag. 75) Riscontro basato sui risultati dei test di laboratorio che indicano un aumento del livello di lipasi in un campione biologico.

Aumento della troponina I cardiaca (pag. 75) Test di laboratorio il cui risultato indica un aumento dei livelli di troponina I cardiaca in un campione biologico.

Aumento della troponina T cardiaca (pag. 75) Test di laboratorio il cui risultato indica un aumento dei livelli di troponina T cardiaca in un campione biologico.

Aumento delle GGT (pag. 76) Riscontro basato sui risultati dei test di laboratorio che indicano livelli superiori alla norma dell'enzima gamma-glutamilttransferasi in un campione di sangue. La GGT (gamma-glutamilttransferasi) catalizza il trasferimento di un gruppo gamma-glutamil da un gamma-glutamil peptide ad un altro peptide, ad aminoacidi o ad acqua.

Aumento di peso (pag. 76) Riscontro caratterizzato da un aumento del peso corporeo complessivo; in ambito pediatrico, superiore alla curva di crescita basale.

Azoospermia (pag. 24) Un disturbo caratterizzato da risultati dei test di laboratorio che indicano l'assenza completa di spermatozoi nel liquido seminale.

Blocco atrio-ventricolare completo (pag. 7) Un disturbo caratterizzato da una forma di aritmia con blocco totale della conduzione atriale dell'impulso elettrico attraverso il nodo atrio-ventricolare (AV) ai ventricoli.

Blocco atrio-ventricolare di primo grado (pag. 7) Un disturbo caratterizzato da una forma di aritmia con un ritardo nel tempo necessario per la conduzione di un impulso elettrico attraverso il nodo atrio-ventricolare (AV) oltre gli 0,2 secondi; prolungamento dell'intervallo PR superiore a 200 millisecondi.

Bradicardia sinusale (pag. 7) Un disturbo caratterizzato da una aritmia con una frequenza cardiaca inferiore a 60 battiti al minuto che ha origine nel nodo del seno.

Brividi (pag. 98) Un disturbo caratterizzato da una sensazione di freddo che spesso rappresenta una risposta fisiologica alla sudorazione dopo un accesso febbrile.

Broncospasmo (pag. 66) Un disturbo caratterizzato da una contrazione improvvisa della muscolatura liscia della parete bronchiale.

Caduta (pag. 88) Il riscontro di una caduta improvvisa verso il basso, che esita generalmente in una lesione.

Calcolosi renale (pag. 29) Un disturbo caratterizzato dalla formazione di cristalli nella pelvi renale.

Capacità vitale anormale (pag. 76) Riscontro basato sui risultati dei test di funzionalità respiratoria che indicano una capacità vitale (volume di aria espirata dopo una inspirazione massimale) anormale rispetto al valore previsto.

Cardiomiopatia restrittiva (pag. 7) Un disturbo caratterizzato da una incapacità dei ventricoli di riempirsi di sangue, per irrigidimento e perdita di elasticità del miocardio (muscolo cardiaco).

Carie dentale (pag. 41) Un disturbo caratterizzato dallo sviluppo di carie ad un dente, per cui esso si indebolisce, scolorisce e/o diventa poroso.

Cataratta (pag. 61) Un disturbo caratterizzato da opacità parziale o totale del cristallino di uno o entrambi gli occhi. Ciò si traduce in una riduzione dell'acuità visiva e se non trattato evolve in un quadro di cecità.

Cattivo odore corporeo (pag. 34) Un disturbo caratterizzato da un odore corporeo anormale derivante dalla crescita di batteri sul corpo.

Cervicite (pag. 79) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge la cervice uterina.

Cheilite (pag. 61) Un disturbo caratterizzato da infiammazione del labbro.

Cheerite (pag. 41) Un disturbo caratterizzato da un'infiammazione della cornea.

Chiliorace (pag. 66) Un disturbo caratterizzato da versamento pleurico (raccolta anormale di liquido) lattiginoso derivante dall'accumulo di fluido linfatico nella cavità pleurica.

Cifosi (pag. 55) Un disturbo caratterizzato da un aumento anormale della curvatura della porzione toracica della colonna vertebrale.

Cistite non infettiva (pag. 29) Un disturbo caratterizzato da infiammazione della vescica non causata da un'infezione del tratto urinario.

Coagulazione intravascolare disseminata (pag. 13) Un disturbo caratterizzato da attivazione patologica sistemica dei meccanismi di coagulazione del sangue con conseguente formazione di coaguli in tutto il corpo. Vi è un aumento del rischio di emorragia in quanto l'organismo è impoverito di piastrine e di fattori della coagulazione.

Colecistite (pag. 14,79) Un disturbo caratterizzato da infiammazione (pag. 14) o infezione (pag. 79) della colecisti. Può associarsi alla presenza di calcoli biliari.

Colica renale (pag. 29) Un disturbo caratterizzato da dolore severo, parossistico, al fianco con irradiazione verso la zona inguinale. Spesso la causa è il passaggio di calcoli renali.

Colite (pag. 41) Un disturbo caratterizzato da infiammazione del colon.

Complicanza di un accesso vascolare (pag. 88) Il riscontro di un problema precedentemente non documentato relativo ad un accesso vascolare.

Complicanza postoperatoria di una procedura toracica (pag. 88) Il riscontro di un problema precedentemente non documentato che si verifica dopo una procedura al torace.

Complicanze da ferita (pag. 88) Il riscontro di un problema di nuova insorgenza nel sito di una ferita esistente.

Compromissione della concentrazione (pag. 17) Un disturbo caratterizzato da un peggioramento della capacità di concentrazione.

Confusione (pag. 64) Un disturbo caratterizzato da una mancanza di pensiero e di comportamento chiari ed ordinati.

Congestione nasale (pag. 67) Un disturbo caratterizzato da ostruzione nasale a causa di edema della mucosa.

Congiuntivite (pag. 61) Un disturbo caratterizzato da infiammazione, gonfiore e arrossamento della congiuntiva degli occhi.

Congiuntivite infettiva (pag. 79) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge la congiuntiva. Le manifestazioni cliniche includono un colorito rosa o rosso degli occhi.

Crescita accelerata (pag. 39) Un disturbo caratterizzato da una crescita maggiore del previsto per l'età.

Danno renale acuto (pag. 29) Un disturbo caratterizzato dalla perdita acuta della funzione renale; tradizionalmente viene classificato come pre-renale (da basso flusso di sangue ai reni), renale (da danno ai reni) e post-renale (da ostruzione al deflusso ureterale o vescicale).

Debolezza dei muscoli del tronco (pag. 55) Un disturbo caratterizzato da una riduzione della forza dei muscoli del tronco.

Debolezza dei muscoli facciali (pag. 17) Un disturbo caratterizzato da una riduzione della forza dei muscoli facciali.

Debolezza muscolare agli arti inferiori (pag. 55) Un disturbo caratterizzato da una riduzione della forza muscolare degli arti inferiori.

Debolezza muscolare agli arti superiori (pag. 55) Un disturbo caratterizzato da una riduzione della forza muscolare degli arti superiori.

Debolezza muscolare del pavimento pelvico (pag. 24) Un disturbo caratterizzato da una riduzione della forza dei muscoli del pavimento pelvico.

Debolezza muscolare generalizzata (pag. 55) Un disturbo caratterizzato da una riduzione della forza muscolare in diverse sedi anatomiche.

Debolezza muscolare sul lato destro del corpo (pag. 56) Un disturbo caratterizzato da una riduzione della forza dei muscoli sul lato destro del corpo.

Debolezza muscolare sul lato sinistro del corpo (pag. 56) Una malattia caratterizzata da una riduzione della forza muscolare sul lato sinistro del corpo.

Decesso fetale (pag. 74) Un evento caratterizzato da morte intrauterina; incapacità del feto, dopo espulsione dall'utero, di dare segni di respirazione spontanea, battito cardiaco o movimento certo di un muscolo volontario, senza possibilità di rianimazione.

Decesso neonatale (pag. 98) Una condizione caratterizzata da decesso che si verifica durante i primi 28 giorni di vita.

Decesso non altrimenti specificato (pag. 98) Decesso non attribuibile ad un termine CTCAE di grado 5.

Deformità dei capezzoli (pag. 24) Un disturbo caratterizzato da una malformazione del capezzolo.

Deformità muscolo-scheletrica (pag. 56) Un disturbo caratterizzato da una malformazione del sistema muscolo-scheletrico.

Deiscenza della ferita (pag. 88) Il riscontro della separazione dei margini prossimali di una ferita chirurgica.

Delirio (pag. 64) Un disturbo caratterizzato dallo sviluppo acuto e improvviso di confusione, illusioni, movimenti repentini, disattenzione, agitazione e allucinazioni. Di solito si tratta di una condizione reversibile.

Delusione (pag. 64) Un disturbo caratterizzato da convinzioni personali false, in contrasto con la realtà, nonostante le evidenze contraddittorie e il buon senso.

Depressione (pag. 64) Un disturbo caratterizzato da sentimenti di malinconia o infelicità.

Depressione del livello di coscienza (pag. 18) Un disturbo caratterizzato da una diminuzione della capacità di comprendere e rispondere.

Dermatite bollosa (pag. 34) Un disordine caratterizzato da infiammazione della cute caratterizzata dalla presenza di vesciche che si riempiono di liquido.

Dermatite da radiazione (pag. 88) Il riscontro di una reazione infiammatoria cutanea che si verifica a seguito di una esposizione a livelli biologicamente efficaci di radiazioni ionizzanti.

Deterioramento della memoria (pag. 18) Un disturbo caratterizzato da un deterioramento della memoria.

Diarrea (pag. 41) Un disturbo caratterizzato da evacuazioni intestinali acquose e frequenti.

Diminuita capacità di diffusione del monossido di carbonio (pag. 76) Riscontro basato sui risultati dei test di funzionalità respiratoria che indicano una diminuzione della capacità polmonare di assorbire il monossido di carbonio.

Diminuzione degli enzimi pancreatici (pag. 76) Riscontro basato sui risultati dei test di laboratorio che indicano una diminuzione dei livelli degli enzimi pancreatici in un campione biologico.

Diminuzione dei globuli bianchi (pag. 76) Riscontro basato sui risultati dei test di laboratorio che indicano una diminuzione del numero di globuli bianchi in un campione di sangue.

Diminuzione dei linfociti CD4 (pag. 76) Riscontro basato sui risultati dei test di laboratorio che indicano una diminuzione dei livelli di linfociti CD4 in un campione di sangue.

Diminuzione del fibrinogeno (pag. 76) Riscontro basato sui risultati dei test di laboratorio che indicano una diminuzione dei livelli di fibrinogeno in un campione di sangue.

Diminuzione del volume espiratorio forzato (pag. 77) Riscontro basato sui risultati dei test che indicano una diminuzione relativa della frazione di capacità vitale forzata che viene espirata in un certo numero di secondi.

Diminuzione dell'aptoglobina (pag. 77) Riscontro basato sui risultati dei test di laboratorio che indicano una diminuzione dei livelli di aptoglobina in un campione di sangue.

Diminuzione dell'escrezione di urina (pag. 77) Riscontro basato sui risultati dei test che indicano una escrezione di urina inferiore rispetto a quella precedente.

Diminuzione della conta dei neutrofili (pag. 77) Riscontro basato sui risultati dei test di laboratorio che indicano una diminuzione del numero di neutrofili in un campione di sangue.

Diminuzione della conta linfocitaria (pag. 77) Riscontro basato sui risultati dei test di laboratorio che indicano una diminuzione del numero di linfociti in un campione di sangue.

Diminuzione della conta piastrinica (pag. 77) Riscontro basato sui risultati dei test di laboratorio che indicano una diminuzione del numero di piastrine in un campione di sangue.

Diminuzione della corticotropina plasmatica (pag. 77) Riscontro basato sui risultati dei test di laboratorio che indicano una diminuzione dei livelli di corticotropina in un campione di sangue.

Disartria (pag. 18) Un disordine caratterizzato da un linguaggio lento e inceppato risultante da una incapacità di coordinare i muscoli utilizzati per la fonazione.

Discromia dentale (pag. 41) Un disturbo caratterizzato da un cambiamento di colore o tonalità del dente.

Disestesia (pag. 18) Un disturbo caratterizzato da una distorsione della percezione sensoriale, con conseguente insorgenza di sensazioni anomale e sgradevoli.

Disestesia laringo-faringea (pag. 67) Un disturbo caratterizzato da una persistente sensazione di fastidio nella zona laringo-faringea.

Disestesia orale (pag. 41) Un disturbo caratterizzato da un bruciore o formicolio a livello delle labbra, della lingua o in tutta la bocca.

Disfagia (pag. 41) Un disturbo caratterizzato da difficoltà alla deglutizione.

Disfasia (pag. 18) Un disturbo caratterizzato da alterazione della capacità di comunicazione verbale, spesso derivante da danni al cervello.

Disfunzione del ventricolo destro (pag. 7) Un disturbo caratterizzato da alterazione della funzione ventricolare destra associata a bassa frazione di eiezione e ad una diminuzione della motilità di parete del ventricolo destro.

Disfunzione della valvola mitrale (pag. 7) Un disturbo caratterizzato da un difetto nella funzione o nella struttura della valvola mitrale.

Disfunzione della valvola polmonare (pag. 8) Un disturbo caratterizzato da un difetto nel funzionamento o nella struttura della valvola polmonare.

Disfunzione della valvola tricuspide (pag. 8) Un disturbo caratterizzato da un difetto nel funzionamento o nella struttura della valvola tricuspide.

Disfunzione erettile (pag. 24) Un disturbo caratterizzato dalla persistente o ricorrente incapacità di raggiungere o mantenere l'erezione durante l'attività sessuale.

Disfunzione sistolica ventricolare sinistra (pag. 8) Un disturbo caratterizzato da incapacità del ventricolo sinistro di produrre un rendimento adeguato, nonostante un aumento della pressione di distensione e del volume telediastolico. Le manifestazioni cliniche possono includere dispnea, ortopnea, altri segni e sintomi di congestione ed edema polmonare.

Disgeusia (pag. 18) Un disturbo caratterizzato da anomala percezione del sapore dei cibi; può essere correlato ad una diminuzione del senso dell'olfatto.

Disidratazione (pag. 11) Un disturbo caratterizzato da eccessiva perdita di acqua dall'organismo. Di solito è causato da grave diarrea, vomito o sudorazione profusa.

Dismenorea (pag. 24) Un disturbo caratterizzato da dolorosi crampi addominali durante il ciclo mestruale.

Dispareunia (pag. 24) Un disturbo caratterizzato da coito doloroso o difficile.

Disparità di lunghezza degli arti (pag. 56) Un disturbo caratterizzato da una discrepanza tra la lunghezza delle estremità inferiori o superiori.

Dispepsia (pag. 42) Un disturbo caratterizzato da una sensazione di disagio, spesso dolorosa, allo stomaco, derivante da cattiva digestione. I sintomi includono bruciore di stomaco, gonfiore, pirosi gastrica, nausea e vomito.

Dispnea (pag. 67) Un disturbo caratterizzato da una sensazione di difficoltà a respirare.

Distacco della retina (pag. 61) Un disturbo caratterizzato dalla separazione degli strati interni della retina dall'epitelio pigmentato sottostante.

Distensione addominale (pag. 42) Un disturbo caratterizzato da rigonfiamento dell'addome.

Distrofia ungueale (pag. 34) Un disturbo caratterizzato da creste verticali o orizzontali sulle unghie.

Disturbi cognitivi (pag. 18) Un disturbo caratterizzato da un importante cambiamento nelle funzioni cognitive.

Disturbi del nervo ottico (pag. 61) Un disturbo caratterizzato da coinvolgimento del nervo ottico (secondo nervo cranico).

Disturbi del nervo trigemino (pag. 18) Un disturbo caratterizzato da coinvolgimento del nervo trigemino (quinto nervo cranico).

Disturbi del nervo vago (pag. 19) Un disturbo caratterizzato da coinvolgimento del nervo vago (decimo nervo cranico).

Disturbi dell'allattamento (pag. 24) Un disturbo caratterizzato da alterazioni della secrezione di latte. Non necessariamente legato alla gravidanza, può essere riscontrato anche in soggetti di sesso maschile.

Disturbi dell'eiaculazione (pag. 24) Un disturbo caratterizzato da problemi di eiaculazione. Questa categoria comprende l'eiaculazione precoce, quella ritardata, la retrograda e l'eiaculazione dolorosa.

Disturbi della milza (pag. 13) Un disturbo caratterizzato da un disturbo della milza.

Disturbi della sclera (pag. 61) Un disturbo caratterizzato da coinvolgimento della sclera dell'occhio.

Disturbi della vascolarizzazione retinica (pag. 61) Un disturbo caratterizzato da vasi sanguigni retinici patologici con conseguenti problemi alla visione.

Disturbi di conduzione (pag. 8) Un disturbo caratterizzato da irregolarità patologica del sistema di conduzione cardiaco.

Disturbi extrapiramidali (pag. 19) Un disturbo caratterizzato da movimenti muscolari anormali, ripetitivi, involontari, da discorsi deliranti ed estrema irrequietezza.

Disturbi testicolari (pag. 25) Un disturbo caratterizzato da coinvolgimento del testicolo.

Disturbi vestibolari (pag. 32) Un disturbo caratterizzato da vertigini, perdita dell'equilibrio, nausea e problemi alla vista.

Disturbo del IV nervo cranico (pag. 19) Un disturbo caratterizzato da coinvolgimento del nervo trocleare (quarto nervo cranico).

Disturbo del nervo abducente (pag. 19) Un disturbo caratterizzato da coinvolgimento del nervo abducente (sesto nervo cranico).

Disturbo del nervo accessorio (pag. 19) Un disturbo caratterizzato da coinvolgimento del nervo accessorio (undicesimo nervo cranico).

Disturbo del nervo acustico non specificato (pag. 19) Un disturbo caratterizzato da coinvolgimento del nervo acustico (ottavo nervo cranico).

Disturbo del nervo facciale (pag. 19) Un disturbo caratterizzato da coinvolgimento del nervo facciale (settimo nervo cranico).

Disturbo del nervo glossofaringeo (pag. 19) Un disturbo caratterizzato da coinvolgimento del nervo glossofaringeo (nono nervo cranico).

Disturbo del nervo ipoglossico (pag. 19) Un disturbo caratterizzato da coinvolgimento del nervo ipoglossico (dodicesimo nervo cranico).

Disturbo del nervo oculomotore (pag. 19) Un disturbo caratterizzato da coinvolgimento del nervo oculomotore (terzo nervo cranico).

Disturbo del nervo olfattivo (pag. 20) Un disturbo caratterizzato da coinvolgimento del nervo olfattivo (primo nervo cranico).

Disturbo dell'andatura (pag. 98) Un disturbo caratterizzato da difficoltà nella marcia.

Disturbo della funzione palpebrale (pag. 61) Un disturbo caratterizzato da un'alterazione della funzione palpebrale.

Dolore (pag. 98) Un disturbo caratterizzato da una sensazione di forte malessere, sofferenza o tormento.

Dolore a livello dell'apparato urinario (pag. 29) Un disturbo caratterizzato da una sensazione di forte fastidio nelle vie urinarie.

Dolore addominale (pag. 42) Un disturbo caratterizzato da una sensazione di forte malessere nella regione addominale.

Dolore al collo (pag. 56) Un disturbo caratterizzato da forte sensazione di fastidio nella zona del collo.

Dolore al fianco (pag. 56) Un disturbo caratterizzato da forte sensazione di fastidio nella parte laterale del corpo, sotto le costole e al di sopra dell'anca.

Dolore al gluteo (pag. 56) Un disturbo caratterizzato da forte sensazione di fastidio ai glutei.

Dolore al pene (pag. 25) Un disturbo caratterizzato da forte sensazione di fastidio in regione peniena.

Dolore all'orecchio (pag. 32) Un disturbo caratterizzato da una marcata sensazione di fastidio all'orecchio.

Dolore all'orecchio esterno (pag. 32) Un disturbo caratterizzato da una sensazione di forte malessere nella regione esterna dell'orecchio.

Dolore alla colecisti (pag. 14) Un disturbo caratterizzato da una sensazione di forte malessere nella regione della colecisti.

Dolore alle estremità (pag. 56) Un disturbo caratterizzato da forte sensazione di fastidio agli arti superiori o inferiori.

Dolore anale (pag. 42) Un disturbo caratterizzato da una sensazione di forte malessere nella regione anale.

Dolore cutaneo (pag. 34) Un disturbo caratterizzato da forte sensazione di fastidio a livello cutaneo.

Dolore del cavo orale (pag. 42) Un disturbo caratterizzato da una sensazione di forte fastidio in bocca, a livello della lingua o delle labbra.

Dolore del cuoio capelluto (pag. 35) Un disturbo caratterizzato da un forte fastidio alla cute che copre la parte superiore e la parte posteriore della testa.

Dolore dell'arto fantasma (pag. 20) Un disturbo caratterizzato da un forte fastidio nella sede di un arto o di un organo che è stato rimosso e non è più fisicamente parte del corpo.

Dolore della parete toracica (pag. 57) Un disturbo caratterizzato da forte sensazione di fastidio alla parete toracica.

Dolore epatico (pag. 14) Un disturbo caratterizzato da una sensazione di forte malessere nella regione del fegato.

Dolore esofageo (pag. 42) Un disturbo caratterizzato da una sensazione di forte malessere nella regione esofagea.

Dolore facciale (pag. 98) Un disturbo caratterizzato da una sensazione di forte fastidio al volto.

Dolore faringo-laringeo (pag. 67) Un disturbo caratterizzato da una forte sensazione di fastidio nella regione faringo-laringea.

Dolore gastrointestinale (pag. 42) Un disturbo caratterizzato da una sensazione di forte malessere nella regione gastrointestinale.

Dolore gengivale (pag. 42) Un disturbo caratterizzato da una sensazione di forte malessere nella regione gengivale.

Dolore labiale (pag. 42) Un disturbo caratterizzato da una sensazione di forte fastidio al labbro.

Dolore linfonodale (pag. 13) Un disturbo caratterizzato da una sensazione di forte malessere a livello linfonodale.

Dolore mammario (pag. 25) Un disturbo caratterizzato da forte sensazione di fastidio in regione mammaria.

Dolore neoplastico (pag. 97) Un disturbo caratterizzato da una forte sensazione di malessere causata da una neoplasia per pressione su un nervo, compressione di vasi sanguigni, infiammazione o fratture di natura metastatica.

Dolore oculare (pag. 62) Un disturbo caratterizzato da una sensazione di forte malessere agli occhi.

Dolore osseo (pag. 57) Un disturbo caratterizzato da forte sensazione di fastidio alle ossa.

Dolore ovarico (pag. 25) Un disturbo caratterizzato da forte sensazione di malessere da un lato dell'addome tra i cicli mestruali, attorno al periodo dell'ovulazione.

Dolore pelvico (pag. 25) Un disturbo caratterizzato da forte sensazione di fastidio a livello del bacino.

Dolore perineale (pag. 25) Un disturbo caratterizzato da una sensazione di forte fastidio nella zona compresa tra gli organi genitali e l'ano.

Dolore pleurico (pag. 67) Un disturbo caratterizzato da una forte sensazione di fastidio a livello pleurico.

Dolore prostatico (pag. 25) Un disturbo caratterizzato da una sensazione di forte malessere a livello prostatico.

Dolore rettale (pag. 42) Un disturbo caratterizzato da una sensazione di forte malessere nella regione rettale.

Dolore scrotale (pag. 25) Un disturbo caratterizzato da forte sensazione di fastidio nella zona scrotale.

Dolore sinusale (pag. 20) Un disturbo caratterizzato da un forte fastidio al volto, tra gli occhi, o ai denti superiori, di origine sinusale.

Dolore testicolare (pag. 25) Un disturbo caratterizzato da una sensazione di forte fastidio a livello testicolare.

Dolore toracico non-cardiaco (pag. 98) Un disturbo caratterizzato da sensazione di malessere al torace non correlata ad un disturbo cardiaco.

Dolore toracico-cardiaco (pag. 8) Un disturbo caratterizzato da fastidio retrosternale causato da insufficiente ossigenazione del miocardio.

Dolore uterino (pag. 25) Un disturbo caratterizzato da una sensazione di forte fastidio a livello uterino.

Dolore vaginale (pag. 26) Un disturbo caratterizzato da una sensazione di forte fastidio a livello vaginale.

Edema cerebrale (pag. 20) Un disturbo caratterizzato da rigonfiamento causato da un eccessivo accumulo di liquido nell'encefalo.

Edema degli arti (pag. 98) Un disturbo caratterizzato da gonfiore causato da un accumulo eccessivo di liquido negli arti superiori o inferiori.

Edema del collo (pag. 99) Un disturbo caratterizzato da gonfiore causato da un accumulo eccessivo di liquidi nel collo.

Edema del laringe (pag. 67) Un disturbo caratterizzato da gonfiore a causa di un accumulo eccessivo di liquidi nel laringe.

Edema del tronco (pag. 99) Un disturbo caratterizzato da gonfiore causato da un accumulo eccessivo di liquidi nella zona del tronco.

Edema facciale (pag. 99) Un disturbo caratterizzato da gonfiore causato da un eccessivo accumulo di liquidi nei tessuti del viso.

Edema genitale (pag. 26) Un disturbo caratterizzato da gonfiore dovuto all'accumulo di un eccesso di liquidi nei genitali.

Edema localizzato (pag. 99) Un disturbo caratterizzato da gonfiore causato da un accumulo eccessivo di liquidi in un determinato sito anatomico.

Edema periorbitale (pag. 35) Un disturbo caratterizzato da gonfiore causato da un eccessivo accumulo di liquido intorno alle orbite del viso.

Edema polmonare (pag. 67) Un disturbo caratterizzato da accumulo di liquidi nei tessuti polmonari che provoca alterazioni dello scambio di gas fino ad un possibile quadro di insufficienza respiratoria.

Ematoma (pag. 5) Un disturbo caratterizzato da una raccolta localizzata di sangue, di solito coagulato, in un organo, spazio o tessuto, a causa di una rottura nella parete di un vaso sanguigno.

Ematosalpinge (pag. 26) Un disturbo caratterizzato dalla presenza di sangue in una tuba di Falloppio.

Ematuria (pag. 29) Un disturbo caratterizzato da risultati di test di laboratorio che indicano la presenza di sangue nelle urine.

Emoglobinuria (pag. 30) Un disturbo caratterizzato da risultati dei test di laboratorio che indicano la presenza di emoglobina libera nelle urine.

Emolisi (pag. 13) Un disturbo caratterizzato da una diffusa distruzione della membrana cellulare degli eritrociti che emerge dai risultati dei test di laboratorio.

Emorragia anale (pag. 43) Un disturbo caratterizzato da sanguinamento dalla regione anale.

Emorragia broncopolmonare (pag. 67) Un disturbo caratterizzato da sanguinamento dalla parete bronchiale e/o dal parenchima polmonare.

Emorragia cecale (pag. 43) Un disturbo caratterizzato da sanguinamento dal cieco.

Emorragia da varici esofagee (pag. 43) Un disturbo caratterizzato da sanguinamento delle varici esofagee.

Emorragia del cavo orale (pag. 43) Un disturbo caratterizzato da emorragia dalla bocca.

Emorragia del colon (pag. 43) Un disturbo caratterizzato da sanguinamento dal colon.

Emorragia del cordone spermatico (pag. 26) Un disturbo caratterizzato da sanguinamento dal cordone spermatico.

Emorragia del corpo vitreo (pag. 62) Un disturbo caratterizzato da stravasamento di sangue nel vitreo.

Emorragia digiunale (pag. 43) Un disturbo caratterizzato da sanguinamento dalla parete digiunale.

Emorragia duodenale (pag. 43) Un disturbo caratterizzato da sanguinamento dal duodeno.

Emorragia emorroidaria (pag. 43) Un disturbo caratterizzato da sanguinamento delle emorroidi.

Emorragia epatica (pag. 14) Un disturbo caratterizzato da sanguinamento dal fegato.

Emorragia esofagea (pag. 43) Un disturbo caratterizzato da sanguinamento esofageo.

Emorragia faringea (pag. 67) Un disturbo caratterizzato da emorragia dal faringe.

Emorragia gastrica (pag. 43) Un disturbo caratterizzato da sanguinamento dalla parete gastrica.

Emorragia gastrointestinale bassa (pag. 43) Un disturbo caratterizzato da sanguinamento dal tratto gastrointestinale inferiore (intestino tenue, intestino crasso e ano).

Emorragia gastrointestinale superiore (pag. 44) Un disturbo caratterizzato da sanguinamento dal tratto gastrointestinale superiore (cavo orale, faringe, esofago e stomaco).

Emorragia ileale (pag. 44) Un disturbo caratterizzato da sanguinamento dalla parete ileale.

Emorragia intra-addominale (pag. 44) Un disturbo caratterizzato da sanguinamento nella cavità addominale.

Emorragia intracranica (pag. 20) Un disturbo caratterizzato da sanguinamento intracranico.

Emorragia intraoperatoria (pag. 88) Il riscontro di emorragia incontrollata durante un intervento chirurgico.

Emorragia laringea (pag. 68) Un disturbo caratterizzato da sanguinamento dal laringe.

Emorragia mediastinica (pag. 68) Un disturbo caratterizzato da sanguinamento dal mediastino.

Emorragia ovarica (pag. 26) Un disturbo caratterizzato da sanguinamento dall'ovaio.

Emorragia pancreatica (pag. 44) Un disturbo caratterizzato da sanguinamento del pancreas.

Emorragia pleurica (pag. 68) Un disturbo caratterizzato da sanguinamento dalla cavità pleurica.

Emorragia postoperatoria (pag. 88) Il riscontro di sanguinamento che si verifica dopo un intervento chirurgico.

Emorragia prostatica (pag. 26) Un disturbo caratterizzato da sanguinamento dalla ghiandola prostatica.

Emorragia renale (pag. 30) Un disturbo caratterizzato da sanguinamento dal rene.

Emorragia retroperitoneale (pag. 44) Un disturbo caratterizzato da sanguinamento della zona retroperitoneale.

Emorragia rettale (pag. 44) Un disturbo caratterizzato da sanguinamento dalla parete rettale con emorragia anale.

Emorragia testicolare (pag. 26) Un disturbo caratterizzato da sanguinamento dal testicolo.

Emorragia tracheale (pag. 89) Il riscontro di sanguinamento dalla trachea.

Emorragia uterina (pag. 26) Un disturbo caratterizzato da sanguinamento dall'utero.

Emorragia vaginale (pag. 26) Un disturbo caratterizzato da emorragia dalla vagina.

Emorroidi (pag. 44) Un disturbo caratterizzato dalla presenza di vene dilatate nel retto e nella zona circostante.

Encefalite (pag. 79) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge l'encefalo.

Encefalomielite (pag. 79) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge l'encefalo e il midollo spinale.

Encefalopatia (pag. 20) Un disturbo caratterizzato da un processo patologico che coinvolge l'encefalo.

Endocardite (pag. 79) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge l'endocardio.

Endoftalmite (pag. 80) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge le strutture interne dell'occhio.

Enterocolite (pag. 80) Un disturbo caratterizzato da infiammazione (pag.) o da un processo infettivo (pag.) che coinvolge l'intestino tenue e quello crasso.

Epatite (pag. 80) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge il fegato.

Epatite virale (pag. 80) Un disturbo caratterizzato da un processo patologico virale che coinvolge il parenchima epatico.

Epistassi (pag. 68) Un disturbo caratterizzato da sanguinamento dal naso.

Eritema multiforme (pag. 35) Un disturbo caratterizzato da lesioni simili ad un bersaglio (un anello rosso-rosso attorno a un centro pallido).

Eritroderma (pag. 35) Un disturbo caratterizzato da eritema infiammatorio generalizzato ed esfoliazione. Il processo infiammatorio coinvolge >90% della superficie corporea.

Eritrodisestesia, sindrome palmo-plantare (pag. 35) Un disturbo caratterizzato da rossore, forte fastidio, gonfiore e formicolio ai palmi delle mani o alle piante dei piedi.

Esofagite (pag. 44) Un disturbo caratterizzato da infiammazione della parete esofagea.

Esostosi (pag. 57) Un disturbo caratterizzato da crescita eccessiva, non neoplastica, del tessuto osseo.

Euforia (pag. 65) Un disturbo caratterizzato da una sensazione esagerata di benessere che è sproporzionata rispetto agli eventi e agli stimoli.

Evento tromboembolico (pag. 5) Un disturbo caratterizzato da occlusione di un vaso da un trombo che è migrato da un sito distale attraverso il flusso sanguigno.

Faringite (pag. 80) Un disturbo caratterizzato da infiammazione della gola.

Febbre (pag. 99) Un disturbo caratterizzato da aumento della temperatura corporea al di sopra del limite superiore della norma.

Femminilizzazione acquisita (pag. 26) Un disturbo caratterizzato dallo sviluppo di caratteristiche sessuali secondarie femminili nei maschi a causa di fattori estrinseci.

Fibrillazione atriale (pag. 8) Un disturbo caratterizzato da una forma di aritmia senza onde P riconoscibili e da una risposta ventricolare irregolare causata da circuiti di rientro multipli. Il disturbo del ritmo ha origine sopraventricolare.

Fibrillazione ventricolare (pag. 8) Un disturbo caratterizzato da una aritmia senza complessi QRS riconoscibili dovuta all'eccitazione rapida e ripetitiva delle fibre del miocardio senza contrazione coordinata dei ventricoli.

Fibrosi polmonare (pag. 68) Un disturbo caratterizzato dalla sostituzione del tessuto polmonare con tessuto connettivo che porta a dispnea progressiva, insufficienza respiratoria o insufficienza cardiaca destra.

Fibrosi profonda del tessuto connettivo (pag. 57) Un disturbo caratterizzato dalla degenerazione fibrotica del tessuto connettivo profondo.

Fibrosi superficiali dei tessuti molli (pag. 57) Un disturbo caratterizzato da degenerazione fibrotica dei tessuti molli superficiali.

Fistola anale (pag. 45) Un disturbo caratterizzato da una comunicazione anomala tra il canale anale e la cute perianale.

Fistola biliare (pag. 14) Un disturbo caratterizzato da una comunicazione anomala tra i dotti biliari e un altro organo o sito anatomico.

Fistola bronchiale (pag. 68) Un disturbo caratterizzato da una comunicazione anomala tra il bronco e un altro organo o sito anatomico.

Fistola broncopleurica (pag. 68) Un disturbo caratterizzato da una comunicazione anomala tra un bronco e la cavità pleurica.

Fistola del cavo orale (pag. 45) Un disturbo caratterizzato da una comunicazione anomala tra la cavità orale e un altro organo o sito anatomico.

Fistola del colon (pag. 45) Un disturbo caratterizzato da una comunicazione anomala tra l'intestino crasso e un altro organo o sito anatomico.

Fistola dell'apparato genitale femminile (pag. 27) Un disturbo caratterizzato da una comunicazione anomala tra un organo del sistema riproduttivo femminile e un altro organo o sede anatomica.

Fistola della colecisti (pag. 14) Un disturbo caratterizzato da una comunicazione anomala tra la colecisti e un altro organo o sito anatomico.

Fistola della ghiandola salivare (pag. 45) Un disturbo caratterizzato da una comunicazione anomala tra una ghiandola salivare e un altro organo o sito anatomico.

Fistola digiunale (pag. 45) Un disturbo caratterizzato da una comunicazione anomala tra il digiuno e un altro organo o sito anatomico.

Fistola duodenale (pag. 45) Un disturbo caratterizzato da una comunicazione anomala tra il duodeno e un altro organo o sito anatomico.

Fistola enterovesicale (pag. 45) Un disturbo caratterizzato da una comunicazione anomala tra vescica e intestino.

Fistola esofagea (pag. 45) Un disturbo caratterizzato da una comunicazione anomala tra l'esofago e un altro organo o sito anatomico.

Fistola faringea (pag. 69) Un disturbo caratterizzato da una comunicazione anomala tra il faringe e un altro organo o sito anatomico.

Fistola gastrica (pag. 46) Un disturbo caratterizzato da una comunicazione anomala tra lo stomaco e un altro organo o sito anatomico.

Fistola gastrointestinale (pag. 46) Un disturbo caratterizzato da una comunicazione anomala tra una qualsiasi parte del sistema gastrointestinale e un altro organo o sito anatomico.

Fistola ileale (pag. 46) Un disturbo caratterizzato da una comunicazione anomala tra l'ileo e un altro organo o sito anatomico.

Fistola laringea (pag. 69) Un disturbo caratterizzato da una comunicazione anomala tra il laringe e un altro organo o sito anatomico.

Fistola pancreatica (pag. 46) Un disturbo caratterizzato da una comunicazione anomala tra il pancreas e un altro organo o sito anatomico.

Fistola polmonare (pag. 68) Un disturbo caratterizzato da una comunicazione anomala tra il polmone e un altro organo o sito anatomico.

Fistola rettale (pag. 46) Un disturbo caratterizzato da una comunicazione anomala tra il retto e un altro organo o sito anatomico.

Fistola tracheale (pag. 69) Un disturbo caratterizzato da una comunicazione anomala tra la trachea e un altro organo o sito anatomico.

Fistola urinaria (pag. 30) Un disturbo caratterizzato da una comunicazione anomala tra una qualsiasi parte del sistema urinario e un altro organo o sito anatomico.

Fistola uterina (pag. 27) Un disturbo caratterizzato da una comunicazione anomala tra l'utero e un altro organo o sito anatomico.

Fistola vaginale (pag. 27) Un disturbo caratterizzato da una comunicazione anomala tra la vagina e un altro organo o sito anatomico.

Flatulenza (pag. 46) Un disturbo caratterizzato da uno stato di eccesso di gas nel tubo digerente.

Flebite (pag. 5) Un disturbo caratterizzato da infiammazione della parete di una vena.

Flebite infettiva (pag. 80) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge una vena. Le manifestazioni cliniche comprendono eritema, sensazione di forte malessere, gonfiore e indurimento lungo il decorso della vena infetta.

Flutter atriale (pag. 8) Un disturbo caratterizzato da una forma di aritmia con contrazioni ritmiche atriali ad una frequenza di 200-300 battiti al minuto. Il disturbo del ritmo nasce a livello atriale.

Fotofobia (pag. 62) Un disturbo caratterizzato dalla paura e dal rifiuto della luce.

Fotopsie (pag. 62) Un disturbo caratterizzato dalla visione improvvisa o di breve durata di un lampo di luce.

Fotosensibilità (pag. 35) Un disturbo caratterizzato da un aumento della sensibilità della cute alla luce.

Frattura (pag. 89) Il riscontro di una lesione traumatica dell'osso in cui la continuità dell'osso stesso si interrompe.

Frattura del polso (pag. 89) Il riscontro di una lesione traumatica dell'articolazione del polso in cui si è interrotta la continuità di un osso del polso.

Frattura dell'anca (pag. 89) Il riscontro di lesioni traumatiche a livello dell'anca ove si produce l'interruzione della continuità anatomica della testa del femore, del collo del femore o delle regioni intertrocanteriche o sottotrocanteriche.

Frattura della caviglia (pag. 89) Il riscontro di danni all'articolazione della caviglia con interruzione della continuità dell'osso. I sintomi includono forte dolore, gonfiore e difficoltà di movimento della gamba e del piede corrispondenti.

Frattura vertebrale (pag. 89) Il riscontro di una lesione traumatica della colonna vertebrale in cui si è interrotta la continuità di un osso vertebrale.

Fuoriuscita del fluido cerebrospinale (pag. 20) Un disturbo caratterizzato da perdita di liquido cerebrospinale nei tessuti circostanti.

Gastralgia (pag. 46) Un disturbo caratterizzato da una sensazione di forte malessere allo stomaco.

Gastrite (pag. 46) Un disturbo caratterizzato da infiammazione dello stomaco.

Gastroparesi (pag. 46) Un disturbo caratterizzato da una paralisi incompleta dei muscoli della parete dello stomaco con conseguente ritardo di svuotamento del contenuto gastrico nell'intestino tenue.

Gengivite (pag. 80) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge le gengive.

Ginecomastia (pag. 27) Un disturbo caratterizzato da eccessivo sviluppo delle mammelle nei maschi.

Glaucoma (pag. 62) Un disturbo caratterizzato da un aumento della pressione nel bulbo oculare a causa di un'ostruzione al deflusso dell'umor acqueo.

Gocciolamento rinofaringeo (pag. 69) Un disturbo caratterizzato da eccessiva secrezione mucosa nella parte posteriore delle cavità nasali o della gola che causa mal di gola e/o tosse.

Gonfiore (pag. 47) Un disturbo caratterizzato da una sensazione soggettiva di fastidiosa pienezza dell'addome.

Gravidanza inattesa (pag. 74) Un evento caratterizzato da una gravidanza inattesa al momento del concepimento.

Ictus emorragico (pag. 20) Un disturbo caratterizzato da una perdita improvvisa della funzione sensoriale a causa di un evento vascolare intracranico.

Ideazione suicidaria (pag. 65) Un disturbo caratterizzato dal pensiero di porre fine alla propria vita.

Idrocefalia (pag. 20) Un disturbo caratterizzato da un aumento anomalo di fluido cerebrospinale nei ventricoli cerebrali.

Ileo (pag. 47) Un disturbo caratterizzato da incapacità dell'ileo di trasportare il contenuto intestinale.

Incontinenza fecale (pag. 47) Un disturbo caratterizzato da incapacità di controllare la fuoriuscita di feci dal retto.

Incontinenza urinaria (pag. 30) Un disturbo caratterizzato da incapacità di controllare il flusso di urina dalla vescica.

Incremento dei livelli di amilasi (pag. 77) Riscontro basato sui risultati dei test di laboratorio che indicano un aumento dei livelli di amilasi in un campione di siero.

Incremento dell'INR (pag. 77) Riscontro basato sui risultati dei test di laboratorio che indicano un aumento del rapporto tra tempo di protrombina del paziente e quello di un campione ematico di controllo.

Indurimento della cute (pag. 35) Un disturbo caratterizzato dalla presenza di un'area di indurimento cutaneo.

Infarto del miocardio (pag. 9) Un disturbo caratterizzato da importante necrosi del miocardio, dovuta ad una interruzione dell'apporto di sangue ad una parte del tessuto.

Infezione ad un nervo craniale (pag. 80) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge un nervo cranico.

Infezione addominale (pag. 80) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge la cavità addominale.

Infezione alla prostata (pag. 81) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge la prostata.

Infezione anorettale (pag. 81) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge la zona anale e il retto.

Infezione articolare (pag. 81) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge un'articolazione.

Infezione bronchiale (pag. 81) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge i bronchi.

Infezione ciecale (pag. 81) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge il cieco.

Infezione correlata ad un dispositivo medico (pag. 81) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo correlato all'uso di un dispositivo medico.

Infezione cutanea (pag. 81) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge la cute.

Infezione da catetere (pag. 81) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo secondario all'utilizzo di un catetere.

Infezione dei tessuti molli (pag. 81) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge i tessuti molli.

Infezione del labbro (pag. 81) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge le labbra.

Infezione del pene (pag. 82) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge il pene.

Infezione del tenue (pag. 82) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge l'intestino tenue.

Infezione del tratto biliare (pag. 82) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge il tratto biliare.

Infezione della cornea (pag. 82) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge la cornea.

Infezione della ghiandola salivare (pag. 82) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge la ghiandola salivare.

Infezione della mammella (pag. 82) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge la mammella.

Infezione della mucosa (pag. 82) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge una mucosa.

Infezione della vescica (pag. 82) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge la vescica.

Infezione delle alte vie respiratorie (pag. 82) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge il tratto respiratorio superiore (naso, seni paranasali, faringe, laringe o trachea).

Infezione delle vie urinarie (pag. 83) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge l'apparato urinario, più comunemente vescica ed uretra.

Infezione dentale (pag. 83) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge un dente.

Infezione di un nervo periferico (pag. 83) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge i nervi periferici.

Infezione di una ferita (pag. 83) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge una ferita.

Infezione duodenale (pag. 83) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge il duodeno.

Infezione esofagea (pag. 83) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge l'esofago.

Infezione nella sede della stomia (pag. 83) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge una stomia (apertura creata chirurgicamente sulla superficie corporea).

Infezione oculare (pag. 83) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge l'occhio.

Infezione ossea (pag. 83) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge l'osso.

Infezione ovarica (pag. 83) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge l'ovaio.

Infezione pancreatica (pag. 84) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge il pancreas.

Infezione pelvica (pag. 84) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge la cavità pelvica.

Infezione periorbitale (pag. 84) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge l'orbita dell'occhio.

Infezione peritoneale (pag. 84) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge il peritoneo.

Infezione pleurica (pag. 84) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge la pleura.

Infezione polmonare (pag. 84) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge i polmoni.

Infezione scrotale (pag. 84) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge lo scroto.

Infezione splenica (pag. 84) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge la milza.

Infezione ungueale (pag. 84) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge l'unghia.

Infezione uretrale (pag. 85) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge l'uretra.

Infezione uterina (pag. 85) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge l'endometrio. Esso può estendersi al miometrio e ai tessuti parametriali.

Infezione vaginale (pag. 85) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge la vagina.

Infezione vulvare (pag. 85) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge la vulva.

Infezioni renali (pag. 85) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge i reni.

Infiammazione del dotto salivare (pag. 47) Un disturbo caratterizzato da infiammazione del dotto salivare.

Infiammazione dell'orecchio esterno (pag. 32) Un disturbo caratterizzato da infiammazione, gonfiore e rossore dell'orecchio esterno e del canale uditivo.

Infiammazione dell'orecchio medio (pag. 32) Un disturbo caratterizzato da infiammazione (risposta fisiologica ad uno stimolo irritativo), gonfiore e arrossamento dell'orecchio medio.

Infiammazione vaginale (pag. 27) Un disturbo caratterizzato da infiammazione che coinvolge la vagina. I sintomi possono includere arrossamento, edema, forte fastidio e un aumento delle secrezioni vaginali.

Insomnia (pag. 65) Un disturbo caratterizzato da difficoltà ad addormentarsi e/o a rimanere addormentati

Insufficienza epatica (pag. 14) Un disturbo caratterizzato dall'incapacità del fegato di metabolizzare le sostanze chimiche del corpo. I risultati dei test di laboratorio mostrano livelli plasmatici anormali di ammonio, bilirubina, latticodeidrogenasi e fosfatasi alcalina.

Insufficienza multi-organo (pag. 99) Un disturbo caratterizzato da un progressivo deterioramento dei polmoni, del fegato, dei reni e dei meccanismi di coagulazione.

Insufficienza respiratoria (pag. 69) Un disturbo caratterizzato da compromissione dello scambio di gas con il sistema respiratorio con conseguente ipossia e diminuzione dell'ossigenazione dei tessuti che può associarsi ad un aumento dei livelli arteriosi di anidride carbonica.

Insufficienza surrenalica (pag. 39) Un disturbo che si verifica quando la corteccia surrenalica non produce sufficiente cortisolo e, in alcuni casi, aldosterone. Può essere dovuto ad un disordine della corteccia surrenalica come nel morbo di Addison o nell'insufficienza surrenalica primitiva.

Intolleranza al glucosio (pag. 11) Un disturbo caratterizzato dall'incapacità di metabolizzare adeguatamente il glucosio.

Intolleranza all'alcool (pag. 11) Un disturbo caratterizzato da un aumento della sensibilità agli effetti negativi dell'alcool, che possono includere congestione nasale, vampate di calore, aritmie cardiache, nausea, vomito, indigestione e mal di testa.

Ipercalcemia (pag. 11) Un disturbo caratterizzato da risultati dei test di laboratorio che indicano un aumento della concentrazione di calcio (corretto per l'albumina) nel sangue.

Ipercaliemia (pag. 11) Un disturbo caratterizzato da risultati dei test di laboratorio che indicano un aumento della concentrazione di potassio nel sangue; si associa a insufficienza renale o, a volte, all'uso di farmaci diuretici.

Ipercolesterolemia (pag. 77) Ricontra basato sui risultati dei test di laboratorio che indicano livelli superiori alla norma di colesterolo in un campione di sangue.

Iperglicemia (pag. 11) Un disturbo caratterizzato da risultati dei test di laboratorio che indicano un aumento della concentrazione di zucchero nel sangue. Di solito è un indice di diabete mellito o intolleranza al glucosio.

Iperidrosi (pag. 36) Un disturbo caratterizzato da eccessiva sudorazione.

Iperlacrimia (pag. 62) Un disturbo caratterizzato da un'eccessiva lacrimazione, può essere causato da una sovrapproduzione di lacrime o da alterato drenaggio del dotto lacrimale.

Ipermagnesiemia (pag. 11) Un disturbo caratterizzato da risultati dei test di laboratorio che indicano un aumento della concentrazione di magnesio nel sangue.

Ipernatremia (pag. 11) Un disturbo caratterizzato da risultati dei test di laboratorio che indicano un aumento della concentrazione di sodio nel sangue.

Iperparatiroidismo (pag. 39) Un disturbo caratterizzato da un aumento della produzione di ormone paratiroidico da parte delle ghiandole paratiroidi. Ciò si traduce in ipercalcemia (livelli anormalmente elevati di calcio nel sangue).

Iperpigmentazione della cute (pag. 36) Un disturbo caratterizzato da imbrunimento della cute a causa della deposizione eccessiva di melanina.

Ipersonnia (pag. 20) Un disturbo caratterizzato da eccessiva sonnolenza durante le ore diurne.

Ipertensione (pag. 5) Un disturbo caratterizzato da un aumento patologico della pressione sanguigna; ripetuti aumenti della pressione arteriosa oltre i 140 su 90 mmHg.

Ipertensione polmonare (pag. 69) Un disturbo caratterizzato da un aumento della pressione nella circolazione polmonare a causa di disturbi cardiaci o polmonari.

Ipertensione portale (pag. 14) Un disturbo caratterizzato da un aumento della pressione del sangue nel sistema venoso portale.

Iperteroidismo (pag. 39) Un disturbo caratterizzato da un eccesso di ormoni tiroidei nell'organismo. Le cause più comuni comprendono un'iperattività della ghiandola tiroide o un sovradosaggio di ormoni tiroidei.

Ipertricosi (pag. 36) Un disturbo caratterizzato da una densità o lunghezza dei capelli oltre i limiti considerati normali in una particolare parte del corpo, per una particolare età o razza.

Ipertrigliceridemia (pag. 11) Un disturbo caratterizzato da risultati dei test di laboratorio che indicano un aumento della concentrazione dei trigliceridi nel sangue.

Iperuricemia (pag. 12) Un disturbo caratterizzato da risultati dei test di laboratorio che indicano un aumento della concentrazione di acido urico.

Ipoacusia (pag. 32) Un disturbo caratterizzato da perdita parziale o totale della capacità di percepire e comprendere i suoni causata da un danno alle strutture dell'orecchio.

Ipoalbuminemia (pag. 12) Un disturbo caratterizzato da risultati dei test di laboratorio che indicano una bassa concentrazione di albumina nel sangue.

Ipocalcemia (pag. 12) Un disturbo caratterizzato da risultati dei test di laboratorio che indicano una bassa concentrazione di calcio (corretta per l'albumina) nel sangue.

Ipocellularità del midollo osseo (pag. 13) Un disturbo caratterizzato dalla incapacità del midollo osseo di produrre elementi emopoietici.

Ipfosfatemia (pag. 12) Un disturbo caratterizzato dai risultati dei test di laboratorio che indicano una bassa concentrazione di fosfati nel sangue.

Ipglicemia (pag. 12) Un disturbo caratterizzato da risultati dei test di laboratorio che indicano una bassa concentrazione di glucosio nel sangue.

Ipidrosi (pag. 36) Un disturbo caratterizzato da sudorazione ridotta.

Ipomagnesemia (pag. 12) Un disturbo caratterizzato dai risultati dei test di laboratorio che indicano una bassa concentrazione di magnesio nel sangue.

Iponatriemia (pag. 12) Un disturbo caratterizzato dai risultati dei test di laboratorio che indicano una bassa concentrazione di sodio nel sangue.

Ipoparatiroidismo (pag. 39) Un disturbo caratterizzato da un calo della produzione di ormone paratiroidico da parte delle ghiandole paratiroidi.

Ippigmentazione della cute (pag. 36) Un disturbo caratterizzato da perdita di pigmento della cute.

Ipotassiemia (pag. 12) Un disturbo caratterizzato dai risultati dei test di laboratorio che indicano una bassa concentrazione di potassio nel sangue.

Ipossia (pag. 69) Un disturbo caratterizzato da una diminuzione del livello di ossigeno nell'organismo.

Ipotensione (pag. 5) Un disturbo caratterizzato da una pressione del sangue che è al di sotto del normale per un individuo in un dato ambiente.

Ipotermia (pag. 99) Un disturbo caratterizzato da una temperatura corporea anormalmente bassa. Il trattamento è necessario quando la temperatura è pari a 35 °C (95 F) o inferiore.

Ipotiroidismo (pag. 39) Un disturbo caratterizzato da un calo nella produzione di ormoni tiroidei da parte della ghiandola tiroide.

Irregolarità del ciclo mestruale (pag. 27) Un disturbo caratterizzato da irregolarità del ciclo mestruale o della sua durata.

Irrequietezza (pag. 65) Un disturbo caratterizzato da incapacità di riposare, rilassarsi o stare fermi.

Irritabilità (pag. 100) Un disturbo caratterizzato da una risposta abnorme a stimoli o ad un'eccitazione fisiologica; può osservarsi in risposta al dolore, alla paura, ad un farmaco, ad una situazione emotiva o ad una condizione medica.

Irsutismo (pag. 36) Un disturbo caratterizzato dalla presenza di un eccesso di peli nelle donne cresciuti in sedi anatomiche in cui la crescita è considerata una caratteristica secondaria maschile e sotto il controllo degli androgeni (barba, baffi, petto, addome).

Ischemia cerebrale (pag. 21) Un disturbo caratterizzato da una diminuzione o assenza di apporto di sangue all'encefalo causato da ostruzione (trombosi o embolia) di un'arteria con conseguenti danni neurologici.

Ischemia delle arterie viscerali (pag. 5) Un disturbo caratterizzato da una riduzione del flusso di sangue a causa del restringimento o dell'ostruzione di un'arteria viscerale (mesenterica).

Ischemia periferica (pag. 5) Un disturbo caratterizzato da una cattiva circolazione sanguigna a una estremità.

Lacerazione della retina (pag. 62) Un disturbo caratterizzato da una piccola lacerazione della retina. Ciò si verifica quando il vitreo si separa dalla retina. I sintomi includono lampi luminosi e corpi mobili.

Lacerazione della stomia intestinale (pag. 89) Il riscontro di fuoriuscita di contenuto da una stomia intestinale (intervento chirurgico di apertura sulla superficie corporea).

Laringite (pag. 69) Un disturbo caratterizzato da una infiammazione (pag.) o da un processo infiammatorio (pag.) che coinvolge il laringe.

Laringospasmo (pag. 70) Un disturbo caratterizzato da una parossistica contrazione muscolare spasmodica delle corde vocali.

Lesione alla testa e al collo intraoperatoria (pag. 89) Il riscontro di danni alla testa e al collo durante un intervento chirurgico.

Lesione all'arteria carotide (pag. 92) Il riscontro di danni alla carotide.

Lesione all'orecchio intraoperatoria (pag. 89) Il riscontro di danni all'orecchio durante un intervento chirurgico.

Lesione alla vena cava inferiore (pag. 92) Il riscontro di danni alla vena cava inferiore.

Lesione alla vena cava superiore (pag. 92) Il riscontro di danni alla vena cava superiore.

Lesione alla vena giugulare (pag. 92) Il riscontro di danni alla vena giugulare.

Lesione aortica (pag. 90) Il riscontro di danni all'aorta.

Lesione arteriosa (pag. 90) Il riscontro di un danno ad un'arteria.

Lesione arteriosa intraoperatoria (pag. 90) Il riscontro di danni a un'arteria nel corso di un intervento chirurgico.

Lesione cardiaca intraoperatoria (pag. 90) Il riscontro di danni al cuore durante un intervento chirurgico.

Lesione dell'apparato riproduttivo intraoperatoria (pag. 90) Il riscontro di un danno agli organi riproduttivi nel corso di un intervento chirurgico.

Lesione della cute intraoperatoria (pag. 90) Il riscontro di un danno cutaneo durante un intervento chirurgico.

Lesione delle vie respiratorie intraoperatoria (pag. 90) Il riscontro di un danno al sistema respiratorio durante un intervento chirurgico.

Lesione delle vie urinarie intraoperatoria (pag. 90) Il riscontro di un danno all'apparato urinario durante un intervento chirurgico.

Lesione endocrina intraoperatoria (pag. 90) Il riscontro di danni ad una ghiandola endocrina durante un intervento chirurgico.

Lesione epatobiliare intraoperatoria (pag. 91) Il riscontro di un danno al parenchima epatico e/o alle vie biliari durante un intervento chirurgico.

Lesione gastrointestinale intraoperatoria (pag. 91) Il riscontro di danni all'apparato gastrointestinale durante un intervento chirurgico.

Lesione mammaria intraoperatoria (pag. 91) Il riscontro di danni al parenchima mammario nel corso di un intervento chirurgico.

Lesione muscoloscheletrica intraoperatoria (pag. 91) Il riscontro di un danno all'apparato muscoloscheletrico durante un intervento chirurgico.

Lesione neurologica intraoperatoria (pag. 91) Il riscontro di un danno al sistema nervoso durante un intervento chirurgico.

Lesione oculare intraoperatoria (pag. 91) Il riscontro di un danno agli occhi durante un intervento chirurgico.

Lesione renale intraoperatoria (pag. 91) Il riscontro di un danno renale durante un intervento chirurgico.

Lesione splenica intraoperatoria (pag. 91) Il riscontro di un danno alla milza durante un intervento chirurgico.

Lesione venosa (pag. 91) Il riscontro di danni a una vena.

Lesione venosa intraoperatoria (pag. 91) Il riscontro di un danno ad una vena nel corso di un intervento chirurgico.

Letargia (pag. 21) Un disturbo caratterizzato da una diminuzione della coscienza contraddistinta da inerzia mentale e fisica.

Leucemia secondaria a chemioterapia (pag. 97) Un disturbo caratterizzato da una forma di leucemia insorta per effetto dell'azione mutagena degli agenti chemioterapici.

Leucocitosi (pag. 13) Un disturbo caratterizzato da un aumento del numero di globuli bianchi nel sangue evidente ai test di laboratorio.

Leucoencefalopatia (pag. 21) Un disturbo caratterizzato da astrocitosi reattiva diffusa con molteplici focolai di necrosi senza infiammazione.

Linfadenite (pag. 85) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge i linfonodi.

Linfedema (pag. 6) Un disturbo caratterizzato da eccessiva raccolta di liquidi nei tessuti con conseguente edema.

Linfocelo (pag. 6) Un disturbo caratterizzato da una lesione cistica contenente linfa.

Lipoipertrofia (pag. 36) Un disturbo caratterizzato da ipertrofia del tessuto adiposo sottocutaneo nella sede di multiple iniezioni sottocutanee di insulina.

Livelli anormali di gonadotropine nel sangue (pag. 77) Riscontro basato sui risultati dei test di laboratorio che indicano livelli anormali di gonadotropine in un campione di sangue.

Livelli anormali di ormone anti-diuretico nel sangue (pag. 77) Riscontro basato sui risultati dei test di laboratorio che indicano livelli anormali di ormone anti-diuretico in un campione di sangue.

Livelli anormali di ormone della crescita (pag. 78) Riscontro basato sui risultati dei test di laboratorio che indicano livelli anormali di ormone della crescita in un campione biologico.

Livelli anormali di prolattina nel sangue (pag. 78) Riscontro basato sui risultati dei test di laboratorio che indicano livelli anormali di prolattina in un campione di sangue.

Lividi (pag. 92) Il riscontro di lesioni dei tessuti molli o dell'osso caratterizzate da perdite di sangue nei tessuti circostanti.

Lordosi (pag. 57) Un disturbo caratterizzato da un aumento anomalo della curvatura della parte lombare della colonna vertebrale.

Mal di denti (pag. 47) Un disturbo caratterizzato da una sensazione di forte fastidio ad un dente.

Mal di gola (pag. 70) Un disturbo caratterizzato da sensazione di forte fastidio alla gola.

Mal di schiena (pag. 57) Un disturbo caratterizzato da forte sensazione di fastidio nella regione dorsale.

Mal di testa (pag. 21) Un disturbo caratterizzato da una sensazione di forte fastidio in diverse aree del capo, non limitata al settore di distribuzione di un nervo.

Malassorbimento (pag. 47) Un disturbo caratterizzato da un assorbimento insufficiente di nutrienti nel tenue. I sintomi includono forti disturbi addominali, gonfiore e diarrea.

Malattia da reflusso gastroesofageo (pag. 47) Un disturbo caratterizzato da reflusso del contenuto gastrico e/o duodenale nell'esofago distale. È di natura cronica, di solito causato da incontinenza dello sfintere esofageo inferiore e può causare lesioni alla mucosa esofagea. I sintomi includono bruciore e acidità di stomaco.

Malattia da siero (pag. 16) Un disturbo caratterizzato da una reazione di ipersensibilità di tipo ritardato a proteine estranee derivate da un siero di origine animale. Si verifica circa 6-21 giorni dopo la somministrazione dell'antigene eterologo. I sintomi includono febbre, artralgie, mialgie, eruzioni cutanee, linfoadenopatia, forte sensazione di malessere al petto e dispnea.

Malattia del nodo del seno (pag. 9) Un disturbo caratterizzato da un'aritmia con periodi alternati di bradicardia e tachicardia atriale accompagnata da sincope, affaticamento e capogiri.

Malattia della valvola aortica (pag. 9) Un disordine caratterizzato da un difetto nella funzione o nella struttura della valvola aortica.

Malattia parodontale (pag. 47) Un disturbo del tessuto gengivale attorno ai denti.

Malattia renale cronica (pag. 30) Un disturbo caratterizzato da perdita graduale e di solito permanente della funzione renale, con conseguente insufficienza d'organo.

Malessere (pag. 100) Un disturbo caratterizzato da una sensazione di indisposizione generale o di disagio, un "sentirsi poco bene".

Mania (pag. 65) Un disturbo caratterizzato da eccitazione di proporzioni psicotiche che si manifesta con iperattività fisica e mentale, alterazione del comportamento e aumento del tono dell'umore.

Mediastinite (pag. 85) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge il mediastino.

Meningismo (pag. 21) Un disturbo caratterizzato da rigidità nucale, cefalea e fotofobia, causato da irritazione delle meningi cerebrali.

Meningite (pag. 85) Un disturbo caratterizzato da un'inflammatione acuta delle meningi cerebrali e/o del midollo spinale.

Menopausa (pag. 4) Un disturbo caratterizzato dalla cessazione definitiva delle mestruazioni, di solito indicata come 12 mesi consecutivi di amenorrea in una donna sopra i 45 anni di età.

Menopausa precoce (pag. 27) Un disturbo caratterizzato da un'insufficienza ovarica prima dei 40 anni. I sintomi comprendono vampate di calore, sudorazione notturna, sbalzi di umore e una diminuzione del desiderio sessuale.

Menorragia (pag. 27) Un disturbo caratterizzato da importante e anormale sanguinamento vaginale durante le mestruazioni.

Mialgia (pag. 57) Un disturbo caratterizzato da una forte sensazione di fastidio proveniente da un muscolo o da un gruppo di muscoli.

Mielite (pag. 21) Un disturbo caratterizzato da un'inflammatione che coinvolge il midollo spinale. I sintomi includono debolezza, parestesie, perdita di sensibilità, forte malessere e incontinenza.

Minzione frequente (pag. 30) Un disturbo caratterizzato da un improvviso e irresistibile bisogno di urinare.

Miocardite (pag. 9) Un disturbo caratterizzato da inflammatione del tessuto muscolare cardiaco.

Miodesopsie (mosche o corpi volanti) (pag. 62) Un disturbo caratterizzato dalla percezione di spot davanti agli occhi. Gli spot sono ombre di frammenti cellulari opachi nel corpo vitreo o nel cristallino.

Miosite (pag. 85) Un disturbo caratterizzato da un'inflammatione (pag.) o da un processo infettivo (pag.) che coinvolge i muscoli scheletrici.

Mobitz tipo I (pag. 9) Un disturbo caratterizzato da una aritmia con intervallo PR progressivamente allungato prima del blocco di un impulso atriale. Questo è il risultato di un'insufficienza intermittente nella conduzione dell'impulso elettrico atriale attraverso il nodo atrio-ventricolare (AV) ai ventricoli.

Mobitz tipo II - blocco atrio-ventricolare (pag. 9) Un disturbo caratterizzato da una aritmia con intervallo PR relativamente costante prima del blocco di un impulso atriale. Questo è il risultato di un'insufficienza intermittente nella conduzione dell'impulso elettrico atriale attraverso il nodo atrio-ventricolare (AV) ai ventricoli.

Morte improvvisa, causa non specificata (pag. 100) Un decesso imprevisto che non può essere attribuito ad un evento CTCAE di grado 5.

Movimenti involontari (pag. 21) Un disturbo caratterizzato da movimenti incontrollati e afinalistici.

Mucosite anale (pag. 47) Un disturbo caratterizzato da inflammatione della mucosa del canale anale.

Mucosite del tenue (pag. 48) Un disturbo caratterizzato da inflammatione della mucosa dell'intestino tenue.

Mucosite faringea (pag. 70) Un disturbo caratterizzato da una inflammatione che coinvolge la mucosa del faringe.

Mucosite laringea (pag. 70) Un disturbo caratterizzato da una inflammatione che coinvolge la mucosa del laringe.

Mucosite orale (pag. 48) Un disturbo caratterizzato da inflammatione della mucosa orale.

Mucosite rettale (pag. 48) Un disturbo caratterizzato da inflammatione della mucosa del retto.

Mucosite tracheale (pag. 70) Un disturbo caratterizzato da una inflammatione che coinvolge la mucosa della trachea.

Nausea (pag. 48) Un disturbo caratterizzato da una sensazione di nausea e/o desiderio di vomitare.

Necrosi epidermica tossica (pag. 37) Un disturbo caratterizzato da separazione del derma in più del 30% della superficie cutanea totale. La sindrome si pensa sia dovuta ad ipersensibilità di cute e mucose.

Necrosi anale (pag. 48) Un disturbo caratterizzato da un processo necrotico che si verifica nella regione anale.

Necrosi avascolare (pag. 58) Un disturbo caratterizzato da alterazioni necrotiche del tessuto osseo per interruzione dell'apporto ematico. Molto spesso interessano l'epifisi delle ossa lunghe. I cambiamenti necrotici portano al crollo e alla distruzione della struttura ossea.

Necrosi dei tessuti molli addominali (pag. 58) Un disturbo caratterizzato da un processo necrotico che si verifica nei tessuti molli della parete addominale.

Necrosi dei tessuti molli degli arti inferiori (pag. 58) Un disturbo caratterizzato da un processo necrotico che si verifica nei tessuti molli degli arti inferiori.

Necrosi dei tessuti molli degli arti superiori (pag. 58) Un disturbo caratterizzato da un processo necrotico che si verifica nei tessuti molli degli arti superiori.

Necrosi dei tessuti molli del capo (pag. 58) Un disturbo caratterizzato da un processo necrotico che si verifica nei tessuti molli del capo.

Necrosi dei tessuti molli del collo (pag. 58) Un disturbo caratterizzato da un processo necrotico che si verifica nei tessuti molli del collo.

Necrosi dei tessuti molli della pelvi (pag. 58) Un disturbo caratterizzato da un processo necrotico che si verifica nei tessuti molli della pelvi.

Necrosi del sistema nervoso centrale (pag. 21) Un disturbo caratterizzato da un processo necrotico che si verifica nel cervello e/o nel midollo spinale.

Necrosi della colecisti (pag. 14) Un disturbo caratterizzato da un processo necrotico che si verifica nella colecisti.

Necrosi di una stomia gastrointestinale (pag. 92) Il riscontro di un processo necrotico a livello di una stoma del tratto gastrointestinale.

Necrosi epatica (pag. 15) Un disturbo caratterizzato da un processo necrotico che si verifica nel parenchima epatico.

Necrosi esofagea (pag. 48) Un disturbo caratterizzato da un processo necrotico della parete esofagea.

Necrosi faringea (pag. 70) Un disturbo caratterizzato da un processo necrotico che si verifica nel faringe.

Necrosi gastrica (pag. 48) Un disturbo caratterizzato da un processo necrotico che si verifica nella parete gastrica.

Necrosi pancreatica (pag. 48) Un disturbo caratterizzato da un processo necrotico che si verifica nel pancreas.

Necrosi peritoneale (pag. 49) Un disturbo caratterizzato da un processo necrotico che si verifica nel peritoneo.

Necrosi rettale (pag. 49) Un disturbo caratterizzato da un processo necrotico che si verifica nella parete rettale.

Neoplasia secondaria correlata al trattamento (pag. 97) Sviluppo di un tumore maligno che si genera molto probabilmente come conseguenza del trattamento di un tumore maligno già presente.

Neuropatia periferica motoria (pag. 21) Un disturbo caratterizzato da infiammazione o degenerazione dei nervi motori periferici.

Neuropatia sensoriale periferica (pag. 22) Un disturbo caratterizzato da infiammazione o degenerazione dei nervi periferici sensoriali.

Neutropenia febbrile (pag. 13) Un disturbo caratterizzato da una conta dei neutrofilii $<1000/\text{mm}^3$ con un singolo episodio di temperatura $>38,3\text{ }^\circ\text{C}$ o con una temperatura costante $\geq 38\text{ }^\circ\text{C}$ per più di un'ora.

Nevralgia (pag. 22) Un disturbo caratterizzato da intensa sensazione dolorosa lungo un nervo o un gruppo di nervi.

Nictalopia (pag. 62) Un disturbo caratterizzato da incapacità di vedere chiaramente nella penombra.

Nistagmo (pag. 22) Un disturbo caratterizzato da movimenti involontari dei bulbi oculari.

Obesità (pag. 12) Un disturbo caratterizzato dall'eccesso di grasso corporeo.

Occlusione del colon (pag. 49) Un disturbo caratterizzato da un'ostruzione al normale flusso del contenuto intestinale nel colon.

Offuscamento della vista (pag. 63) Un disturbo caratterizzato dalla percezione visiva di immagini poco chiare o sfocate.

Oligospermia (pag. 27) Un disturbo caratterizzato da una diminuzione del numero di spermatozoi nel liquido seminale.

Orgasmo ritardato (pag. 65) Una disfunzione sessuale caratterizzata da ritardo nel raggiungimento dell'orgasmo.

Orticaria (pag. 37) Un disturbo caratterizzato da un'eruzione cutanea pruriginosa che si manifesta con ponfi internamente pallidi ma con margini rossi ben definiti.

Osteonecrosi della mandibola (pag. 59) Un disturbo caratterizzato da un processo necrotico che si verifica nell'osso della mandibola.

Osteoporosi (pag. 59) Un disturbo caratterizzato da ridotta massa ossea, con una diminuzione dello spessore corticale e del numero e delle dimensioni delle trabecole di un osso spugnoso (pur in presenza di una composizione chimica nella norma), con conseguente maggiore incidenza di fratture.

Ostruzione a livello dell'apparato urinario (pag. 30) Un disturbo caratterizzato da ostruzione al normale deflusso del contenuto del tratto urinario.

Ostruzione bronchiale (pag. 70) Un disturbo caratterizzato da ostruzione di un bronco causata, il più delle volte, da secrezioni ed essudati bronchiali.

Ostruzione del cordone spermatico (pag. 27) Un disturbo caratterizzato da ostruzione al normale deflusso del contenuto del funicolo spermatico.

Ostruzione del tenue (pag. 49) Un disturbo caratterizzato da ostruzione del flusso normale del contenuto intestinale.

Ostruzione dell'urostomia (pag. 92) Il riscontro del blocco dell'urostomia.

Ostruzione della colecisti (pag. 15) Un disturbo caratterizzato da ostruzione del flusso normale del contenuto della colecisti.

Ostruzione della stomia intestinale (pag. 92) Il riscontro di un'ostruzione al normale flusso dei contenuti attraverso una stomia intestinale.

Ostruzione della tuba di Falloppio (pag. 27) Un disturbo caratterizzato da ostruzione al normale deflusso del contenuto della tuba di Falloppio.

Ostruzione digiunale (pag. 49) Un disturbo caratterizzato da ostruzione del flusso normale del contenuto intestinale nel digiuno.

Ostruzione duodenale (pag. 49) Un disturbo caratterizzato da ostruzione del flusso normale del contenuto dello stomaco attraverso il duodeno.

Ostruzione esofagea (pag. 49) Un disturbo caratterizzato da ostruzione del flusso normale del contenuto dell'esofago.

Ostruzione gastrica (pag. 49) Un disturbo caratterizzato da ostruzione del flusso normale del contenuto alimentare nello stomaco.

Ostruzione ileale (pag. 50) Un disturbo caratterizzato da ostruzione del flusso normale del contenuto intestinale nell'ileo.

Ostruzione laringea (pag. 71) Un disturbo caratterizzato da ostruzione delle vie aeree a livello laringeo.

Ostruzione prostatica (pag. 27) Un disturbo caratterizzato da compressione dell'uretra secondaria ad ingrandimento della prostata. Ciò si traduce in difficoltà minzionale (minzione forzata, rallentamento del flusso e svuotamento incompleto della vescica).

Ostruzione rettale (pag. 50) Un disturbo caratterizzato da ostruzione del flusso normale del contenuto intestinale nel retto.

Ostruzione tracheale (pag. 92) Il riscontro di un'ostruzione del lume tracheale.

Ostruzione uterina (pag. 27) Un disturbo caratterizzato da ostruzione del meato uterino.

Ostruzione vaginale (pag. 28) Un disturbo caratterizzato da ostruzione del canale vaginale.

Otite esterna (pag. 86) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge l'orecchio esterno e il canale uditivo. Fattori di rischio sono l'esposizione eccessiva all'acqua (otite del nuotatore) e la presenza di ferite nel canale uditivo. I sintomi includono sensazione di pienezza, prurito, gonfiore e sensazione di marcato disagio all'orecchio, fuoriuscita di secrezioni.

Otite media (pag. 86) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge l'orecchio medio.

Palpitazioni (pag. 9) Un disturbo caratterizzato da una sensazione spiacevole di battiti cardiaci irregolari e/o più forti.

Pancreatite (pag. 50) Un disturbo caratterizzato da infiammazione del pancreas.

Papilledema (pag. 63) Un disturbo caratterizzato dalla comparsa di edema attorno al disco ottico.

Paralisi del nervo laringeo ricorrente (pag. 22) Un disturbo caratterizzato da paralisi del nervo laringeo ricorrente.

Paresi dei muscoli extraoculari (pag. 63) Un disturbo caratterizzato da paralisi incompleta di un muscolo extraoculare.

Parestesia (pag. 22) Un disturbo caratterizzato da alterazioni funzionali dei neuroni sensoriali con conseguenti sensazioni cutanee anomale di formicolio, intorpidimento, pressione, freddo e caldo, che si verificano in assenza di uno stimolo.

Paronichia (pag. 86) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge i tessuti molli attorno all'unghia.

Parto prematuro (pag. 74) Un evento caratterizzato dalla nascita di un neonato vitale prima della fine normale della gestazione. In genere, è compatibile con la vita se la nascita avviene tra la ventesima e la trentasettesima settimana di gestazione.

Perdita dall'urostomia (pag. 93) Il riscontro di fuoriuscita di contenuto da un'urostomia.

Perdita dell'unghia (pag. 37) Un disturbo caratterizzato dalla perdita di tutta o di parte di un'unghia.

Perdita di peso (pag. 78) Riscontro caratterizzato da una diminuzione del peso corporeo complessivo; in ambito pediatrico, inferiore alla curva di crescita basale.

Perdita linfatica (pag. 6) Un disturbo caratterizzato dalla perdita della linfa nei tessuti circostanti o nelle cavità del corpo.

Perdite vaginali (pag. 28) Un disturbo caratterizzato dalla presenza di secrezioni vaginali. Il muco prodotto dalle ghiandole cervicali è liberato dalla vagina naturalmente, soprattutto durante il periodo fertile.

Perforazione del colon (pag. 50) Un disturbo caratterizzato da una rottura della parete del colon.

Perforazione del dotto biliare (pag. 15) Un disturbo caratterizzato da una rottura della parete del dotto biliare intraepatico o extraepatico.

Perforazione del retto (pag. 50) Un disturbo caratterizzato da una rottura della parete rettale.

Perforazione del tenue (pag. 50) Un disturbo caratterizzato da una rottura della parete dell'intestino tenue.

Perforazione della colecisti (pag. 15) Un disturbo caratterizzato da una rottura della parete della colecisti.

Perforazione della tuba di Falloppio (pag. 93) Il riscontro della rottura della parete della tuba di Falloppio.

Perforazione della vescica (pag. 31) Un disturbo caratterizzato da una rottura della parete vescicale.

Perforazione digiunale (pag. 50) Un disturbo caratterizzato da una rottura della parete digiunale.

Perforazione duodenale (pag. 50) Un disturbo caratterizzato da una rottura della parete duodenale.

Perforazione esofagea (pag. 50) Un disturbo caratterizzato da una rottura della parete dell'esofago.

Perforazione gastrica (pag. 50) Un disturbo caratterizzato da una rottura della parete dello stomaco.

Perforazione ileale (pag. 51) Un disturbo caratterizzato da una rottura della parete ileale.

Perforazione uterina (pag. 93) Un disturbo caratterizzato da una rottura della parete uterina.

Perforazione vaginale (pag. 28) Un disturbo caratterizzato da una rottura nella parete vaginale.

Pericardite (pag. 9) Un disturbo caratterizzato da irritazione dei foglietti pericardici (l'involucro protettivo attorno al cuore).

Pericardite costrittiva (pag. 9) Un disturbo caratterizzato dalla presenza di un pericardio ispessito e fibrotico; la fibrosi impedisce la normale funzione miocardica limitando l'azione del muscolo miocardico.

Plessopatia brachiale (pag. 22) Un disturbo caratterizzato da parestesie regionali del plesso brachiale, forte malessere e debolezza muscolare e movimento limitato del braccio o della mano.

Pneumotorace (pag. 71) Un disturbo caratterizzato dalla presenza anomala di aria nella cavità pleurica con conseguente collasso del polmone.

Pollachiuria (pag. 31) Un disturbo caratterizzato da poliuria.

Polmonite (pag. 71) Un disturbo caratterizzato da un'inflammatione focale o diffusa del parenchima polmonare.

Porpora (pag. 37) Un disturbo caratterizzato da aree emorragiche della cute e delle mucose. Le lesioni più recenti appaiono di colore rossastro. Le lesioni più vecchie sono di solito di un colore viola più scuro e alla fine assumono un colore giallo-brunastro.

Porpora trombocitopenica (pag. 13) Un disturbo caratterizzato dalla presenza di anemia emolitica microangiopatica, porpora trombocitopenica, febbre, alterazioni renali e anomalie neurologiche quali convulsioni, emiplegia e disturbi visivi. Si tratta di una condizione acuta o subacuta.

Presincope (pag. 22) Un disturbo caratterizzato da un episodio di sordimento e di vertigine che può precedere un episodio di sincope.

Proctite (pag. 51) Un disturbo caratterizzato da infiammazione del retto.

Prolasso di stomia intestinale (pag. 93) Il riscontro di protrusione della stomia intestinale (intervento chirurgico che crea un'apertura sulla superficie corporea) al di sopra della superficie addominale.

Prolasso di urostomia (pag. 93) Il riscontro di dislocazione dell'urostomia.

Prolungamento del tempo di tromboplastina parziale attivato (pag. 78) Risultato anormale dei test di laboratorio in cui il tempo di tromboplastina parziale risulta essere superiore al valore di riferimento. Come possibile indicatore di coagulopatia, un tempo prolungato di tromboplastina parziale (PTT) può verificarsi in numerose patologie e disturbi, sia primitivi che correlati al trattamento.

Prolungamento all'ECG dell'intervallo QT corretto (pag. 78) Il riscontro di una aritmia cardiaca caratterizzata da un intervallo insolitamente lungo del QT corretto.

Proteinuria (pag. 31) Un disturbo caratterizzato da risultati dei test di laboratorio che indicano la presenza eccessiva di proteine nelle urine, principalmente albumina, ma anche globulina.

Prurito (pag. 37) Un disturbo caratterizzato da una sensazione di solletico intenso.

Psicosi (pag. 65) Un disturbo caratterizzato da un cambiamento della personalità, difficoltà funzionali e perdita di contatto con la realtà. Può essere una manifestazione di schizofrenia, disturbo bipolare o tumore cerebrale.

Pubertà precoce (pag. 39) Un disturbo caratterizzato da uno sviluppo insolitamente precoce delle caratteristiche sessuali secondarie; la maturazione sessuale inizia di solito prima degli 8 anni per le ragazze e prima dei 9 anni per i ragazzi.

Pubertà ritardata (pag. 39) Un disturbo caratterizzato da un ritardo inusuale nella maturità sessuale.

Radiation recall (dermatologica) (pag. 93) Il riscontro di una reazione infiammatoria acuta della cute dovuta a farmaci, in particolare chemioterapici, che permane per settimane o mesi dopo la radioterapia. La reazione infiammatoria è confinata all'area precedentemente irradiata e i sintomi scompaiono dopo l'interruzione della terapia farmacologica.

Radicolite (pag. 22) Un disturbo caratterizzato da infiammazione a carico della radice di un nervo. I pazienti provano un forte fastidio che si irradia lungo il percorso del nervo spinale a causa della pressione sulla radice del nervo di collegamento.

Rash acneiforme (pag. 37) Un disturbo caratterizzato da una eruzione di papule e pustole che di solito compaiono su viso, cuoio capelluto, parte superiore del petto e schiena.

Rash maculopapulare (pag. 37) Un disturbo caratterizzato dalla presenza di macchie (piatte) e papule (elevate). Conosciuto anche come rash morbilliforme, è uno degli eventi avversi cutanei più comuni, spesso interessa la parte superiore del tronco, ha diffusione centripeta ed è associato a prurito.

Rash papulo-pustoloso (pag. 86) Un disturbo che si caratterizza per un'eruzione costituita da papule (un piccolo foruncolo rilevato) e pustole (un piccolo foruncolo ripieno di pus), a tipica comparsa su volto, cuoio capelluto e parte superiore del torace e del dorso. A differenza dell'acne, queste eruzioni non si presentano con comedoni chiusi o aperti e possono essere sintomatiche, con prurito o lesioni dolenti.

Rash pustoloso (pag. 86) Un disturbo caratterizzato dalla presenza di una lesione cutanea circoscritta e rilevata ripiena di pus.

Raucedine (pag. 71) Un disturbo caratterizzato da una voce aspra e roca originante o diffusa al laringe.

Reazione autoimmune (pag. 16) Un disturbo derivante dalla perdita di funzionalità o da distruzione tissutale di uno o più organi, come conseguenza della risposta immunitaria umorale o cellulare dell'individuo nei confronti del suo stesso organismo.

Reazione infusionale (pag. 100) Un disturbo caratterizzato da reazioni avverse alla infusione di sostanze farmacologiche o biologiche.

Reazione nel sito di iniezione (pag. 100) Un disturbo caratterizzato dallo sviluppo di una intensa reazione (in genere immunologica) a livello del sito di iniezione.

Reazione vasovagale (pag. 22) Un disturbo caratterizzato da un calo improvviso della pressione arteriosa, bradicardia e vasodilatazione periferica che può portare alla perdita di coscienza. È il risultato di un aumento della stimolazione del nervo vago.

Reazioni allergiche (pag. 16) Un disturbo caratterizzato da una reazione avversa locale o sistemica da esposizione ad un allergene.

Retinopatia (pag. 63) Un disturbo che riguarda la retina.

Ridotta frazione di eiezione (pag. 78) È la percentuale che viene calcolata quando si confrontano la quantità di sangue espulsa durante una contrazione ventricolare e la quantità presente prima della contrazione.

Riduzione della motilità articolare (pag. 59) Un disturbo caratterizzato da una riduzione della flessibilità articolare di ogni articolazione.

Riduzione della motilità articolare del rachide cervicale (pag. 59) Un disturbo caratterizzato da una riduzione della flessibilità dell'articolazione della colonna vertebrale cervicale.

Riduzione della libido (pag. 65) Un disturbo caratterizzato da una diminuzione del desiderio sessuale.

Riduzione della motilità articolare del rachide lombare (pag. 59) Un disturbo caratterizzato da una diminuzione della flessibilità dell'articolazione della colonna lombare.

Rinite allergica (pag. 71) Un disturbo caratterizzato da una infiammazione della mucosa nasale causata da

una reazione IgE-mediata ad allergeni esterni. L'infiammazione può coinvolgere anche le mucose dei seni, gli occhi, l'orecchio medio e il faringe. I sintomi comprendono starnuti, congestione nasale, rinorrea e prurito.

Rinite infettiva (pag. 86) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge la mucosa nasale.

Ritardo della crescita fetale (pag. 74) Un disturbo caratterizzato da inibizione della crescita fetale con conseguente incapacità del feto di raggiungere il suo peso potenziale.

Ritenzione urinaria (pag. 31) Un disturbo caratterizzato da accumulo di urina all'interno della vescica a causa della incapacità di urinare.

Rottura di anastomosi biliare (pag. 93) Il riscontro di fuoriuscita di bile a causa della rottura di un'anastomosi (connessione chirurgica di due distinte strutture anatomiche) biliare.

Rottura di anastomosi del crasso (pag. 93) Il riscontro di perdite dovute alla rottura di un'anastomosi (collegamento chirurgico tra due distinte strutture anatomiche) nel grosso intestino.

Rottura di anastomosi del funicolo spermatico (pag. 93) Il riscontro di perdite dovute alla rottura di un'anastomosi (collegamento chirurgico tra due distinte strutture anatomiche) di un funicolo spermatico.

Rottura di anastomosi del tenue (pag. 93) Il riscontro di perdite dovute alla rottura di un'anastomosi (collegamento chirurgico tra due distinte strutture anatomiche) nel tenue.

Rottura di anastomosi della tuba di Falloppio (pag. 94) Il riscontro di perdite dovute alla rottura di un'anastomosi (collegamento chirurgico tra due distinte strutture anatomiche) di una tuba di Falloppio.

Rottura di anastomosi di un vaso deferente (pag. 94) Il riscontro di perdite dovute alla rottura di un'anastomosi (collegamento chirurgico tra due distinte strutture anatomiche) di un vaso deferente.

Rottura di anastomosi esofagea (pag. 94) Il riscontro di perdite dovute alla rottura di un'anastomosi (collegamento chirurgico tra due distinte strutture anatomiche) esofagea.

Rottura di anastomosi faringea (pag. 94) Il riscontro di perdite dovute alla rottura di un'anastomosi (collegamento chirurgico tra due distinte strutture anatomiche) faringea.

Rottura di anastomosi gastrica (pag. 94) Il riscontro di perdite dovute alla rottura di un'anastomosi (collegamento chirurgico tra due distinte strutture anatomiche) gastrica.

Rottura di anastomosi gastrointestinale (pag. 94) Il riscontro di perdite dovute alla rottura di un'anastomosi (collegamento chirurgico tra due distinte strutture anatomiche) gastrointestinale.

Rottura di anastomosi pancreatica (pag. 94) Il riscontro di perdite dovute alla rottura di un'anastomosi (collegamento chirurgico tra due distinte strutture anatomiche) pancreatica.

Rottura di anastomosi renale (pag. 94) Il riscontro di fuoriuscita di urina a causa della rottura di un'anastomosi (collegamento chirurgico tra due distinte strutture anatomiche) renale.

Rottura di anastomosi rettale (pag. 94) Il riscontro di perdite dovute alla rottura di un'anastomosi (collegamento chirurgico tra due distinte strutture anatomiche) rettale.

Rottura di anastomosi ureterale (pag. 95) Il riscontro di perdite dovute alla rottura di un'anastomosi (connessione chirurgica tra due distinte strutture anatomiche) ureterale.

Rottura di anastomosi uretrale (pag. 95) Il riscontro di perdite dovute alla rottura di un'anastomosi (connessione chirurgica tra due distinte strutture anatomiche) uretrale.

Rottura di anastomosi uterina (pag. 95) Il riscontro di perdite dovute alla rottura di un'anastomosi (con-

nessione chirurgica tra due distinte strutture anatomiche) uterina.

Rottura di anastomosi vaginale (pag. 95) Il riscontro di perdite dovute alla rottura di un'anastomosi (collegamento chirurgico tra due distinte strutture anatomiche) vaginale.

Rottura di anastomosi vescicale (pag. 95) Il riscontro di fuoriuscita di urina a causa della rottura di un'anastomosi (collegamento chirurgico tra due distinte strutture anatomiche) vescicale.

Rottura ovarica (pag. 28) Un disturbo caratterizzato da lacerazione o rottura del tessuto ovarico.

Sanguinamento della stomia intestinale (pag. 95) Il riscontro di perdita di sangue dalla stomia intestinale.

Sanguinamento nella sede della tracheostomia (pag. 95) Il riscontro di perdita di sangue dal sito della tracheostomia.

Sanguinamento nella sede dell'urostomia (pag. 95) Il riscontro di sanguinamento dal sito dell'urostomia.

Scoliosi (pag. 59) Un disturbo caratterizzato da una colonna vertebrale malformata, con curvatura laterale della stessa.

Scolorimento dell'unghia (pag. 38) Un disturbo caratterizzato da un cambiamento del colore della lamina ungueale.

Scompenso cardiaco (pag. 9) Un disturbo caratterizzato dalla incapacità del cuore di pompare il sangue ad un volume adeguato per soddisfare le esigenze metaboliche dei tessuti o dalla capacità di farlo solo grazie ad un aumento della pressione di riempimento.

Secchezza cutanea (pag. 38) Un disturbo caratterizzato da un aspetto desquamato ed opaco della cute; i pori sono generalmente fini, la cute ha un aspetto cartaceo sottile.

Secchezza delle fauci (pag. 51) Un disturbo caratterizzato da ridotta salivazione.

Secchezza oculare (pag. 63) Un disturbo caratterizzato da secchezza della cornea e della congiuntiva.

Secchezza vaginale (pag. 28) Un disturbo caratterizzato da una sensazione spiacevole di prurito e bruciore a livello vaginale.

Sepsi (pag. 86) Un disturbo caratterizzato dalla presenza di microrganismi patogeni nel flusso sanguigno, con conseguente reazione sistemica a rapida evoluzione che può portare allo shock.

Sibilo (pag. 71) Un disturbo caratterizzato da un suono acuto, fischiante durante la respirazione. È il risultato del restringimento o dell'ostruzione delle vie respiratorie.

Sieroma (pag. 95) Il riscontro di una raccolta sierosa simil-tumorale nei tessuti.

Sincope (pag. 22) Un disturbo caratterizzato da perdita spontanea di coscienza causata da insufficiente apporto di sangue al cervello.

Sindrome coronarica acuta (pag. 10) Un disturbo caratterizzato da segni e sintomi correlati ad un'ischemia acuta del miocardio secondario a malattia coronarica. La presentazione clinica copre un'ampia gamma di malattie cardiache, dall'angina instabile all'infarto del miocardio.

Sindrome cushingoide (pag. 40) Un disturbo caratterizzato da segni e sintomi che ricalcano quelli della sindrome o morbo di Cushing: aspetto a gibbo di bufalo, strie rubrae, obesità, ipertensione, diabete e osteoporosi, in genere causati da corticosteroidi esogeni.

Sindrome da acido retinoico (pag. 71) Un disturbo caratterizzato da aumento di peso, dispnea, versamento pleurico e pericardico, leucocitosi e/o insufficienza renale inizialmente descritto in pazienti trattati con acido all-trans retinoico.

Sindrome da aumentata permeabilità capillare (pag. 6) Un disturbo caratterizzato da perdita di liquidi intravascolari nello spazio extravascolare. Questa sindrome è osservabile in pazienti che dimostrano uno stato di fragilità capillare generalizzata a seguito di uno shock, basso flusso ematico, lesioni da ischemia-riperfusion, tossiemia, farmaci o intossicazioni. Può portare a edema generalizzato e insufficienza d'organo multipla.

Sindrome da distress respiratorio (ARDS) (pag. 71) Un disturbo caratterizzato da una insufficienza polmonare progressiva e pericolosa per la vita in assenza di una patologia polmonare di base, generalmente a seguito di un grave trauma o di un intervento chirurgico.

Sindrome da leucoencefalopatia posteriore reversibile (pag. 23) Un disturbo caratterizzato da cefalea, alterazione dello stato mentale, disturbi visivi e convulsioni associati ad un quadro radiologico di leucoencefalopatia posteriore. È stato osservato in associazione con encefalopatia ipertensiva, eclampsia e con trattamenti immunosoppressivi o citotossici. Si tratta di una condizione acuta o subacuta reversibile.

Sindrome da lisi tumorale (pag. 12) Un disturbo caratterizzato da alterazioni metaboliche provocate da una citolisi delle cellule tumorali spontanea o connessa alla terapia.

Sindrome da rilascio di citochine (pag. 16) Un disturbo caratterizzato da nausea, cefalea, tachicardia, ipertensione, rash e dispnea; è causato dal rilascio di citochine dalle cellule.

Sindrome della vena cava superiore (pag. 6) Un disturbo caratterizzato da ostruzione del flusso sanguigno nella vena cava superiore. Segni e sintomi includono gonfiore e cianosi di volto, collo e braccia, tosse, ortopnea e cefalea.

Sindrome di Stevens-Johnson (pag. 38) Un disturbo caratterizzato da separazione del derma in meno del 10% della superficie cutanea totale. La sindrome si pensa sia dovuta ad ipersensibilità di cute e mucose.

Sindrome di Wolff-Parkinson-White (pag. 10) Un disturbo caratterizzato dalla presenza di una via di conduzione accessoria tra atri e ventricoli che causa una attivazione ventricolare prematura.

Sindrome emolitico-uremica (pag. 13) Un disturbo caratterizzato da una forma di microangiopatia trombotica con insufficienza renale, anemia emolitica e grave trombocitopenia.

Sindrome mielodisplastica (pag. 97) Un disturbo caratterizzato da un'insufficiente produzione di cellule emopoietiche sane da parte del midollo osseo.

Sindrome piramidale (pag. 23) Un disturbo caratterizzato da una disfunzione dei tratti corticospinali (piramidali) del midollo spinale. I sintomi comprendono un aumento del tono muscolare degli arti inferiori, iperreflessia, positività del segno di Babinski e una diminuzione della coordinazione motoria fine.

Singhiozzo (pag. 71) Un disturbo caratterizzato da suoni ripetuti di deglutizione derivanti da apertura e chiusura involontaria della glottide. È attribuito ad uno spasmo del diaframma.

Sintomi di tipo influenzale (pag. 100) Un disturbo caratterizzato da un gruppo di sintomi simili a quelli osservati in pazienti con l'influenza. Esso comprende febbre, brividi, dolori, malessere, perdita di appetito e tosse secca.

Sinusite (pag. 72) Un disturbo caratterizzato da infiammazione (pag. 0) da un processo infettivo (pag. 1) che coinvolge le mucose dei seni paranasali.

Sonnolenza (pag. 23) Un disturbo caratterizzato da eccessiva sonnolenza o fiacca.

Suppressione della crescita (pag. 59) Un disturbo caratterizzato da una statura più bassa del normale rispetto all'età.

Sovraccarico di ferro (pag. 12) Un disturbo caratterizzato da accumulo di ferro nei tessuti.

Spasmo vescicale (pag. 31) Un disturbo caratterizzato da una contrazione improvvisa e involontaria della parete vescicale.

Spasticità (pag. 23) Un disturbo caratterizzato da aumento del tono muscolare involontario che colpisce le regioni che interferiscono con i movimenti volontari. Il risultato è rappresentato da disturbi nell'andatura, nei movimenti e nel linguaggio.

Starnuto (pag. 72) Un disturbo caratterizzato dall'espulsione involontaria di aria dal naso.

Stenosi anale (pag. 51) Un disturbo caratterizzato da un restringimento del lume del canale anale.

Stenosi bronchiale (pag. 72) Un disturbo caratterizzato da un restringimento del lume bronchiale.

Stenosi del colon (pag. 51) Un disturbo caratterizzato da un restringimento del lume del colon.

Stenosi del dotto biliare (pag. 15) Un disturbo caratterizzato da un restringimento del lume del dotto biliare.

Stenosi del dotto pancreatico (pag. 51) Un disturbo caratterizzato da un restringimento del lume del dotto pancreatico.

Stenosi del tenue (pag. 51) Un disturbo caratterizzato da un restringimento del lume dell'intestino tenue.

Stenosi dell'urostomia (pag. 96) Il riscontro di restringimento dell'apertura di un'urostomia.

Stenosi della stomia gastrointestinale (pag. 95) Il riscontro di un restringimento di una stomia (apertura creata chirurgicamente sulla superficie del corpo) gastrointestinale.

Stenosi della tuba di Falloppio (pag. 28) Un disturbo caratterizzato da un restringimento del lume della tuba di Falloppio.

Stenosi digiunale (pag. 51) Un disturbo caratterizzato da un restringimento del lume del digiuno.

Stenosi duodenale (pag. 52) Un disturbo caratterizzato da un restringimento del lume duodenale.

Stenosi esofagea (pag. 52) Un disturbo caratterizzato da un restringimento del lume dell'esofago.

Stenosi faringea (pag. 72) Un disturbo caratterizzato da un restringimento delle vie aeree faringee.

Stenosi gastrica (pag. 52) Un disturbo caratterizzato da un restringimento del lume dello stomaco.

Stenosi ileale (pag. 52) Un disturbo caratterizzato da un restringimento del lume dell'ileo.

Stenosi laringea (pag. 72) Un disturbo caratterizzato da un restringimento delle vie aeree a livello laringeo.

Stenosi rettale (pag. 52) Un disturbo caratterizzato da un restringimento del lume del retto.

Stenosi tracheale (pag. 72) Un disturbo caratterizzato da un restringimento della trachea.

Stenosi vaginale (pag. 28) Un disturbo caratterizzato da un restringimento del canale vaginale.

Stipsi (pag. 52) Un disturbo caratterizzato da evacuazioni intestinali irregolari e poco frequenti o difficoltose.

Stravaso nel sito di infusione (pag. 100) Un disturbo caratterizzato dalla fuoriuscita di un farmaco o di una sostanza biologica dal sito di infusione nel tessuto circostante. Segni e sintomi includono indurimento, eritema, gonfiore, senso di bruciore e forte malessere nel sito di infusione.

Stridore (pag. 72) Un disturbo caratterizzato da un suono respiratorio acuto a causa dell'ostruzione delle vie aeree superiori o laringee.

Tachicardia atriale parossistica (pag. 10) Un disturbo caratterizzato da una aritmia con esordio repentino ed improvvisa cessazione delle contrazioni atriali con una frequenza di 150-250 battiti al minuto. Il disturbo del ritmo nasce a livello atriale.

Tachicardia sinusale (pag. 10) Un disordine caratterizzato da una aritmia con frequenza cardiaca superiore a 100 battiti al minuto che ha origine nel nodo del seno.

Tachicardia sopraventricolare (pag. 10) Un disturbo caratterizzato da una aritmia con frequenza cardiaca superiore a 100 battiti al minuto con origine sopraventricolare.

Tachicardia ventricolare (pag. 10) Un disturbo caratterizzato da una aritmia con frequenza cardiaca superiore a 100 battiti al minuto che ha origine distalmente al fascio di His.

Tamponamento pericardico (pag. 10) Un disturbo caratterizzato da un aumento della pressione intrapericardica dovuto alla raccolta di sangue o di liquido nel pericardio.

Telangiectasia (pag. 38) Un disturbo caratterizzato da una dilatazione locale dei piccoli vasi con conseguente assunzione di un colorito rossastro di cute e mucose.

Tentativo di suicidio (pag. 65) Un disturbo caratterizzato da un danno auto-inflicto nel tentativo di porre fine alla propria vita.

Tifite (pag. 52) Un disturbo caratterizzato da infiammazione del cieco.

Tinnito (pag. 33) Un disturbo caratterizzato dalla percezione di rumori nelle orecchie, quali fischi, ronzii o ticchettii.

Tosse (pag. 73) Un disturbo caratterizzato da contrazioni toraciche improvvisate, spesso ripetitive, spasmodiche, con conseguente rilascio violento di aria dai polmoni, di solito accompagnato da un suono caratteristico.

Tosse produttiva (pag. 73) Un disturbo caratterizzato da espettorazione di secrezioni con la tosse.

Tracheite (pag. 87) Un disturbo caratterizzato da un processo infettivo che coinvolge la trachea.

Tremore (pag. 23) Un disturbo caratterizzato da movimenti incontrollati di tutto il corpo o di singole parti.

Trisma (pag. 60) Un disturbo caratterizzato dall'incapacità di aprire la bocca completamente a causa di una riduzione del range di mobilità dei muscoli della masticazione.

Tromboflebite superficiale (pag. 6) Un disturbo caratterizzato dalla presenza di un coagulo di sangue e da infiammazione che coinvolge una vena superficiale delle estremità.

Trombosi portale (pag. 15) Un disturbo caratterizzato dalla formazione di un trombo (coagulo di sangue) nella vena porta.

Ulcera anale (pag. 53) Un disturbo caratterizzato da lesioni infiammatorie e necrotiche circoscritte, erosive, sulla superficie mucosa del canale anale.

Ulcera corneale (pag. 63) Un disturbo caratterizzato dalla perdita di tessuto epiteliale sulla superficie della cornea. È associato alla presenza di cellule infiammatorie nella cornea e nella camera anteriore.

Ulcera del colon (pag. 53) Un disturbo caratterizzato da lesioni infiammatorie e necrotiche circoscritte, erosive, sulla superficie mucosa del colon.

Ulcera del tenue (pag. 53) Un disturbo caratterizzato da lesioni infiammatorie e necrotiche circoscritte, erosive, sulla superficie mucosa dell'intestino tenue.

Ulcera digiunale (pag. 53) Un disturbo caratterizzato da lesioni infiammatorie e necrotiche circoscritte, erosive, sulla superficie mucosa del digiuno.

Ulcera duodenale (pag. 53) Un disturbo caratterizzato da lesioni infiammatorie e necrotiche circoscritte, erosive, sulla superficie mucosa della parete duodenale.

Ulcera esofagea (pag. 53) Un disturbo caratterizzato da lesioni infiammatorie e necrotiche circoscritte, erosive, sulla superficie mucosa della parete esofagea

Ulcera gastrica (pag. 53) Un disturbo caratterizzato da lesioni infiammatorie e necrotiche circoscritte, erosive, sulla superficie mucosa dello stomaco.

Ulcera ileale (pag. 54) Un disturbo caratterizzato da lesioni infiammatorie e necrotiche circoscritte, erosive, sulla superficie mucosa dell'ileo.

Ulcera rettale (pag. 54) Un disturbo caratterizzato da lesioni infiammatorie e necrotiche circoscritte, erosive, sulla superficie mucosa del retto.

Ulcera stomale (pag. 96) Un disturbo caratterizzato da lesioni infiammatorie e necrotiche circoscritte, erosive, sulla superficie mucosa digiunale vicino al sito di anastomosi a seguito di un intervento di gastroenterostomia.

Ulcerazione della cute (pag. 38) Un disturbo caratterizzato da lesioni cutanee circoscritte, infiammatorie e necrotico-erosive.

Ustione (pag. 96) Il riscontro della compromissione dell'integrità di una sede anatomica per cause di origine termica. L'ustione può essere causata dall'esposizione ad agenti chimici, calore diretto, elettricità, fiamme e radiazioni. L'entità del danno dipende dalla durata e dall'intensità dell'esposizione e dal tempo trascorso prima del trattamento.

Uveite (pag. 63) Un disturbo caratterizzato da infiammazione dell'uvea dell'occhio.

Vaginismo (pag. 28) Un disturbo caratterizzato da spasmi involontari dei muscoli del pavimento pelvico con

conseguente compressione patologica della parete vaginale durante la penetrazione, per esempio in corso di rapporti sessuali.

Vampate di calore (pag. 6) Un disturbo caratterizzato da una sensazione spiacevole e temporanea di intenso calore del corpo, arrossamento, talvolta associati alla comparsa di sudorazione sulle aree che si raffreddano.

Vasculite (pag. 6) Un disturbo caratterizzato da un processo infiammatorio a carico della parete di un vaso.

Versamento articolare (pag. 60) Un disturbo caratterizzato da un eccesso di liquidi in un'articolazione, in genere a causa dell'infiammazione dell'articolazione.

Versamento pericardico (pag. 10) Un disturbo caratterizzato da raccolta di liquido all'interno del sacco pericardico, di solito per cause infiammatorie.

Versamento pleurico (pag. 73) Un disturbo caratterizzato da un aumento della quantità di liquido nella cavità pleurica. I sintomi includono dispnea, tosse e notevole dolore toracico.

Vertigine (pag. 23,33) Un disturbo caratterizzato da una sensazione di mondo esterno che ruota intorno al paziente (vertigine oggettiva) o di paziente che ruota nello spazio (vertigine soggettiva) (pag. 23). Il paziente avverte una sensazione fastidiosa di stordimento, instabilità, rotazione o dondolio (pag. 33).

Virilizzazione (pag. 40) Un disturbo caratterizzato da impropria mascolinizzazione che si verifica in una femmina o in un maschio in età prepuberale.

Vomito (pag. 54) Un disturbo caratterizzato dal riflesso di espulsione del contenuto dello stomaco dalla bocca.

Con il supporto educativo di



SANOVI